

A. INÁCIO DE MENEZES

Catedrático aposentado da Faculdade de Medicina e do Instituto Normal da Bahia. Ex Professor de Botânica Aplicada, no Curso de Farmácia e de Ciências Naturais, em Estabelecimentos de Ensino Secundário.

FLÓRA DA BAHIA

Descrição sucinta das Sps nativas e aclimadas, conhecidas pelos seus nomes vulgares na Bahia e em todo o Brasil, com as identificações científicas, suas características e utilidades.



981
3823
264

COMPANHIA EDITORA NACIONAL
SÃO PAULO

PRINCIPAES TRABALHOS DO AUTOR

- NATUREZA E CAUSA DAS ESCLEROSES VASCULARES, Imp. Popular — Bahia 1907.
- FISIOLOGIA DOS DENTES, Dois Mundos — Bahia 1910.
- DO PARALELISMO ANATÔMICO NAS ARTICULAÇÕES DAS HASTES DOS MEMBROS COM AS CINTURAS, Dois Mundos — Bahia 1911.
- ANATOMIA DESCRIPTIVA DOS DENTES HUMANOS, Liv. Catilina — Bahia, 1915.
- ANATOMIA MÉDICO-CIRÚRGICA DO ANTRÔ MAXILAR, Liv. Catilina — Bahia, 1920.
- LIÇÃO INAUGURAL DO CURSO DE MEDICINA OPERATÓRIA, Dois Mundos — Bahia, 1930.
- ESTUDOS GERAES DE ANATOMIA HUMANA — ARTROLOGIA, segunda edição, Caldino Loureiro — Bahia, 1930.
- NA BAHIA EM BOA TERRA, esgotado. Romance científico, Imp. Oficial — Bahia, 1934.
- SATIRO DIAS COLEGIAL, Jornal do Comércio, Rio. Setembro de 1934 e reeditado, em album especial, pela Liga N. de Proteção da Cegueira, em homenagem ao Autor.
- MOCIDADE VITORIOSA, romance de costumes esgotado, Irmãos Pongetti — Rio, 1940.
- DICIONÁRIO POPULAR DAS PLANTAS DA BAHIA. Somente a nomenclatura popular, a científica e a famíla das sps mais representativas. Publicação diária do Matutino "O Imparcial" de Outubro de 1941 a Abril de 1942.
- NOTAS E COMENTÁRIOS SOBRE A LARANJA DA BAHIA, Jornal do Comércio, Rio, e em separata, no ano seguinte — 1946 — pela Secretaria de Agricultura da Bahia.
- CRÔNICAS ACADÊMICAS, Imp. Vitória — Bahia, 194.

52-1014
m. n. 188992
cad. legenda. 203007-20

Aos distintos Amigos

ANÍSIO TEIXEIRA E NESTOR DUARTE

Grandes vultos da atual administração bahiana
— com o máximo apreço e agradecimento pelo
que deram à publicação dêste trabalho.

Of. o AUTOR



Para o inventário da opulenta Flora brasileira, tão completo quanto exequível, e ao alcance de qualquer inteligência, será sobremaneira interessante que, preliminarmente, se realizem, em todos os quadrantes do País, trabalhos, pelo menos, do modesto feitio dêste que aqui damos à estampa. A "Flora da Bahia" poderá ser estimada como ponderável adminículo a esse utilíssimo certame, porque, embora suscintamente, descreve as espécies mais representativas existentes nesse grande Estado, sejam elas autóctonas, aclimadas ou cosmopolitas. Se em seu solo encontramos até plantas de Hiléia brasileira e do extremo sul, algumas desenvolvendo-se do ponto de mira vegetativo e mesmo do econômico, em contrabalanço, muitos de seus elementos irradiam-se pelos Estados vizinhos, porque as Floras se interpenetram.

Serviu de núcleo ao presente empreendimento, singular ensaio que publicamos diariamente, de outubro de 1941 a abril do ano seguinte, no conceituoso matunino "O Imparcial", então editado na Bahia. Nos moldes de resumido vocabulário, registramos mais de 2000 verbetes, atribuindo às espécies mencionadas apenas os nomes científicos e as respectivas Famílias, no precipuo interesse de receber a crítica e os subsídios dos entendidos. Digamos, todavia, de passagem, que as solicitações nesse sentido, insistente mente formuladas, seriam em pura perda, não fossem as notas e informações que nos ofereceu o competente entomólogo G. Bondar.

Daquele período até o presente, constituiu nosso maior devotamento o estudo da flora bahiana. Para mencionar e descrever seus principaes elementos, foi mister certo conhecimento florístico dos Estados limítro-

ses e excursionarmos também pelos nossos sertões, mormente pelo edênico vale sanfranciscano. Ouvimos a palavra autorizada de eminentes naturalistas do Jardim Botânico, do Museu Nacional e da Paulicéia, graças à valiosa interferência do emérito Professor Pirajá da Silva. Dados interessantes, foram colhidos de pessoas do povo, mormente de homens do campo e de ervanários. Tratando-se de assunto tão complexo e controverso, consultamos as bibliotecas, destacadamente as especializadas. A despeito, porém, do máximo interesse de ficarmos ao abrigo de erros e omissões, lealmente confessamos que em labores de tal natureza, uns e outros, por bem dizer, são inevitáveis.

A nomenclatura popular ajusta-se plenamente aos caracteres de alguns vegetaes no referente à morfologia, suas virtudes e utilidades, sendo que pode advertir da nocividade de alguns à agricultura e ao organismo humano. Em maior escala, porém, os apelidos são despropositados, antagônicos, inexpressivos, incongruentes, embora às vezes humorísticos: são vozes de Jargão, de origem africana ou indígena, ou ainda corrutelas geratrizes de outras tantas, refletindo superstições e duvidosos valores terapêuticos.

Raríssimas são as espécies identificadas por uma e única designação, mesmo em localidades vizinhas, sendo ainda mais digno de nota que, até em uma área circunscrita, determinado apelativo tem sido conferido a vegetais os mais dispares, criando assim embaraços para discriminá-los. Enquanto não se fizer a conveniente depuração dessa bíblica nomenclatura — em cujo assunto procuramos interferir impugnando certos termos — toda ela deve, para esse objetivo, ser registada. E' esta a razão de apresentarmos abundante vocabulário jamais publicado, onde se deparam, todavia, centenas de palavras que devem ser lexicografadas.

Limitando-nos às espécies bahianas conhecidas pelas designações vulgares, que fora de dúvida em todas as

floras são as de maior importância, tivemos também por objetivo a fito-geografia nacional, contribuindo porventura para a localização das riquezas de um imenso País, que, em grande parte vive da agricultura.


Aos eminentes Prof. G. Kuhlmann, Prof. Pirajá da Silva, P. Kuhlmann e Dr. G. Bondar, apresentamos nossos cordiais agradecimentos pelos seus bons ofícios em prol dêste trabalho.

A. INACIO DE MENEZES



PRIMEIRA PARTE

AS ESPÉCIES PELOS NOMES VULGARES



ALGUMAS ABREVIATURAS

Termos botânicos:

Cau	Caule	Caus	Caules
Fa	Família	Fas	Famílias
Fl	Flor	Fls	Flores
Fo	Folha	Fos	Folhas
Ge	Gênero	Ges	Gêneros
Ra	Raiz	Ras	Raizes
Sp	Espécie	Sps	Espécies
Var	Variedades	Vars	Variedades
Ve	Vegetal	Ves	Vegetaes

Naturalistas

Bond	G. Bondar
DC	De Candolle
C Torr	C Torrend
F All	Freire Alemão
Kuhl	G. Kuhlmann
L	Linneu
M	Martius
S H	St Hilaire
V	Veloso



A

ABACADO — Abacate.

ABACAIBA — Aroeira. (Indistintamente).

ABACATE, ABACATEIRO — *Persia gratissima* Gaert. Laurácia arbórea muito cultivada. Fos lancioladas; fls. em panículas indefinidas, que não interrompem o crescimento do ramo; fr — drupa — variando de forma e coloração consoante as vars. Fos diuréticas. Madeira quebradiça.

—**BRANCO** — Abacate. Var apresentando o epicarpo verdoso ou verde escuro.

—**ROXO** — Abacate. Var apresentando o epicarpo arroxijado, quando maduro.

ABACAXI — *Ananassa sativus* Schul. var *pyramidalis*. Bromeliácia cultivada. Fos longas, acumuladas, fibrosas e coriáceas, umas radicantes, as superiores formando coroa à inflorescência. Esta transforma-se em volumosa infrutescência — "sorose" — de suti generoso sabor. A sp tem vars.

—**AÇU** — Ananás pelado.

—**AMARELO** — Abacaxi. Var em que a porção carnosa da sorose toma essa coloração — *Ananassa sativus* Schul., var *pyramidalis-aurea*.

—**BRANCO** — Abacaxi. Var em que a porção carnosa é descolorada — *Ananassa sativus* Schul., var *alba*.

—**BRAVO** — Gravatá.

—**DE TINGIR** — Gravatá branco.

—**DE TINTA AMARELA** — Gravatá branco.

ABACUÍ — Bicuíba.

ABAGERU — Ariú.

ABAJA — Nos de cola.

ABARAIBA — Aroeira.

ARARÉMO, ABAREMÓTOMO — Avaremótomo.

ABATI — Milho.

—**TIMBAI** — Jataí.

ABECEDÁRIA — Agríão do Brasil.

—**DO MÉXICO** — Vela da pureza.

ABI, ABI-IBA — Abio.

ABIO, ABIEIRO — *Lacuma caimito* R. e Child. Sapotácia arbórea, frondosa e ornamental. Fos coriáceas e lancioladas; fls axilares; fr — baga — comível. Madeira de lei. Sp resinifera.

—**DO PARA** — Caimito.

ABIORAMA — Abio.

ABJERU — Ariú.

ABÓBORA, ABOBOREIRA — Indíferas spa sarmentosas, especialmente Cucurbitácia e do Ge Cucurbita. São rasteiras, estolhosas, com latifólios palmados; fls amarelas e grandes frs bacáceos — "peponídios" — cambiantes na forma e no volume, consoante as vars.

—**ALMISCAR** — Abóbora cheirosa.

—**AMARELA** — Gerimú (Impreciso, pois os frs de várias sps congêneres usam a mesma coloração.)

—**BRANCA** — Abóbora d'água.

—**CABAÇA** — Abóbora d'água e A. de carneiro. (Mais cabível à primeira sp).

—**CARNEIRA** — Abóbora moganga. Impreciso, presta-se a confuzão com a A. de carneiro, de outra Fa.

—**CATINGA** — Abóbora cheirosa.

—**CHEIROSA** — Cucurbitácia que se caractORIZA pelo cheiro almiscarado das fls. Os frs são forrageiros. A sp apresenta muitas vars.

—**D'AGUA** — *Lagenaria vulgaris* Schr. Cucurbitácia de frs. com epicarpo verdoso, alongado, e lenhoso, podendo servir de coité e mesocarpo alvo, muito apreciado. Tem sido estimada como var da A. moganga.

—**DA GUINÉ** — Abóbora moganga.

—**DE CARNEIRO, A. CARNEIRO** — Cabeça.

—**DE EMPIGEM** — Abóbora de verrugas.

—**DE CONSERVA** — Abóbora menina.

—**DE PORCO** — Abóbora moganga.

—**DE QUARESMA** — Abóbora moganga.

- DE VERRUGAS — Cucurbita verrucosa L. Cucurbitácia com frs. verrucosos, considerada uma das vars da A. moganga.
- DO MATO — Melothria pendula V. Cucurbitácia de fos lobadas, fls em cachos e frs apenas de alguns centímetros Drástica.
- GERIMUM — Gerimum.
- GIGANTE — Abóbora menina.
- GRANDE — Abóbora menina.
- JAPONESA — Abóbora cheirosa.
- JURUMÚM — Gerimum.
- MELÃO — Abóbora menina.
- MENINA — Cucurbita maxima Duch. Cucurbitácia que se caracteriza pelo tamanho dos frs, podendo atingirem 100 quilos, e não serem da melhor qualidade.
- MOGANGA — Cucurbita pepo L. Cucurbitácia reptante ou trepadeira, com latifólios espinescentes, frs amarelas e grandes frs, cambiando de configuração com as vars.
- MONSTRUOSA — Abóbora menina.
- MORANGA, MURANGA — Abóbora moganga. Vid também Moranga.
- PORQUEIRA — Abóbora moganga.
- SACO DE VIAGEM — Abóbora cheirosa.
- SARDOSA — Abóbora de verrugas.
- SERPENTE — Trichosanthes sanguinea L. Cucurbitácia com latifólios lobados, fls. albas e peponídeos longos e curvos. Purgativa e vermicífuga.
- VERDE — Abóbora d'água.
- ABOBORINHA DO MATO — Taiuá.
- DO NORTE — Buchinha.
- ABOBRA, ABOBREIRA — Abóbora, Abóboreira.
- ABOBORINHA DO MATO — Purga de caboclo e Taiuá.
- ABOGERU — Ariú.
- ABRICÓ, ABRICOTEIRO — Mammea americana L. Guttifera frondosa e ornamental. Fos rijas e lustrosas; fls albas e axilares; fr — drupa — de polpa apreciada, comida em doces ou crua. Madeira de lei.
- DAS ANTILHAS — Lucuma pauciflora DC. Sapotácia de fos ovoides, fls axilares e bagas comestíveis. Tem o mesmo sobrenome o Abricô.
- DE MACACO — Couroupita surinamensis M. Lecitidácia de grande porte. Fos oblongas e pilosas; fls albas e caulinares; fr. capsular comível.
- DE SÃO DOMINGOS — Abricô.

- DO NORTE — Abricô.
- DO PARÁ — Abricô.
- SELVAGEM — Abricô.
- ABRICOTE — Abricô.
- ABSINTIO, ABSINTO — Losna.
- MAIOR — Losna.
- MARITIMO — Artemigem da praia.
- VULGAR — Losna.
- ABUTINHA — Parreira brava.
- ABUTUA — Parreira brava.
- DA TERRA — Parreira brava.
- DE BATATA — Parreira brava.
- GRANDE — Parreira brava.
- LEGITIMA — Parreira brava.
- MIUDA — Parreira brava (C. fl. pendula).
- PRETA — Parreira brava.
- ACÁ — Mamorana
- ACÁCIA — Ge de Leguminosas, bem representado pela Espenjeira.
- ANGICO — Angico.
- ASIÁTICA — Albisia.
- AUSTRALIANA — Albisia.
- ACACIROBA — Erva capitão.
- AÇAFATE DE PRATA — Alice.
- AÇAFLOR — Curcuma.
- AÇAFRÃO BASTARDO — Açafrão.
- DA INDIA — Curcuma.
- DA TERRA — Curcuma.
- INDIGENA — Açafrão.
- AÇAFROA — Bixa olerana L. Bixácia arboreta elegante e cultivada. Fos cordiformes; fls róseas em panículas; fr — cápsula — eriçado de picantes, contendo sementes que encerram matéria corante aproveitada até em culinária. Apresenta 2 vars: "sanguínea", de frs. sempre encarnados, e a "verde" em que os meios envermelhescem na maturação. São ricos em vitaminas. Trata-se de apelido puramente regional; fora da Bahia ele corresponde ao Carthamus tinctorius L. e especialmente à Curcuma.
- DA BAHIA — Açafrão.
- DA INDIA — Curcuma.
- DO BRASIL — Açafrão.
- INDIGENA — Açafrão.
- AÇAFROEIRA — Nyctanthus arbortristis L. Oleácia arbórea e ornamental. Fos ovalares e opostas; fls albas, odorantes formando capítulos; fr capsular. Tuberas édules. Fls contendo matéria corante, utilizada em culinária. O mesmo apelido corresponde à Açafrão da Bahia.
- AÇAI — Assai.
- ACAIÁ-ACU — Cajá manga.
- ACAIABA — Caju.

ACAIOU — Cajá.
ACAIUIBA — Caju.
ACAJÁ — Cajá.
ACAJAIBA — Caju e especialmente Cajá.
ACAJU, ACAJUEIRO — Caju.
 —**AÇU** — Caju-açu.
ACAJUBA — Caju.
ACAJU CATINGA — Cedro batata.
ACAJUÍ — Cajúi.
ACAJUIBA — Caju.
ACAJU MIRIM — Cajui.
ACALIFA — Euforbiáceas do Ge *Acalypha*. Erbáceas, sub arbustos e mesmo arboretas, muitas das quais são cultivadas como ornamento, pela beleza e abundância de suas flores. Flores em espigas pendentes, de somenos importância. Dentro as decorativas, que se contam por muitas dezenas, destacam-se a *Acalypha wilkesiana* M. e Arg., de amplas flores encarnadas e sua var. *lilacina*, de flores verdes com manchas claras; *A. godseffiana* Meis e sua var. *marginata*, de flores verdes e bordas amarelas dentre outras. Vid. Tapa buraco.
 —**DOS JARDINS** — Acalifa. Todas as espécies ornamentais.
ACAMBUÍ — Cambuí (Indistintamente).
ACAPOCIBA — Flor de São João (Alamanda).
ACAPORA — Sabugueiro.
ACAPU DO IGUAPO — Acapurana.
ACAPURANA — *Campsandra laurifolia* Bth. Leguminosa arboreta, de cortezas com fibras texteis, tido como febrífugo e tônico. Madeira preciosíssima.
ACARA — Vid Cara e Inhame.
ACARARIÇABA — Erva capitão.
ACARI — Sucupira.
ACARIÇABA — Erva capitão.
ACARIÇOBA — Erva capitão.
 —**DA MIUDA** — Erva capitão da miuda.
ACARIRABA — Erva capitão.
ACATAIA — Casca de anta e, especialmente, a Capiçoba.
ACAUIBA — Caju.
ACELGA — *Beta vulgaris* L. Var. alba. Quenopodiácea erbácea. Amplas folhas radicantes; flores axilares. Aprecinda hortaliça pelas suas folhas de sabor carnosinho. Apresenta variedades.
 —**BRANCA** — Aceiga.
 —**CAMPESTRE** — Aceiga (Injustificavelmente, porque é espécie cultivada).
 —**VERMELHA** — Beterraba.

ACÉLICA — Aceiga.
ACENDE CANDEIA — Candeia.
ACHIOTE — Açafrão (Da Bahia).
ACINTRO — Losna.
ACIPRESTE — Cipreste.
ACMELA — Agrimônia do Brasil.
ACUARAMURO — Grão de galho.
ACVIA CAVALO — Erva de sapo, Maria preta e as Trincas do Ge Lunes — *L. Chrysophyllum* L., *L. paniculata* e especialmente a conhecida por Ivitinga.
—CAVALO BRANCO — Ivitinga e outras Lúrias.
ACVITE DE CAVALO — Vid Açoita cavalo.
ACUCENA — Várias Liliáceas, bulbosas e ornamentais e algumas Amarielídeas. Vid Lebora beterranea e Ri da imperatriz.
 —**BRANCA** — Lírio branco.
 —**DO AGUA** — Lebora cecena.
 —**DO BICHO** — Trombeta (Indistintamente).
 —**DO MATO** — Possoqueria latifolia R. e Chul. Rubiácea arboreta e ornamental.
 —**DO RIO** — Carapitácia.
ADELAIDE — Bons dias.
ADELAIDINHA — Bons dias.
ADERNE — Aderno.
ADERNO — *Astronium communum* Jacq. Anacardiácea de grande desenvolvimento. Flores compostas; flores em paniculas; drupas coriáceas. Excelente madeira para obras externas.
 —**PRETO** — *Astronium concinnum* Schot. Anacardiácia. Var de Aderno.
 —**VERDADEIRO** — Aderno.
 —**VERMELHO** — *Astronium speciosum* Schot. Anacardiácia. Vara de Aderno.
ADIANTO — Avenca (Indistintamente).
ADICURU — Nicuru.
ADINA — Erva de São Martinho.
ADLAI — Designação, já preferida, da Lágrimas de Nossa Senhora.
AGAPANTO — *Agapanthus umbellatus* L. Liliácea decorativa, com flores em umbelas de longa raque, de várias cores, além da roxa. Pouco cultivada na Bahia.
AGARRA PINTO — Pega pinto.
AGAVE — Sisal, Vela da pureza e outras Amarielídeas do Ge Agave. Muito imprecisa somente a designação genérica.
 —**DO MÉXICO** — Vela da pureza.
AGAVEA — Vid Agave.
AGERATO — Mentrasto.

AGERU — Airú.

AGLAIA — *Aglaiia odorata* Lour. Melíacia ornamental. Árvore de folhas compostas, fls. em cachos, aromáticas, amarelas e outras colorações, usadas em perfumaria.

AGNO-CASTO — Alfazema.

AGONIA — Agoniada.

AGONIADA — *Plumiera lancifolia* Muel. Apocinácia arbórea. Longifólios lanceolados; fls. albas em cimeiras; fr. siliqua, com sementes adorativas. Lactífera. Passa por emenagoga, purgativa e resolutiva. Sp. congênere com o mesmo apelido: *P. microphylla*.

AGOUTIQUEPE — Araruta.

AGRADOS — Brinco de princesa (Fuchsia).

AGRÃO — Agrão (Indistintamente).

AGRÃO — *Nasturtium officinalis* R. B. Crucífera hortense, erbácia e hidrófila. Fos compostas e comíveis, mesmo cruas; fls. albas em pequenos rácimos. Contem ferro, iodo e potássio. Diurético, estimulante, peitoral e tônico.

BRAVO — Agrão de lagoa.

DA EUROPA — Agrão.

DA FONTE — Agrão.

D'ÁGUA — Agrão.

D'ÁGUA CORRENTE — Agrão.

DA ILHA DE FRANÇA — Agrão do Brasil.

DA LAGOA — *Nasturtium officinale* Cham. Crucífera erbácia de folhas compostas pinadas; fls. albas, em cachos; fr. siliqua. Tido como anti-escorbútico, diurético, colagogo e expectorante.

DAS HORTAS — Agrão.

DO BRASIL — *Splianthes acmella* Mur. Composta erbácia e erecta. Fos elípticas; fls. em capítulos cônicos e erectos, de sabor acre. Excitante e odontalgico. Vars: a uleaginosa e a olerácea, de folhas comíveis.

DO MATO — Agrão de lagoa.

DO MÉXICO — Chagas.

DO PARÁ — Agrão do Brasil.

GRANDE DO PERU — Chagas.

MAIOR DA ÍNDIA — Chagas.

ORDINÁRIO — Agrão.

SILVESTRE — Agrão do Brasil.

AGRIPALMA — *Leonurus cardiaca* L. Labiada do mesmo tipo do Cardão do frade. Estomáquica e melifera.

AGUAQU — Babaçu.

AGUA DE COLÔNIA — Cardamomo.

DE ALEVANTE — Cardamomo.

— DE LEVANTE — Cardamomo.

AGUA-PÉ — (Cousa redonda e chata (T. Sampio) e deve caber especialmente às Ninfeáceas, de folhas em tais condições, segundo A. Neiva). Designação da Baroneza, de algumas Ninfeáceas e da Gencianácea — *Limnathelium peltatum* Gmel. Sp. hidrófilas.

— BRANCO — Golfinho.

— DA MEIA NOITE — Golfinho.

AGUARACUINHA — Pimenta de galinha.

— ACU — Crista de galo.

AGUARAIBA — Aroeira (Indistintamente).

AGUARAPONDA, AGUARAPONGA — Gervão.

AGUARAQUINHA — *Heliotropium elongatum*. Borraginácia arbustiva. Fos rugosas e oblongas; fls. em espigas curvas; fr. capsular. Considerada como adstringente, diurética e peitoral.

AGUARAQUIJUNHA, AGUARAQUIJUNHA ACU — Crista de gaço (*Heliotropium*).

AGUAXIMA — Capeba e mais ajustada à Guaxima.

AJARA — Cumari.

AIMARA POSOQUERI — *Posequeria longiflora* Aubl. Rubiácia arbórea de folhas longo ovalares, fls. longo tubulosa e aromáticas e fr. — bagas comíveis.

AIPÉ — Ipê (Indistintamente).

AÍPI, AIPIM — *Manihot dulcis* Pax. Euforbiácia arbustiva e cutivadissima. Fols palmati partidas; fls. amarelas em cachos. Fols comíveis e excelente forragem. Vale momente pelas ras tuberosas, que podem até pesar 12 quilos. Apresenta algumas var., sendo muito estimada a Palmata ou "Aipim caçau", de coloração rosa na porção profunda do cortex radicular.

CACAU — Vid Aipí.

ÁIPO — *Apium graveolens* L. Umbelífera herbácia e hortense. Fols muito folidas, fls. albas. Algumas sub sp. apresentam ras napiformes, apreciadas em culinária. Carminativo, diurético é excitante.

D'ÁGUA — Áipo.

DOS PANTANOS — Áipo.

ODORANTE — Áipo.

TRONCHUDO — Áipo.

AIRÍ, AIRIRÍ — Brejauva.

— ACU — Brejauva.

AIRÚ — Ariú.

AJEURARANA — *Hirtella ciliata* M.

Rosácea arbórea e Comandatuba.

AJUBA — Louro (Indistintamente).

AJURANA — Comandatuba.

AJURU — Ariú e Comandatuba. (Impreciso pela dup'a significação).

AJURUJURU — Ariú.

ALAMANDA — Flor de São João. Do Ge Alamanda, além das sps referidas

pelos seus nomes vulgares, consta existir na Bahia a *Allamanda oenotherifolia* Pohl., a *A. puberula* DC e a *A. schottii* Pohl.

CHEIROSA — *Dipladenia fragrans* DC. Apocinacia. Sp aromática.

DA FLOR GRANDE — Quatro patacas.

DE JACOBINA — *Allamanda blanchetii* DC. Apocinacia arbustiva, com fos. verticiladas e fls. campanuladas. Látex emético, porém tóxico em doses elevadas.

ALAMO — Choupo.

CIPRESTE — Choupo.

ALASTRADO — Espinhento.

ALBARA — Bananeirinha de jardim, Coquinho e algumas Canárias como a *Canna angustifolia* L.

ALBINA — *Turnera ulmifolia* L. Turnerácia sub arbustiva, com fos. oblongas, fls. amarelas e fr. capsular. Adstringente, expectorante e tônica. De suas vars. distingue-se a elegans.

ALBISIA — *Albizia moluccana* Miq. Leguminosa arbórea; madeira de lei.

ALCACHOFRA DA TERRA — Topinambo.

DA JERUSALEM — Topinambo.

DO CANADÁ — Topinambo.

ALCAÇUZ — *Periandra dulcis* M. Leguminosa arbustiva e polimorfa. Sp ornamental e que substitui o Alcaçuz europeu. Ra expectorante. Tem o mesmo apelido, a Vassoura de relógio (Sida).

BRAVO — Boi gordo.

DA AMÉRICA — Jequiriti.

DA TERRA — Alcaçuz e Vassoura de relógio.

DE MINAS — Alcaçuz e Vassoura de relógio.

DE SANTA CATARINA — Barba de São Pedro.

DO BRASIL — Alcaçuz e Vassoura de relógio.

DO CERRADO — Vassoura de relógio.

INDIANO — Jequititi.

SILVESTRE — Jequititi.

ALCANFÔR, ALCANFOREIRA —

Curraleira. Impróprio, porque compete à Cânfora ou Alcanfôr.

DO CAMPO — Curraleira.

ALCARAVIA — *Carum carvi* L. Umbífera erbácia, de ramos difusos, fos compostas e fls em umbelas. Sementes aromáticas, carminativas e diuréticas.

ALECRIM — *Rosmarinus officinalis* L. Labiada erbácia e cultivada, com fos longo elípticas, fls axilares e fr. aquênio. Sp muito aromática.

BRAVO — *Lantana microphylla* M. Verbenacea arbórea. As fos fornecem óleo para perfumaria. Madeira de lei. Confunde-se com o Alecrim do campo.

DA PRAIA — *Bulbostylis capillaris* C. e B. Ciperácia erbácia, com fos lineares, fls em espigas de espiquetas e fr aquênio. Passa por anti reumática.

DAS HORTAS — Alecrim.

DAS PAREDES — Barbasso.

DE CASA — Alecrim.

DE CHEIRO — Alecrim.

DE SÃO JOSÉ — *Portulaca pilosa*. Portulácia prostata. Fos iancioladas, pilosas e coriáceas; fls encarnadas ou amarelas; fr capsular. Além de comíveis, as fos são amargo-tónicas e emolientes. Tem o mesmo apelido, o Amor crescido.

DO BREJO — *Caconapea graciloides* Cham. Escrofulácia erbácia e hidrófila. Fos lineares e agudas; fls. axilares. Peitoral e contra o mau hálito.

DO CAMPO — *Lippia microphylla* Cham ou *L. thymoides* M. Verbenácia arbustiva e xerófita. Fos ásperas, creneladas e aromáticas; fls em capitulos. O Alecrim bravo tem o mesmo apelido.

DO MATO — *Baccaris calvescens* DC. Composta arbustiva, com fos coriáceas e oblongas; fls em capitulos corimbiformes. É uma das Carquejas.

DO NORTE — Alfazema (A. castus)

DOS JARDINS — Alecrim.

ALEGRIA — Gerânia (As sps ornamentais).

DO LAR — Mariasinha sem vergonha.

DOS JARDINS — Pingo de lacre.

ALELÚIA — Azedinha, Cana fistula e Manduirana. Impreciso o apelido.

ALFABAR — Dandá.

ALFACE — *Latuca sativa* L. Composta erbácia e hortense, muito cultivada pelas suas amplas folhas comíveis. Apresenta as vars: *longifolia*, servindo de exemplo a "romana"; *crispa*, representada pela "frizada"; *capitata* ou "repolhuda". A denominada "paulista" corresponde às duas últimas vars.

—**COMUM OU CULTIVADA** — Alface (*As* sps comíveis).

—**D'AGUA** — Lentilha d'água.

—**DE CÃO** — Dente de leão.

—**DO GOLFO** — Lentilha d'água.

—**DO MAR** — *Ulva latuca* P.C. Ulvácia (Alga) erbácia encontradiça na orla litorânia e trazida pelas marés. Lembra a Alface e consta até ser também comível.

—**ORELHAS DE BURRO** ou **DE MULHA** — *Latuca sativa* L., var. *rotundifolia*, das muito encontradiças e de segunda categoria.

—**PAULISTA** — Vid A face. Var de primeira qualidade — *Latuca sativa* L., var *capitata-crispa*.

—**REPOLHUDA** — *Latuca sativa* L., var *capitata*, Vid Alface.

—**ROMANA** — *Latuca sativa* L., var *longifolia* ou *romana*. Var de Alface de fós muito longas e de primeira qualidade.

ALFACINHA — Alface do mar.

ALFAFA — *Medicago sativa* L. Leguminosa arbustiva e prolífica. Trifólios, fls violáceas e vagens espiraladas. Boa forragem; suporta 4 cortes anuais e é melhorativa do solo.

—**DO BRASIL** — Urinária.

—**DO CAMPO** — Urinária.

—**DO NORTE** — *Stylosanthes guianensis* Sw. Leguminosa erbácia, com fós compostas, fls dispotas em espigas e vagens articuladas.

—**RASTEIRA DO CAMPO** — Meladinha de cavalo.

—**VISCOSA** — Matineta e Meladinha de cavalo.

—**VISCOSA DA PRAIA** — Urinária.

ALFAIFA — Alfafa (*Indistintamente*).

ALFAVACA — *Ocimum fluminensis* V. Labiada erbácia, com fós ovalares, fls violáceas, em longas espigas e fr capsular. Sp aromática, servindo de condimento. Com o mesmo apelido, ha outras sps do mesmo Ge e os Mangericões.

—**CARPUNHA OU CARPÔNIA** — Alfavaca de cobra.

—**CHEIROSA** — *Ocimum basilicum* L. Labiada sub arbustiva e cultivada. Fós denteadas e ovalares; f's róseas, em espigas e bracteadas; fr capsular. Sp aromática, eupéptica e peitoral, com algumas vars.

—**DA GUINÉ** — Quiôô.

—**DE CHEIRO** — Alfavaca cheirosa.

—**DE COBRA** — *Piperomia pelucida* R.P. Piperácia erbácia, inculta e totalmente carnosa. Fós lobadas; f's em longas e delgadas espigas. Usada em gargarejos. Merece o mesmo apelido o *Piper carpunya* R.P. da mesma Fa., com fós cardiformes e longas espigas e a sp conhecida por Maricotinha.

—**DO CAMPO** — Quiôô.

—**VISCOSA DA PRAIA** — Meladinha de cavalo.

ALFAVAQUINHA DE COBRA — Alfavaca de cobra (*P. pelucida*).

ALFAZEMA — *Vitex agnus-castus* L. Verbenácia arbustiva. Fós compostas palmadas; fls em espigas azuladas; fr drupáceo. Muito aromática. Com apelido idêntico: Lavandula spica L. Labiada com fós simples e lineares, fls azuis e fr — capsula. Aromática, eupéptica e neuro-tônica.

ALFINETE DE NOIVA — *Ixora striata* L. Rubiácia arboreta. Sp muito ornamental pela abundância de suas umbelas de longas fls encarnadas. São também conhecidas as vars de fls alvas e coccineas.

—**DO MATO** — Courá bravo.

ALFINETES — Feijão da terra (*C. splendens*).

ALFÓSTICO DA TERRA — Amendoi.

ALGAS — Vid Alface do mar, Carvaiinho do mar e Sargaço.

—**VESICULOSAS** — Carvaiinho do mar.

ALGODÃO, ALGODOEIRO — Malváceas cultivadas, arboretas, arbustos ou sub arbustos do Ge *Gossypium*. As fibras que circundam suas sementes, constituem o "Ouro branco", o que define a importância das sps desse Ge. As sementes são oleosas. Numerosas são as vars, muitas delas apenas conhecidas por designações populares e oriundas destas sps: *Gossypium barbadensis* L., *G. hirsutum* L. e *G. religiosum* L. Com a mesma denominação, ha sps da mesma e outras Fas.

—**AMERICANO** — Algodão (*G. barbadensis*).

- BRAVO — *Hibiscus furcellatus* Ders. Malvácia arbustiva, de fós lobadas, fls róseas e fr capsular. O Algodão do brejo e o Canudo possuem o mesmo apelido.
- CRAVO — Algodão (*G. eligosum*) e especialmente a Butiá de corvo.
- CRIOULO — Algodão (*G. barbadensis*).
- DA COSTA — Algodão (*G. barbadensis*).
- DA GUINÉ — Algodão (*G. barbadensis*)
- DA INDIA — Algodão da praia.
- DA PRAIA — *Hibiscus tiliaceus* L. Malvácia arbórea, esgalhada e ornamental. Fós palmadas; fls de amplas corolas amarelas, roxas no centro; cápsula. Madeira alva e leve. Cultivado.
- DE SEDA — *Gomphocarpus brasiliensis* Four. Asclepiadácia arbustiva e inculta. Fós orbiculares. Frs característicos da sp., capsulares, pneumáticos com sementes providas de filamentos sedosos — "paina de seda".
- DO BREJO — *Hibiscus bifurcatus* Cav. Malvácia arbustiva, de fós lobadas, fls róseas axilares e fr capsular. Dá fibras têxteis. Fós resolutivas. Hidrófilo.
- DO MANGUE — Algodão da praia.
- DO MATO — Butiá de corvo.
- DO PANTANAL — Canudo.
- DOS PÂNTANOS — Canudo.
- FOLHA DE PARREIRA — Algodão americano.
- ALGODÃOZINHO DO CAMPO** — Cega olho.
- ALHO** — *Allium sativum* L. Liliácia hortense, erbácia e bulbosa, universalmente conhecida. Além de condimento, seus bulbos escamosos têm largas aplicações terapêuticas.
- BRAVO — Alho poró (Impróprio porque a sp é cultivada).
- DA CAMPINA — Alho do mato.
- DO CAMPO — Alho do mato.
- DO MATO — Cipura paludosa Aubl. Iridácia erbácia e bulbosa.
- ESPAÑOL — Alho grosso da Espanha.
- GRANDE — A'ho grosso da Espanha.
- GROSSO DA ESPANHA — *Allium scorodoprasum* L. Liliácia sub arbustiva e bulbosa. Fós ásperas e fls em umbelas. Substitue o Alho.
- MACHO — Alho poró.
- MOURISCO — Alho grosso da Espanha.

- ORDINÁRIO — Alho.
- POARO — Alho poró.
- PORÓ — *Allium porrum* L. Liliácia hortense, aromática e cultivada. Suas longas fós carnosas continuam-se com as túnica do bulbo, aliás pouco volumoso. Fls em umbelas. Apresenta var.
- PORRÃO — Alho poró.
- PORRO, PORRU — Alho poró.
- ROCAMBOLE — Alho grosso da Espanha.
- SILVESTRE — *Nothoscordum strictum* Kth. Liliácia erbácia, com fós lineares, fls em umbelas albas e espatuladas. Seus bulbos são pequenos. Tido como vermífugo.
- ALIAMBA** — Diamba.
- ALICE** — *Alyssum maritimum* Lam. Crucífera erbácia. Pequenas fós oblongas; fls albas em longas espigas eretas; fr siliqua. Para orla de canteiros.
- ALICURI** — Nicuri.
- ALIXIA** — Litchi.
- DA INDIA — Litchi.
- ALMÊCEGA, ALMECEGUEIRA** — *Protium heptaphyllum* Marc e sua var *brasiliensis*, *P. icicariba* Marc e outras sps que não se tem certeza existirem na Bahia. São Burseráceas aromáticas de ponderável desenvolvimento, interessantes pela "almêcega", resina do cortex de valor industrial e terapêutico. Fós compostas pinadas, fls em cachos, fr drupáceo e madeira de lei.
- ACU — Almêcega (Sp não identificada).
- BRAVA — Almêcega (Qualquer das sps).
- CHEIROSA, ou DE CHEIRO — Almêcega (Indistintamente).
- VERDADEIRA — Almêcega (*P. icicariba*)
- VERMELHA — Almêcega (*P. icicariba*)
- ALMECEGÃO** — Almêcega (Não identificada).
- ALMEIRÃO** — Chicórea.
- ALMESCA** — Almêcega (Indistintamente).
- ALMESCLA** — Almêcega (Indistintamente).
- ALMISCAR** — Almêcega (Indistintamente).
- ALOCASIA** — *Alocasia lowii* Hk., *A. metallica* Hk. e *A. zebrina* Hooh. Aráceas representativas do Ge *Alocasia*, especialmente ornamentais. Erbáceas ou sub arbustivas, são rizomatosas, com amplas fós sagita-

das, longamente pecioladas e ver-nicosas. Nem sempre a beleza de suas espatas, das sps congêneres, excedem em decoração tais fós, geralmente de nervuras salientes.

ALOE, ALOES — Babosa.

—**DOS SEM ANOS** — Vela da praca.

—**VERDE** — Pitcira.

ALPERCATA DE SÃO JOSÉ — Viú-vinha.

ALPERCEIRO DO JAPÃO — Caqui.

ALPISTA — Milho alpista.

ALPISTE — Milho alpista.

ALQUIRÍVIA — Alcarávia.

ALQUEQUENJE — Camapu.

ALTEA — *Althea officinalis* L. Malvacia erbácia e vivaz. Ra feculenta e expectorante. Fós comíveis; fls vistosas. Ornamental.

ALUINA — Losna.

ALUMÁ, ALUMAN — *Vernonia bahiensis* Toledo. Composta arboreta, ramosa e inculta. Fós lancioladas; fls em capítulos, dispostos em corímbio; fr aquênjo. Reputado amar-gotônico e diurético.

ALVARADO — *Scleria hirtella* Sw. Ciperácia erbácia, hidrófila e inculta. Fós lineares e hirsutas; fls em râculos de espiguetas.

ALVELÓZ — Aveláz.

AMABAPÁIA — Mamão.

AMAITIM — Tararanga.

AMAITINGA — Estramônio.

AMAJOUVA — *Ajouva brasiliensis* Meis. Laurácia arbórea. Fós coriáceas e lancioladas, tidas como cicatrizantes e emolientes; fls. em cachos.

AMANDUEIRA — Boi gordo.

AMANDURANA — Algodão do brejo.

AMANSA BESTA — Canela pimenta.

—**SENHOR** — Erva do diabo e Tipi.

AMANUÍ — Algodão (Indistintamente).

AMAPA DOCE — Condurú. (*B. parviflora*)

AMAPAIMA — Casca preciosa.

AMARANTE — Copaíba e Pau roxo.

AMARANTO — Veludo (Indistintamente).

—**BRANCO** — Veludo branco.

—**CAUDA DE RAPOSA** — Cauda de raposa.

—**GIGANTESCO** — Veludo grande e pontudo.

—**LOBOSO** — Suspiro.

—**MONSTRO** — Veludo grande e pontudo.

—**PIRAMIDAL** — Veludo grande e pontudo.

—**VERDE** — Brêdo.

AMARANTÓIDE BRANCO — Suspiro branco.

—**VIOLETA** — Suspiro roxo.

AMARAPARANA — Condurú.

AMARELA — Chuva de ouro (Orquidáceas). Apelido impreciso pois é conferido a outras sps.

AMARELINHA — *Thumbergia alata* Bog. Acantácia sarmentosa e inculta. Fós sagitadas, fls de corola amarela, de pigmentação roxa no centro. Forragem de segunda.

AMARELINHO — *Connarus favosus* Planc. Conariácia inculta e arbórea. Fós imparipinuladas, fls em cachos e fr folículo. Tem o mesmo apelido a Cana fistula.

—**DA SERRA** — Angustura.

AMARELO — Angustura e Pau roxo.

AMARGOSEIRA — Sabonete de sol-dado.

AMARGOSO — Vid Angelim. Pero-ba. Termo tambem de outras sps donde sua imprecisão.

AMARRA PINTO — Erva tostão.

AMBAIBA, AMBAUBA — Umbuba (Indistintamente).

AMBAURANA — Imburana (Indis-tintamente).

AMBÉ — Cipó ambé.

AMBEBA — Palmatória.

AMBIRA — Embira.

AMBOLÓ — Cajá.

AMBRETE — Quiabo de cheiro.

AMBROSIA — Mastruço (*C. ambrosioides*)

—**AMERICANA** — *Ambrosia artemisioides* L. Composta sub arbustiva e erecta. Penífólios alternos; fls em capítulos. Tônica e febrifuga.

AMBU, AMBUSEIRO — Umbú.

AMBUÍ — Ameixa da Bahia.

AMBUIAEMBO — Milhomens, especi-almente a *A. cymbifera*.

AMBURANA — Imburana (Indistin-tamente).

AMEIXA ALGODÃO — Arid.

—**AMARELA** — Ameixa do Japão.

—**DA BAHIA** — *Ximenia americana* L. Olerácia arbustiva. Fós lancioladas; cachos de fls amarelas; fr drupa amarela e comível, porém temida por conter ac prússico. Ma-deira de lei, leve e rósea.

—**DA ESPANHA** — Umbú.

—**DA TERRA** — Ameixa da Bahia.

—**DE CABOCLO** — Jambolão.

—**DE ESPINHO** — Ameixa da Bahia.

- DE MADAGASCAR — *Flacourtie ramentchi* Lour. Flacourtiácea arbórea e espinhosa. Fos vernicosas, fls axilares esverdeadas e fr drupáceo do tamanho da Cereja. Madeira dura e revessa. Serve para sebes vivas.
- DE TCHAMPACA — *Magnolia amarela*.
- DO BRASIL — Ameixa da Bahia.
- DO CANADÁ — Ameixa do Japão.
- DO JAPÃO — *Eriobotria japonica* Lind. Rosácea arbórea e ornamental. Fos elípticas e plissadas; fls aromáticas e pilosas; fr — baga — édula.
- DO PARA — Ameixa da Bahia.
- DO PERU — Pequi.
- MELGACHE — Ameixa de Madagascar.
- MOMBIM — Ameixa de Madagascar.
- SILVESTRE — Imburana (Indistintamente).
- AMEIXOA** — Ameixa, Ameixeira (Indistintamente).
- AMENDOBI** — Bacaba, porém mais cabível no Amendoi.
- AMENDOEIRA BRAVA** — Gingeira.
- DA AMÉRICA — Castanha do Pará.
- DA ÍNDIA — *Terminalia catappa* L. Combretácia de grande altura, envergadura e robustez. Latifólios luzidios; fls em pequenas espigas; fr — drupa comível, apesar de rico em ac tântico. Precioso ornamento, mormente nas praias; fixadora do solo, umbrosa e resistente aos temporais.
- DE ESPINHO — Pequiá.
- DO PARÁ — Castanha do Pará.
- DO PERU — Pequiá.
- DOS ANDES — Abricot de maeaco.
- AMENDOEIRANA** — *Melbomia axillaris* SW. Leguminosa erbácia do grupo dos Carrapichos, com trifólios, fls encarnadas, em cachos de longa raque, vagens aderentes. Impreciso o apelido, cabível às suas congêneres e à outra Leguminosa, — *Cassia splendida* L. — arbórea com belas fls amarelas e ornamental.
- AMENDOI, AMENDOIM, AMENDUM** — *Arachis hypogaea* L. Leguminosa sub arbustiva e cultivada. Tetrafólios; fls amarelas; frs vagens, que se desenvolvem no solo, também convidadoras "poliaquénios". Sp brasileira de grande valor industrial, especialmente pelo óleo de suas sementes saborosas.

- ACÁCIA — *Cássia argentina*.
- COMUM — Amendoi.
- DE ARVORE — Chichá.
- DE PAU — Chichá.
- DE VEADO — Favinha de capoeira.
- DO MARANHÃO — Amendoi rasteiro.
- FALSO — Ibita puita.
- RAJADO — Amendoi rasteiro.
- RASTEIRO — *Arachis prostrata* Bth. Leguminosa erbácia e ramosa. Fos compostas, fls amarelas e vagens. Excelente adubo verde.
- ROXO — Amendoi rasteiro.
- VERDADEIRO — Amendoi.
- AMOR AGARRADO** — Mimo do céu.
- AGARRADINHO — Mimo do céu.
- CRESCIDO — *Portulaca hirsutissima* Cham. Portulácacia rasteira e ramosa. Fos carnosas e oblongas; fls amarelas e fr capsular. Tido como diurético e emoliente; boa forragem. Onze horas tem o mesmo apelido.
- DE HOMEM, A. DOS HOMENS — Papoula de tres cores.
- DE MOÇA — Cosmos.
- DE NEGRO — Carrapicho rasteiro e Juiz de paz.
- DE VAQUEIRO — Alguns Carrapichos da Fa das Leguminosas e do Ge Melbomia.
- DO CAMPO — Carrapicho belo de boi.
- AMOREIRA AMARELA** — Tatajiba.
- BRANCA — *Morus alba* L. Morácia arbórea, esgalhada, de rápido crescimento e cultivada. Latifólios lobados; fls em espigas, que se transformam em infrutescências comíveis. Serve para a cultura do "bicho da seda". Do mesmo Ge existe ainda a sp "vermelha" e a "preta", consoante a cor da infretecência. Critério inconstante pois a "branca" usa tomar a coloração das congêneres.
- DA CHINA — Amoreira branca.
- DE ESPINHO — Tatajiba.
- DO BICHO DA SEDA — Amoreira branca.
- DO MATO — Apé.
- AMORES** — Vid Amor seco e Mar-melada de Cavalo.
- AGARRADINHOS, A. AGARRADOS — Mimo do céu.
- DE VAQUEIRO — *Melbomia supina* Brist. Leguminosa sub arbustiva, do grupo dos Carrapichos. Vid Amor de vaqueiro.
- DO CAMPO SUJO — Carrapicho (*M. affinis*).

- ENTRELAÇADOS — Mimo do céu.
AMORICO — Carrapicho beijo de boi.
AMOR IMPERFEITO — Amor perfeito da China.
— INGRATO — Ciumes de velha.
— PERFEITO — Viola tricolor L. Violácia erbácia e ramosa. Fos denteadas; fls de uma só coloração ou variegadas, consoante as numerosas vars, muitas delas conhecidas por nomes vulgares. As vars e os híbridos constituem o Amor perfeito cultivado, muito decorativo.
— PERFEITO BRAVO — Amor perfeito (Sp mater).
— PERFEITO DA CHINA — Torenia fournieri Lind. Escrofulácia erbácia e ramosa, com fos oblongas e opostas e fls com longas corolas, azuladas nas bordas. Ornamental.
— PERFEITO ESPANHOL — Amor perfeito da China.
— SECO — Várias Leguminosas dos Gcs Desmodium e Meibomia, conhecidas por Carrapichos.
ANAGOA DE VÉNUS — Trombeta branca.
ANAJÁ, ANAJAZ — Inajá.
— MIRIM — Catolé e Indaiá.
ANANAZ — Ananassa sativus Schul. Bromeliácia considerada sp mater do Abacaxi, com o qual guarda muita semelhança, sendo porém sua infrutescência menor, mais encarnada e menos saborosa.
— DE REDE — Ananáz pelado.
— DO MATO — Ananassa sativus Schul., var. bracteata. Bromeliácia silvestre, de fos rotas, bordas espinhosas e inflorescência menor que a do Ananáz, podendo ser tido como ancestral do Ananáz cultivado.
— MANSO — Ananáz cultivado e o Abacaxi.
— PELADO Ananassa sativus Schul., var sine-corona. Bromeliácia robustissima, epífita ou terrestre, com longas fos radicantes de mais de metro. Sua bela infrutescência, bem maior que a do Abacaxi e privada de coroa folhear, desagrega-se em inúmeros favos de mel bastante saborosos. É xerófito e tido como diurético.
— PROLIFERO — Ananáz pelado.
— SEM COROA — Ananáz pelado.
— VERMELHO DO MATO — Ananáz do mato.
ANANGA RECUIRA — Capiança.
ANA PINTA — Purga de caboclo e Taiuá de quiabo.
ANA SORTE — Laranjeira do mato.

- ANCINHO** — Unha de gato.
ANDÁ, ANDA — Andá-açu.
— AÇU — Joannesia princeps V. Euforbiácia de grande desenvolvimento. Tri ou tetrafólios; fls em paniculas; fr capsular com o feitio de côco — “Côco de purga”. A “joanesina”, retirada de seu córtex, é diurética e purgativa, muito energica.
— ÇU — Andá-açu.
— GUAÇU — Andá-açu.
ANDAIA — Attalea concentrista Bond. Palmácia do tipo da Piaçaba.
ANDAUÁ AÇU — Andá-açu.
ANDAZ — Andá-açu.
ANDIRA — Leguminosas de Ge Andira, melhor conhecidas por Ange-lins.
— IHA — Angelim amargo.
— UCHI — Angelim e spp afins.
ANDIROBA, ANDIROVA — Carapa guianensis Aubl. Meliácia alta e ornamental. Penífólios, fls axilares e fr capsular, com sementes oleosas, cicatrizantes, servindo para o fabrico de sabão e lubrificantes. Cortex adstringente, amargo-tônico e febrifugo. Com o mesmo apelido, o Fruto Amargo.
— SARUBA ou ARUBA — Andiroba.
ANDRÉ MOLEQUE — José moleque.
ANDREQUICE — Ichnanthus hambo-siflorus Doell. Gramínea arbustiva. Fos ríjas e lancioladas; fls em rácimos de espigas. Forragem mediocre. Com o mesmo apelido a Taboquinha.
ANDU — Cajanus indicus Spreng. Leguminosa arbustiva e cultivada. Fos compostas velutinas, fls amarelas e vagens contendo saborosas sementes, ligeiramente amargas, comíveis somente quando ainda imaturas e não secas.
— AÇU — Andá-açu.
— DO MATO — Anil.
ANDURA — Angelim (Indistintamente).
- ANGÁ** — Ingá (Indistintamente).
ANGÉLICA (dos jardins) — Polyanthes tuberosa L. Liliácia sub arbustiva e ornamental. Fls singelas ou dubradas albas ou róseas.
— (hortense) — Angelica archangelica L. Umbelífera sub arbustiva. Fos compostas e partidas; fls. em umbelas globóides. Ra e fr aromáticos, aproveitados em culinária e estimulantes. Córtez febrifugo.
— BRAVA — Angélica do mato.

- CHEIRONA — Angélica do mato. Cabe também à A. dos jardins.
- DA BOÉMIA — Angélica hortense.
- DE RAMA — Schubertia multiflora M. Asclepiadácia arbustiva, com folhas ovalares, fls em umbelas e odorantes. Sp lactífera, febrífuga e tónica.
- DO JAPÃO — Estefanótis.
- DO MATO — Guettarda angelica M. Rubiácia subarbustiva, com folhas oblongas, fls alvas e perfumadas, em cimeiras. Ra amarga, calmante, febrífuga e estomáquica.
- DO NORTE — Angélica do mato.
- DO SERTÃO — Angélica do mato.
- MANSA — Angélica do mato.
- ANGELICÓ — Milhomens, especialmente a A. trilobata.
- ANGELIM — Denominação geralmente de algumas leguminosas dos gêneros Ferreira, Tipuana, Hymenolobium e com especialidade Andira. Com o mesmo apelido é encontrada na Bahia uma Ocniácia, a *Ouratea vaccinoides* Engl. São arbustos ou árvores. As andiras, em sua maioria, são febrífugas. Madeira de lei.
- AMARELO — Araroba.
- AMARGO — Angelim amargo.
- AMARGOSO — Andira anthelmintica Bent. Leguminosa arbórea. Folhas imparipinuladas, fls rosáceas em cachos e vagens, com sementes vermicifugas. Córtez emético e purgativo. Tem o mesmo apelido a Araroba.
- ARAROBA — Angelim doce e, com especialidade, a Araroba.
- CÓCO — Andira stipulacia Bth. Leguminosa arbórea de folhas imparipinuladas, fls violáceas e em cachos; vagem de única semente. Córtez vermicifugo. Identificou-se à var. bahiensis.
- COR DE ROSA — Angelim doce, var. rosea.
- DA BEIRA D'AGUA — Angelim penima.
- DA FO GRANDE — Angelim amargo e A. da fo larga.
- DA FO LARGA — Andira excisa HBK. ou ainda Conacapouca americana Aubl. Leguminosa de grande porte. Córtez adocicado. Sp emética, febrífuga e insecticida. Tem o mesmo apelido o A. amargo.
- DE COCO — Angelim coco.
- DO CAMPO — Angelim amargo.
- DOCE — Andira fraxinifolia Bth. Leguminosa arbórea. Folhas compostas e foliolos estreitos, fls em pa-

- nículas e vagem grossa de uma semente. Estas, tidas como tóxicas, são amargas, purgativas e vermicifugas.
- DO MATO — Angelim doce.
- MACHO — Angelim amargo.
- PEDRA — Ferreira spectabilis Bth. Leguminosa de grande porte. Folhas imparipinuladas, fls rosáceas e fr. de uma semente e indecidente. Madeira de lei; córtex espesso.
- PENIMA ou PINIMA — Andira pisonis M. Leguminosa arbórea. Folhas coriáceas e imparipinuladas; fls ferrugíneas e vagem de semente única. Lenho de primeira.
- PINTADO — Angelim penima.
- PRETO — Angelim da fo larga e A. amargo. Impreciso pela dupla significação.
- RAJADO — Ingarana.
- ROSA — Angelim cor de rosa.
- UQUIRANA — Andira retusa Bth. Leguminosa arbórea. Adstringente e madeira de lei.
- VERMELHO — Angelim amargo.
- ANGELONIA — Angelonia blanchetii Bth. Escrufulíacea arbustiva de folhas lancioladas, fls axilares e fr. capsular.
- ANGICO — Leguminosas arbóreas do gênero Piptadenia. Madeiras de lei, resinas e essencialmente taníferas. Serve de tipo a P. rigida Bth. Árvore ornamental, com folhas pinadas de 2º grau, fls amarelas e vagens chatas e coriáceas. Mui tanífera e madeira de lei encarnada. Córtez adstringente, amargo e febrífugo.
- AMARELO — Angico.
- BRANCO — Piptadenia colubrina Bth. Leguminosa altissima, com folhas compostas de 2º grau, fls alvacentas e vagem longa e estreita. Especialmente tanífera; sua resina substitui a "Goma árabe".
- CEDRO — Angico.
- COCO — Angico.
- DE MONTES — Angico.
- DO BANHADO — Angico.
- DO CAMPO — Piptadenia macrocarpa Bth. Leguminosa de córtez encarnado e arbórea. Folhas pinadas de 2º grau, fls. alvacentas e vagens longas, estreitas, em rosários. Madeira de lei para obras externas. Resinifera e tanífera.
- FAVA — Angico do campo.
- PRETO — Angico do campo.
- RAJADO — Angico do campo.
- SURUCUCÚ — Catanduba.
- VERDADEIRO — Angico.

- VERMELHO — Angico e A. do campo.
- ANGIROBA, ANGIROVA** — Andiroba.
- ANGUSTURA** — *Cusparia trifoliata* Engl. Rutácia de grande porte. Trifólios lânciolados; fls de longa raque e fr capsular. Córtez resinoso, amargo-tônico e febrífugo.
- DE CHEIRO — Angustura.
- VENENOSA — *Cusparia toxicaria* Engl. Rutácia arbórea, de fos compostas e fr capsular. Tóxica e, no entanto, febrífuga.
- ANHAGÁQUIABO** — Pente de macaco.
- ANHAGAPUTURÚ** — Milhomens, mormente a *A. cymbifera*.
- ANHIUBA** — Canela sassafráz.
- DO BREJO — Canela sassafráz.
- ANIL, ANILEIRA** — *Indigofera tinctoria* L. Leguminosa sub arbustiva. Fos compostas; fls rôseas; vagens pequenas e recurvas. A sp dñ o "anil". Fos eupépticas e purgativas; ra calmante.
- BRAVO — *Tephrosia cinerea* Pers. Leguminosa arbustiva, formando touças. Penífólio, fls violáceas em cachos. Tóxico e narcótico. Tem ra tuberosa.
- ROXO — Anil.
- TREPADOR — Cortina dos pobres.
- VERDADEIRO — Anil.
- ANIMÉ** — Almêcega (Sem distinção de sp).
- ANINGA** — *Montrichardia linifera* Schot. Arácia sub arbustiva, hidrófila e ereta. Latifólios sagitados, fls em espigas e fr bacálio. Possue fibras têxteis. Com o mesmo apelido se encontram sps congêneres e ainda da mesma Fa o *Phyllodendron speciosum* Schot., do mesmo padrão, porém menor.
- ACU — Aninga (*M. linifera*).
- IBA — Aninga (*M. linifera*).
- PARA — *Difformbachia picta* Schot. Arácia arbustiva e ornamental. Fos ovalares, fls em espádices e baga verme-ha. Sp tóxica.
- UBA — Cipó imbé (Aninga no Amazonas).
- ANIS, ANIZ, ANIZO** — Erva doce.
- ACRE — Cominho.
- DA CHINA — Anis estrelado.
- DA PÉRSIA — Anis estrelado.
- ESTRELADO — *Ilicium anizatum* L. Magnoliácia sub arbustiva e cultivada. Fos elípticas, fls ama-
- rejas e frs — cápsulas — disposta, em estrela. Aromática, carminativa e estimulante.
- VERDE — Anis estrelado e Erva doce.
- ANONA DE ESPINHO MOLE** — Graveola.
- DOCE — Graveola.
- DO CHILE — Graveola.
- ANOTO** — Açafrão.
- ANSERINA VERMIFUGA** — Mas-truço.
- ANTIGONA** — Mimo do céu.
- ANTÚRIO** — *Anthurium bellum* Schot; *A. crassinervium* Anth; *A. lanciolatum* Anth; *A. radicans* Koch; *A. scandens* Engl. e outras muitas sps de Aráctias ornamentais, eretas ou sarmentosas que valem pela beleza de suas fos ou espádices. Algumas são epífitas.
- AOURA** — Dendê.
- APARAIU** — Maçaranduba.
- APAREIBA** — Mangue vermelho.
- APÉ** — *Brosimum gaudichaudii* Trec. Morácia arboreta e lactífera. Fos elípticas e coriáceas, fls monóicas em capítulos; fr — baga — purgativo. Tem o mesmo apelido o Golfinho, dentre outras sps.
- DO SERTÃO — Apé (*B. gaudichaudii*) e Condurú.
- APERCATA DE SÃO JOÃO** — Viu-vinha (*Z. pendula*).
- APERTA JOÃO** — Aperta ruão.
- RUÃO — *Piper aduncum* V. Piperácia arbustiva e tanífera. Fos oblongas; fls em espigas; baga pequena, acre, digestiva e diurética. Passa por anti blenorragico. Com o mesmo apelido: *Piper celtidifolium*, arbusto de cau articulado, fos elípticas e fls em espigas. Além do *P. aduncum* de Veloso, aqui registado, há o de Linneu.
- APERU** — Ariú.
- APIÓ** — Aipo.
- APRAIU** — Maçarandiba.
- APUI** — *Ficus nymphaefolium* Mil. Morácia de grande porte, do grupo das Gameleiras. Destas difere pelas amplas fos ovalares. Frs, pequenos figos — sicônios — inconfundíveis. Lactífera e madeira de lei.
- AQUAI** — Caimito.
- ARA** — Caládios (*C. bicolor*) e especialmente os Mangarás.
- ARARIBÁ** — Jurema branca.
- ARABUTA, ARABUTAN** — Pau Brasil.

ARAÇÁ, ARAÇAEIRO, ARAÇAZEIRO — Denominação de várias sps. geralmente do Ge Psidium da Fn das Mirtáceas. Estas podem ser árvores, arbustos ou arbúsculos, de fcs simples e adstringentes, fls albas e bagas comíveis. Algumas sps são rústicas, pouco exigentes e frutificando abundantemente.

—**AÇU** — Goiaba.

—**BRANCO** — *Psidium albicans* Camb. Mirtácia arbustiva, com fcs pilosas, fls axilares e baga ovoide comível. Melifera.

—**BRAVO** — Araçá cagão.

—**CACÃO** — *Psidium rufum* M. Mirtácia arboreta, copuda e elegante. Fcs luzidias, fls axilares e bagas piroides saborosas, dando excelente geleia.

—**DA PRAIA** — *Psidium littorale* Radd. Mirtácia do mesmo tipo do A. mirim, porém de fcs menores. Com o mesmo apelido a *Tocoyena bullata* M. Rubiácia silvestre e arboreta, com fcs escabrosas e fls amarelas de corolas longo tubuladas; fr drupa. A Açucena do mar tem o mesmo nome vulgar.

—**DAS ALMAS** — Araçá branco e mormente a Goiaba de polpa branca.

—**DE COROA** — Goiaba. Apelido impróprio pois quase todos os fcs das sps congêneres apresentam coroa, que é um vestígio do cálice (cálice acrescente).

—**DE PEDRA, A. PEDRA** — *Psidium oligospermum* M. ou *P. petrosum* V. Mirtácia arboreta de ramos difusos e tortuosos. Suas bagas, esféricas, apesar de saborosas, apresentam a maior parte da polpa petrificada.

—**DO CAMPO** — Araçá mirim.

—**GOIARA, A. GUIABA** — Goiaba.

—**GUACU** — Goinha.

ARAÇAI — Angelim amargo e, especialmente, o Araçá mirim.

ARAÇAIBA — Araçá mirim e especialmente todas as sps arbóreas. Daí a imprecisão do apelido.

ARAÇÁ MIRIM — *Psidium araca* Rad. Mirtácia arbustiva e espontânea. Fcs semi coriáciás; fls albas e axilares; bagas esféricas, acre-dóces, servindo para excelente geleia transparente. Fcs adstringentes.

—**MILUDO** — *Psidium microcarpum* Camb. Mirtácia sub arbustiva, com

os caracteres do Ge, apresentando as menores bagas, comíveis e apreciadas.

ARAÇANDIVA, ARAÇANDUVA — Araçá pomba.

ARAÇA PERINHA, PERINHO, PI-RIM — Araçá engão.

—**PIRANGA** — Araçá pomba.

—**POMBA** — *Psidium acutangulum* M. Mirtácia arbórea e elegante. Córtez alvo; fcs oblongas e membranosas; fls axilares; baga comível. Madeira alva e de lei.

ARAÇARANA — Araçá pomba e mais propriamente o A. da praia (*T. bullata*).

ARAÇATUNGA — Araçá pomba.

ARAÇA VERDADEIRO — Araçá miúdo.

ARAÇAZINHO — Araçá da praia (*P. littoralis*), A. mirim e A. miúdo.

ARACHICHA — Chichá.

ARACTI — Araroba.

ARACUÍ, ARACUÍM — Angelim amargo e Araroba.

ARACURI — Nicuri.

ARAMINA — Guaxima.

ARAPABACA, ARAPACABA — Lombrigueira e outras sps congêneres como a *Spigelia flemmingiana* C. e Schl. Loganiácia erbácia, purgativa e vermicífuga.

ARAPIRACA — Angico do campo.

ARAPOCA — *Raputia magnifica* Engl. Rutácia de grande desenvolvimento. Fcs digitadas; fls em espigas e fr capsular. Córtez cinzento; adstringente e febrífugo. Ornamental.

—**AMARELA** — Arapoca.

—**BRANCA** — *Raputia alba* Engl. Rutácia arbórea, de fcs compostas, fls em cachos e albas, com fcs capsulares. Tida como amargo-têncio e ictiósaga.

—**JUBA** — Arapoca.

—**VERDADEIRA** — Arapoca.

ARAPUÉ — Agoniada.

ARAPUTÁ, ARAPUTAN — Pau Brasil.

ARAQUIDA — Amendoi.

ARARAIBA — Araribá rosa.

ARARANDEUA — Ingarana.

ARARA PETIÚ — Visgueiro.

ARARAUVA — Potumujá. Potumujá amarelo.

ARARIBÁ (amarelo) — Potumujá.

—**CARIJÓ** — Quina vermelha do Brasil.

—**GRANDE** — Potumujá.

—**RAJADO** — Araribá rosa.

— ROSA — *Centrolebium tomentosum* Bth. Leguminosa de grande crescimento. Fos compostas, púbescentes na pagina dorsal; fls em cachos terminais; fr vagem alada. Sp resinifera e madeira de lei.

— ROXO — Quina vermelha do Brasil.

— TINGA — Araribá rosa.

— VERMELHO — Araribá rosa.

ARARICHA — Chichá.

ARARIVA, ARARUVÁ — Potumujá.

ARAROBA — *Andira araroba* Agui. Leguminosa de elevado porte. Paripinifólios; fls róseas, em cachos; vagem de uma semente, fornecendo esta o "óleo de Araroba". Do córtex retira-se o "pó de Goa" ou "pó da Bahia" — rico de crisarobina. Ictiófaga, usada nas lesões cutâneas e como purgativa.

— **AMARELA** — Araroba.

ARARUTA (corrotela de Arrow root)

— *Maranta arundinacia* L. Marantácia sub espontânea, prolífica e rizomatosa. Latifólios invaginantes; fls em panículas terminais; fr capsular. Forrageira e vermífuga. Rizomas feculentes.

ARATICÚ — *Araticum* (*Indistintamente*).

ARATICUM — Anonácia dos Ge. Rollinia e mormente do *Anona*. Arbustos e árvores de altura variável, hidrófilos e todos com o mesmo "ar de família". Lenho alvo e muito leve; frs bagas, com o aspecto de infrutescência, comíveis porém quase todas insípidas.

— **APÉ** — *Anona pisonis* M. Anonácia arboreta, de fos ovalares, lúzidas e bagas édulas, com sementes oleosas.

— **BRAVO** — *Anona salzmannii* DC. Anonácia frondosa, com fos elípticas e coriáceas, fls caulinares e fr bacálio. Arenícola. Impropiamente, tem o mesmo apelido a Mutamba.

— **CACÁ** — Araticum do brejo.

— **CAGÃO** — Araticum do brejo.

— **CATINGA** — *Anona foetida* M. Anonácia arboreta, com fos espessas e ovalares e fr — baga — de mau cheiro, próprio para os animais.

— **CHEIROSO** — *Graveola* e impropiamente a Pinha (Ata), pois não tem cheiro.

— **CORTIÇA ou DE CORTIÇA** — *Anona crassiflora* M. Anonácia arbustiva e tortuosa. Fos elípticas, fls

esverdeadas e bagas globoides, de polpa aromática e comível. Seu córtex espesso, serve para boias e bem assim suas ras.

— **DA BEIRA DO RIO** — *Araticum* de espinho.

— **DA LAGOA** — *Araticum* do brejo.

— **DA PRAIA** — *Araticum* cortiça.

— **DE BÓIA** — *Araticum* cortiça.

— **DE ESPINHO** — *Anona spinescens* M. Anonácia arboreta, de tronco espinhoso. Fos membranosas e elípticas e fr — baga — ovóide, com sementes aromáticas.

— **DE JANGADA** — *Araticum* cortiça.

— **DE PACA** — *Araticum* ponhê.

— **DO BREJO** (Jaca de pobre) — *Anona glabra* L. tambem dita *A. palustris* L. Anonácia arbórea e inculta. Fos elípticas e lúzidas e bagas glohóides, de polpa amarejada e enjoativa. Suas ras dão cortiça, prestante para boias, salva-vidas, rolhas etc. Faz jus ao qualificativo de cortiça — *Araticum* cortiça. Hidrófilo.

— **DO CAMPO** — *Anona cornifolia* S. H. Anonácia arbustiva, de fos ovalares e pequenas bagas comíveis.

— **DO MANGUE** — *Araticum* do brejo.

— **DO MATO** — Embira de *Araticum* e o *Ané*.

— **DO RIO** — *Araticum* de espinho.

— **DO SERTÃO** — *Araticum* cortiça.

— **GRANDE** — *Graveola*.

— **LISO ou DOS LISOS** — *Arasicium* bravo.

— **MANSO** — Fruta de conde.

— **MIRIM** — *Araticum* do campo.

— **PANA, PANAN** — *Araticum* cortiça, A. do brejo, A. ponhê, donde a imprecisão do apelido.

— **PARA** — *Araticum* do brejo.

— **PASSA** — *Araticum* do brejo.

— **PENTE** — Fruta de conde.

— **PITAIA** — Pinha (Ata).

— **PONHÊ** — *Anona marco-gravii* M. Anonácia arbórea e copuda. Fos lancioladas, fls caulinares e aromáticas, frs — bagas comíveis, elipsóides e espinescentes.

ARATICURANA — *Araticum* do brejo.

ARATICUTITÁIA — Pinha (Ata).

ARAUCARIA — Araucaria excelsa R. e Br. Pinácia muito cultivada como ornamental, esguia, piramidal e de grande altura. Sp semper virens.

—DO PARANA — Pinho do Paraná.

ARAUPÉ — Agoniada.

ARAXIXÓ — Pimento de galinha.

ARBUSTO DA INDEPENDÊNCIA — Folha da independência.

—MILAGROSO — Quisqualis indica L. Combretácia sarmentosa e ramosa. Fls encarnadas. Vermifuga e muito ornamental para caramanchões.

ARCO DE BARRIL — Sparattanthelium botucudorum. Ernandiácia arbustiva.

—DE PIPA — Erythroxylum pulchrum S. H. Eritroxilácia arbustiva, de folhas elípticas e fls axilares. Lenho flexível. Com idêntico apelido o *E. frangulaefolium* S. H.

—DE PIPA DO MIUDO — Arco de pipa (*E. frangulaefolium*).

ARECA BAMBU — Chrysalidocarpus lutescens Hort. Palmeácia de médio porte, formando touceiras. Estípite anclado e longas folhas pilinadas.

—IMPERIAL — Palmeira Imperial.

AREEIRO — Assacu.

ARGEMÔNIA — Cardo santo.

ARIURÍ — Nicurí.

ARICORI, ARICURÍ — Nicurí.

ARICUÍ — Nicurí.

ARICURIROBA — Nicurioba.

ARICURIROBA — Nicurioba. Bondon descreve como sp diferente a *Arikuryroba capanemae*, do mesmo tipo da primeira.

ARIELINA — Angelim da fo larga.

ARINA — Cana frecha.

ARIRI — Coccus vagans Bond. Palmeácia rasteira, xerófita e em toucas, própria das catingas. Fls e nozes servindo para o gado. O apelido cabia ao Coqueiro da praia e ao Piçandó.

ARIROBA — Potumujú. Impróprio, porque se ajusta melhor à Ara-roba.

ARISTOLOQUIA — Milhomens.

—MILHOMENS — Milhomens.

ARIÚ — Crysolabanus icaco L. Rosácea arbúsculo, com ramificação difusa, comum nas zonas litorâneas. Fos orbiculares e fr drupácia, com o feitio de Ameixa, com a qual poderá competir sendo melhorada.

ARIUVA — Araribé rosa.

ARIVÁ — Potumujú.

ARIXIXA — Chichá.

ARMOTO — Acafrosa.

ARNICA — Botão de ouro (*S. microglossa*).

—DO CAMPO — Avelôz.

ARNOTE, ARNOTO — Acafrosa.

ARUEIRA — *Schinus theobentifolius* Rad. Anardiácia arboreta, resinifera e tannifera. Fds compostas; lvs em euclos; fls — pequenas capsulas encarnadas. O cortex dá a "resina moie" ou "mastic americano", aconchente, hemostático e adstringente. Tem o mesmo apelido a *Lithraea molleoides*.

—BRANCA — Aroeirinha.

—BRAVA — Aroeirinha.

—COMUM — Aroeira.

—CORNEIBA — Aroeira.

—DA FLOR BRANCA — Aroeirinha.

—DA PRÁIA — Aroeira.

—DE CAPOEIRA — Aroeirinha.

—DE MINAS — Aroeira.

—DO AMAZONAS — Aroeirinha.

—DO CAMPO — *Schinus weinmanniæfolium* Engl. Anardiácia arbustiva, de folhas compostas, e fls axilares e em cachos, com fls — cápulas — encarnadas. Sp rústica. Tem o mesmo apelido da Aroeira (*S. theobentifolius*).

—DO MANGUE — Aroeirinha.

—DO SERTÃO — Aderno.

—FOLHA DE SALSO — Aroeirinha.

—JESUÍRA — Gonçalo Alves.

—MANSA — Aroeira.

—RASTEIRA — Aroeira do campo.

—VERMELHA — Arocira.

AROEIRINHA — *Lithraea molleoides* Engl. Anardiácia arbustiva e tortuosa. Fds imparipinuladas; fls em panículas; fr capsular esbranquiçado. Tanígera. Tida como var *raddiana* da Aroeira.

—DO CAMPO — Aroeira do campo.

AROMA, AROMAS, AROMO — Esponjeira.

ARRAJADEIRA — *Nicotiana glauca* Grah. Solanácia arbórea e elegante. Fds ovalares; fls, em abundantes cachos, de corolas amarelas; fr capsular. As fós são consideradas tóxicas.

ARRANHA GATO — Tres Marias.

ARREBENTA BOI — Arrebenta cavalo.

—CAVALO — *Isotoma longiflora* Presl. Campanulácia erbácea, tóxica e lactifera. Fds denteadas; fls alvas, de longa corola tubulosa; fr capsular. Tem o mesmo apelido o *Solanum aculeatissimum* Jacq. Solanácia do mesmo tipo do Babá.

- PEDRA -- Quebra pedra.
- ARRE DIABO** — Cansanção de leite, Penau e outras sps espinhosas, ou de pés urentes.
- ARREEIRO** — Assacu.
- ARRIOZES** — Carnica.
- ARROZ** — *Oryza sativa* L. Gramínea erbácea, ereta e universalmente conhecida. Forma touciras. Embora positivamente hidrófila há entre suas muitas vars uma rupestre, que se cultiva em lugares secos — o "Arroz da montanha" ou "A. de sequieiro".
- BRANCO** — Arroz.
- BRAVO** — *Homaloclenechus hexandrus* Kunt. Gramínea erbácia, hidrófila e rústica. Fos á peras e lancioladas; fls em espigas de espiguetas encarnadas; fr — aquênio. Boa forragem. Tem o mesmo apelido o Capim massambára.
- DA CAROLINA** — Arroz.
- DAS ÁGUAS** — Arroz do brejo.
- DE CACHORRO** — Capim bambu.
- DE CAJENA** — Androquice.
- DE COTIA** — Capim lixa.
- DE ESPINHO** — Arroz bravo.
- DE GOIANA** — Arroz bravo.
- DE VENEZA** — Arroz.
- DO BREJO** — *Luzula bahiensis* Stev. Gramínea erbácia e hidrófila, até das águas estagnadas. Sucessária do Arroz. Forragem. Tem o mesmo apelido a *L. peruviana* Pres.
- DO CAMPO** — Capim redondo.
- DO MATO** — *Chomelia obtusa* Cham. Rubiácea arbustiva, com pequenas fos ciliadas, fls embranquecidas e fr drupáceo. Lenho alvo.
- DO MORRO** — Arroz da montanha. Vil arroz.
- ARROZINHO** — Arroz bravo, Barba de São Pedro e Urinária, donde a imprecisão do apelido.
- ARROZ PALUSTRE** — Arros e especialmente o A. do brejo.
- SILVESTRE** — Arroz do brejo.
- ARRUDA** — *Ruta graveolens* L. Rutícea arbustiva, de cheiro ativo e tóxica. Fos fendidas, fls amarelas; fr capsular. Serve para afastar os maus olhos (1). Emenagoga, sudorífica e vermitífuga.
- COMUM** — Arruda.
- DA FOLHA MIUDA** — Arruda.
- DAS VINHAS** — Arruda.
- DOMÉSTICA** — Arruda.
- DOS JARDINS** — Arruda.
- FEDORENTA** — Arruda.
- ARSERINA** — Purga de caboclo.

- ARTEMIGE, ARTEMIGEM** — *Artemisia vulgaris* L. Composta erbácia e inculta. Fos fendidas; fls alvas, em capítulos; fr aquênio. Emenagoga, excitante, tônica e vermitífuga.
- DA PRAIA** — *Ambrosia humilis* V. Composta rústica, prolífica, do mesmo tipo da Artemige e das salsas litorâneas.
- DO CAMPO** — Artemige.
- MARÍTIMA** — Artemige da praia.
- SELVAGEM** — Artemige.
- VERDADEIRA** — Artemige.
- ARTEMIJA** — Artemige.
- ARTEMISIA** — *Artemisia scoparia* W. K. Composta erbácia, com fos penatífendidas e fls formando cachos de capítulos; fr aquênio. Forrageira. A Artemige tem o mesmo apelido.
- ARTICUM** — *Araticum (Indistinta)*.
- ARUMA, ARUMAN** — *Ichnosiphon aruman* Aubl. Marantacea erbácia, com latifólios ovalares, fls amarelas, em panículas, e fr capsular. Há outras sps, assim vulgarizadas. Não confundir com a Alumá, cd genuinamente bahiana.
- ARUMBEBA, ARUMBEVA** — Palmeira.
- ARUNDEUBA, ARUNDEUVA** — Aroeira (Indistintamente).
- ARVOFIRO** — Jquiriti.
- ÁRVORE CARRAPETA** — Bilreiro.
- COPAL** — Jatá, Jatobá.
- COPAL DO BRASIL** — Jataí, Jatobá.
- DA AVE DO PARAISO** — Barbás de barata.
- DA BISNAGA** — Espanólia.
- DA RORRACHA** — Seringueira.
- DA CASTIDADE** — Alfazema.
- DA CHIUSA** — Brauna.
- DA COMBUCA** — Sapucaria.
- DA CUIA** — Coitê.
- DA FEBRE** — Eucalipto, especialmente o E. globulus.
- DA FORTUNA** — Fo da fortuna.
- DA GOMA ELÁSTICA** — Seringueira.
- DA LA** — Barriguda (Indistintamente). Impreciso, pois muitas sps merecem o mesmo apelido.
- DA NÓZ** — Amondeira da Índia.
- DA PIMENTA** — Alfazema.
- DA PREGUIÇA** — Umbuba (Indistintamente).
- DA PUREZA** — *Yucca filamentosa* L. e *Y. gloriosa* L. Liliáceas ar-

bóreas e ornamentais, raramente ramificadas e com o aspecto de Palmeiras. Fos pinuladas, rígidas e verticiladas; f's terminais, em abundantes e belos rácimos terminais; fr capsular. A primeira se singulariza-se pelos longos fiamentos que se desprendem de seus folhos.

—DAS PATACAS — Tamboril.

—DAS ROSAS — Azálea.

—DAS TAPERAS — Cajá.

—DA TRISTEZA — Casuarina.

—DA TULIPA — Espanódia.

—DA VACA — Maçaranduba.

—DA VIDA — Cipreste, Carnaúba e Túia.

—DE ALHO — Pau d'alho.

—DE CAÇAMBA — Sapucáia (Indistintamente).

—DE CORAL — Avelôz.

—DE FOLHA PARIDA — Camboatá de rego.

—DE MACACO — Esponjeira e algumas Juremas.

—DE RANHO — Grão de galo.

—DE SABÃO — Saboeiro.

—DE SAO SEBASTIÃO — Avelôz.

—DE TROMBETAS — Umbauba. Cabe melhor à Trombeta.

—DE TUCANO — Pau de tucano.

—DE TULIPA — Espanódia.

—DO BRASIL — Pau Brasil.

—DO CAÇADOR — Árvore do viajante.

—DO CIAJACU — Algodão de seda.

—DO CARANGUELJO — Mangue (As sps das zonas marinhas e ribeirinhas).

—DO DRAGÃO — Sangue de dragão (D. drago).

—DO INCENSO — Alfazema.

—DO MAMÃO — Mamão.

—DO PÃO — Fruta pão.

—DO PARAIZO — Túia.

—DO SERO — Pau de seho.

—DO VINHO — Pau de tucano (V. thyrsoidea).

—DOS BORRACHUDOS — Sete casacas.

—DOS MELÕES — Mamão.

—DOS MOSQUITOS — Excoecaris pallida M. e Arg. Euforbiácia arbórea.

—DOS ROSARIOS — Sabonete de soldado.

—DOS VIAJANTES ou dos VIAJORES — Ravenala madagascariensis Sonn. Musácia de espiques cíndrico, longo e com o aspecto de Palmeiras. Fos membranosas como

as da Bananeira, dispostas em leque e de longo pedúlo, que perfurado dá água em jorro. Fls axilares; fr capsular. Sp decorativa e formando touças.

—FEDORENTA — Chichá.

—MARAVILHOSA — Mamona.

—PROVIDÊNCIA — Carnaúba.

—QUE MUITO FEDE — Pau d'alho.

—SANTA — Sabonete de soldado.

ASA DE ARARA — Papagáio.

—DE PAPAGAIO — Papagáio.

ASCLÉPIA — Cega oho.

ASPARGO — Espargo (Indistintamente). A sp hortense, o *Asparagus officinalis* L., não consta ser cultivada na Bahia.

ASSACU — *Hura crepitans* L. Euforbiácia de elevado porte, lactífera, espinhosa, cáustica e tóxica. Fos denteadas; f's em espigas; capsula multilocular, achatada no sentido do eixo. Córtez e ra anti-lúticos. Selva contra a lepra. Ictifagio.

—MIRIM — Jequiriti.

ASSAI (A melhor grafia é Açaí). AÇAIZEIRO — Euterpe oleracea M. Palmeira elegante, delgada e de médio porte, formando touças. Fos — penífolios; fls em espádice; drupas que servem para fabricação do delicioso "vinho de Açaí" ("Quem toma Açaí não sai daí").

—DA TERRA FIRME — Palmito doce.

ASSA PEIXE — *Vernonia ferruginea* Less. Composta arbustiva com fos e spicas, f's albas, em grandes paniculas e fr — aquênio. *Boehmeria caudata* Sw. Urticácia arbustiva, de fos ovalares, fls em espigas e fr — aquênio. Dá fibras têxteis. A ra passa por depurativa e diurética.

—PEIXE BRANCO — *Vernonia membranacea* Gardn. Composta arbustiva. Fos lancioladas que se prolongam pelo cau; fls em capítulos, em paniculas umbeliformes e de papus alvos. Tido como calmante.

—PEIXE DE GOIÁZ — Assa peixe branco.

—PEIXE DO PARÁ — Assa peixe.

ASTRÁPEA — *Dombeya viburniflora* Boy. ou *D. wallichii* B. Hk. Estereulíacia arboreta, copuda e ornamental. Amplas fos cordiformes; fls albas ou róseas em grandes inflorescências umbeliformes,

- lembando as das Hortâncias, embora pendentes.
- ATA — Pinha (Ata).
- BRAVA — Mutamba.
- DE LIMA — Graveola.
- ATANÁSIA DAS BOTICAS** — Catinga de mulata (*T. vulgaris*).
- ATAUBA — Bilreiro.
- ATCHI — Diamba.
- ATI — Pinha (Ata).
- ATOLÉ — Acafrosa.
- ATRACA MADEIRA** — (*Clusia sp*) Mangue cebola.
- AUACU — Babaçu.
- AUÍ — Araçá mirim.
- AUIBA** — *Myroxylon digynum* Bth. Leguminosa e a Facurtiácia — *Xylostea digynum* Ktz — arbórea espinhosa, de fos elípticas, fls em umbela, adstringente e aromática.
- AUIUVA — Auiba.
- AURORA** — Astrácea.
- DOS CAMPOS — Artemige (Indistintamente).
- AVAREMOTEMO** — *Pitheco obium* avaremetomo M. Leguminosa arbórea, de córtex suberoso. Fos piadas; fls esbranquiçadas e globoïdes; vagem. Lenho alvo; tanígero.
- AVELÓZ** — *Euphorbia tirucalli* L. Euforbiácia caetiniforme, arbórea e prolífica. Fos pequenissimas e raras; ramos articulados, verdosos e lactescentes. Temido até pelos animais, e tido como capaz de cegueira. Forma cercas intraspontâneas.
- AVENCA** — Inúmeras Polipodiárias, especialmente do Ge *Adiantum*. Erbáceas ou sub arbustos, de cau delgado e resistente, muito estimados pela delicadeza de suas fos (frondes). Algumas são conhecidas por Samambaias. Decorativas: *Adiantum capillus-veneris* L., *A. cuneatum* Lang e Fusc., *A. lunatum* Bur., *A. tenerum* Sw.
- COMUM — Avenca (*A. cap.-veneris*). Tida como peitoral.
- DA FOLHA MIUDA — Avenca (*A. cuneatum*).
- DE BICÃO — Avenca (*A. tenerum*).
- DO CANADÁ — Avenca (*A. cap.-veneris*).
- MIUDA — Avenca (*A. cap.-veneris*).
- AVENCÃO** — *Acrosticum aureum* L. Polipodiácia sub arbustiva, hidrófila e de grandes frondes; *Adiantum rhizophyllum* Schr., da mesma fls.
- DA BAHIA — Avenção (*A. rhizophyllum*).
- AVINEIRA** — Angelim (Indistintamente).
- AZALEA** — *Rhododendrum indicum* Sw. Ericácia arbórea, dificilmente aclimada na Bahia. Fos lançoladas; fls gamopetalas, consoante as vars, singelas ou dobradas, alvas ou encarnadas. Sp ornamental, podendo ser aparada como o *Ficus* (*F. retusa*).
- AZEDA** (rasteira) — *Oxalis repens* Thum. Oxalácia erbácia, de fos compostas, fls amarelas em pequenos grupos, e fr capsular. Sp rústica, usada em saladas. Há outras Vés com o mesmo apelido e até de fas diferentes.
- DA GUINÉ — Rosela.
- DE ILHÉUS — *Begonia bidentata* Radd. Begoniácia sub arbustiva, de fos elípticas e estipuladas; fls em paniculas albas e umbeliformes, com frs capsulares.
- DE TRES FOLHAS — Azedinha.
- DO BREJO — Erva azeda.
- DOS OURIVES — Erva azeda.
- MIUDA** — *Rumex acetocella* L. Poligonácia erbácia e calcicola. Fos oblongas e auriculadas; fls esverdiadas e em cachos; fr cariopse e amilácio. Sp rica em ac. oxálico.
- AZEDARACO, AZEDARAQUE** — Sabonete de soldado.
- AZEDA RASTEIRA** — Azeda.
- AZEDAS** — Rosela.
- DE OVELHA — Azeda miuda.
- AZEDA VERMELHA** — Rosela.
- AZEDINHA** — *Oxalis barrelieri* L. Oxalácia erbácia. Trifólios estipulados; fls albas ou encarnadas e fr capsular. Algumas são as sps conhecidas por esse apelido, como a *Oxalis corniculata* L. do mesmo tipo. Encerram ac. oxálico e as fos são comíveis.
- ALELÓIA — Azeda mluda.
- DA BAHIA — *Begonia bahiensis* DC. Begoniácia erbácia, com trifólios, fls róseas e fr capsular. Hidrófila; anti febril. *Oxalis bahiensis* Prog. Oxalácia erbácia, de fos compostas, fls amarelas e fr capsular. Tambem febrifuga.
- DAS PEDRAS — *Oxalis densifolia* Zuc. Oxalácia erbácia e erecta, com os caracteres das sps congêneres.
- DE FOLHA CORTADA — *Oxalis oxypetala* Porg. Oxalácia risoma-

- tosa e erbácia. Trifólios triangulares; fls em umbelas de longa raque; fr capsular.
- DO BREJO — Azeda e Azedinha da Bahia.
- DO CAMPO — *Oxalis campestris* M. Oxalácia erbácia e ereta, com trifólios ovalares, fls amarelas e fr capsular. E' também apelido da Azedinha vermelha.
- MIUDA — Azeda miuda.
- VERMELHA — *Oxalis hirsutissima* Zuc. Oxalácia erbácia, com trifólios hirsutos, fls amarelas e fr capsular. Usada em gargarejos.
- AZEITONA** — *Olea europaea* L. Oleácia arbórea e elegante que dá a Oliveira. Cultiva-se experimentalmente na Bahia.
- BRAVA — Tarumã e Azeitona do mato. Impreciso pela dupla significação.

- DOCE — Jambolão.
- DO MATO — *Rapanea ferruginea* Mez. Mircinácia arboreta, de folhas coriáceas, lancioladas e cor de ferrugem na face dorsal; fls em umbelas axilares; fr drupáceo.
- AZEVRE** — Babosa.
- AZOUGUE DO BRASIL** — Taiuiá, quiabo.
- DO CAMPO — Galinha choca.
- DOS POBRES — Taiuiá e a *Apodentera smilacifolia* Cog. Cucurbitácia que passa por ser anti-sifilítica.
- AZULÃO** — *Heliotropium ellipticum* Fres. Borraginácia sub arbustiva. Folhas elípticas e opostas; fls pequenissimas em espigas axilares, dispostas de um só lado da raque. Tem a pigmentação azulada em seus principais elementos.

B

BAAGEIRO — Guapuruvú.

BABÁ — *Solanum balbisii* Dum. Solanácia sub arbustiva, inculta e totalmente armada. Fos lobadas; fr — pequenas bagas — apetecido pelas crianças. Usada nas moléstias cutâneas.

BABAÇU — *Orbignia martiana* Rodr. Palmácia robusta e do Nordeste. Longas fos compostas e pinadas; fr drupa — Côco de Babaçu — 800 por safra, dando óleo de grande importância industrial. Dentre as sps destacam-se: *Orbignia eichleri* Dr., *O. microcarpa* M., *O. speciosa* M. e *O. spectabilis* M.

BABA DE BOI — *Coccus romanofiana* Cham. Palmeira alta, podendo apresentar dilatações no cau — estípite. Fos compostas pinadas e verticuladas; fr drupáceo mucilaginoso. Com o mesmo apelido: *Pavonia cancellata*. Malvácea rasteira, pilosa, com fls amarelas, apresentando mancha roxa na porção central da corola. Inculta.

—**DE BURRO** — Sete sangrias.

BABADO — Trombeta branca.

—**DE VIUVA** — Trombeta roxa.

BABEIRO — Flor de babado.

BABOSA — *Ajoe vera* L. Liliácia sub arbustiva e cultivada. Fos gordas, longas, de bordas espinhosas, com abundante mucilagem; fls tubulosas em rácimos erectos. Fornece a "aloina", glicósida purgativa e emenagoga. Há sps gêneras, algumas decorativas.

—**BRANCA** — Grão de gallo.

—**BRAVA** — Piteira.

—**DO MATO** — Antúrio (*A. crassivenium*).

BABOSO — Trombeta, especialmente a branca.

BABUNHA — *Guillema insignis* M. Palmácia de boa altura, espinhosa até nas fos, com frs édules, lenho negro e duríssimo.

BACABA — *Oenocarpus distichus* M. Palmácia de média altura, caracterizando-se pe'a disposição distica de suas fos — longas e pinadas — em um leque sobre o espique. Os frs, pequenos, orçando por mi-

lhares, fornecem óleo comestível e o afamado "vinho de Bacaba". São conhecidas outras sps dessa curiosa Palmeira.

—**ACU** — *Oenocarpus bacaba* M. Palmácia de espique delgado, média altura e anelado. Fos longas e pinadas, como nas Palmáceas em geral; fls espatuladas; fr drupáceo, de albumen oleoso, muito aproveitável e de pericarpo comível.

—**DE AZEITE** — Bacaba.

BACABAÍ — Bacaba.

BACABÃO — Bacaba aqu.

BACABUAI — Lixeira.

BACAIUBA — Macauba.

BACAMICÁ — Bacomichá.

BACANTA — Carqueja.

BACAPARI — Bacupari.

BACARIDA — Carqueja.

BACOMICHA, **BACOMIXA**, **BACUMIXA** — *Sideroxylon vastum* All. Sapotácia arbórea. Cortex laticifero, amargo e adstringente. Lenho fraco e alvo.

BACOPÁ — *Bacopa aquatica* Aubl. Escrofulácia rasteira e hidrofila. Fos lancioladas e amplexicaules; fls solitárias; fr cápsula. Tido como eupéptico, anti reumatismal e cicatrizante.

BACOPARI — Bacupari.

BACORI — Bacuri.

BACUPARÉ — Bacupari.

BACUPARI, **BACUPARIU** — *Rheedia gardneriana* Pl. e Tr. Guttifera arbórea e copuda. Fos luzidias e semi coriáceas; fls em umbelas; fr bacáceo, esférico, de polpa enjovativa. Ha outras sps com o mesmo nome, inclusive a Rubiácia — *Posoqueria acutifolia* M.

—**DA BAHIA** — *Salacia glomerata* Don. Hipocrateácia arbórea, com fos lancioladas, fls axilares e frs drupáceos.

—**DO CAMPÔ** — *Saiacia campestris* Walp. Hipocrateácia arbustiva, com fos lancioladas, fls esbranquiçadas e frs pequenos, drupáceos e mucilaginosos.

—**MIUDO** — *Salacia micrantha* Peyr. Hipocrateácia do mesmo tipo das precedentes, da mesma Fa.

BACURÍ, BACURIZEIRO — *Platonia insignis* M. Gutifera selvática de grande porte. Fos semi coriáceas; fls rosáceas, em cachos; Baga comível, de polpa mucilaginosa, prestante para compotas e sorvetes. Sementes oleosas, de agradável sabor.

BACURIBÍ — Guapuruvú.

BACURIAPARI — Bacupari.

BACURIUVA — Bacuri.

BACURÚ, BACURUBÓ — Guapuruuvú.

BADIANA — Aniz estrelado.

— DA CHINA — Aniz estrelado.

BAFUREIRA — Mamona.

BAGA — Mamona. Injustificável, pois cabe a numerosas sps.

BAGACEIRA — Tatajiba.

BAGA DA PRAIA — *Coccoloba uvifera* L. Poligonácia arboreta e esgalhada, do litoral. Latifólios coriáceos; fls em espigas longas; baga comível podendo dar bebida vinhosa. Sp tanífera e matéria corante.

— DE CABOCLO — Parreira brava.

BAGEIRO — Guapuruvú.

BAGO DE LOURO AMARELO — Embuia (*N. nitidula*)

BAGUAÇU — Babaçu (Indistintamente).

BAIANA — Bertalha.

BAINILHA — Baunilha (Indistintamente).

BAIONETA — Vela da pureza.

BAJAU — Pajau.

BALAMRAIA — Fedegoso.

BALANÇA OS CACHOS — *Sesbania negyptiaca* Per. Leguminosa arboreta e ornamental. Fos compostas; fls. meciadas de amarelo e violeta, em cachos pendulos.

BALÁOSINHO — *Cardiospermum anomajum* Cham. Sapindácia arbustiva e ornamental. Fos compostas, de folíolos fendidos; fls. albas em cachos; fr capsular vesiculoso e alado. C. *interimum* Rad. Sapindácia sarmentosa com fos compostas, fls albas e fr vesiculoso. Merece o mesmo apelido o Chumbinho.

BALATA — Maçaranduba.

BALIEIRA — Maria preta (*C. curacavica*).

— **PRETA** — Cambará (*L. camara*) e Erva poca.

BALSAMINA, BALSAMINA DOS JARDINS — Beijo de frade.

BALSAMINHA — Chá preto.

BALSAMO — Denominação conferida a certas sps e, bem assim, a seus produtos, de ação medicamentosa, geralmente resinas aromáticas.

DA AMÉRICA — Bálsmo de tolu.

— **DE AROEIRA** — Vid Aroeira.

— **DE CARTAGENA** — Bálsmo de tolu.

— **DE CHEIRO** — *Heliotropio (H. peruvianum)*.

— **DE CHEIRO ETERNO** — Bálsmo de tolu.

— **DE COPAIBA** — Vid Copaiba.

— **DE JACAREUBA** — Landim.

— **DE TOLU** — *Myroxylon toluifera* HBK. Leguminosa alta. Fos compostas — folíolos ovalares; fls albas, em rácimos eretos; vagem lembrando "pequena coruja". Madeira de lei, fornecendo o "Bálsmo de Tolu", usado nas moléstias pulmonares.

— **DE TRAPO** — Bálsmo de tolu.

— **DO ESPIRITO SANTO** — Óleo parado.

BAMBÃO — Babá. Tem esse nome também o eixo da infrutescência da jacé.

BAMBU, BAMBUZEIRO — Bambusa arundinacea Wild. ou *B. vulgaris* Schr. Gramínea alta, de co'mo lenhoso. Forma touceiras plumosas, de brotos radiculares, que se mantêm no solo indefinidamente, resistindo até às queimadas. Fixador das terras, demarcador de terrenos, combustível e inúmeras utilidades industriais, inclusive fornecer celulose para a fabricação de papel. Os brotos são comíveis como palmitos. Bom combustível. Muitas vars.

— **AMARELO** — Bambu dourado.

— **BENGALA** — Bambu chinês (*B. mitis*).

— **CHINÉS ou JAPONÉS** — *Asparagus plumosus* Bak. Liliácia sarmentosa com o aspecto de Samambaia. Ornamental. Bambusa mitis Poir. Gramínea alta, de colmo verde e fos verde claro, largas e compridas.

— **COMUM** — Bambu.

— **DA INDIA** — Bambu.

— **DOURADO** — *Phyllostachys aurea*. Gramínea que se destaca das sps congêneres pelo amarelo áureo do colmo.

— **IMPERIAL** — *Phyllostachys castillonis* Mitt. Difere do Bambu comum, pelo menor porte e pelo colmo, listrado de verde e amarelo.

BAMBURRAL — *Centranthus intermedium* Less. Composta erbácea e selvática. Can piloso e f's em capítulos; fr capsular. *Hyptis umbrosa* Salz. Labiada sub arbustiva

de fos denteadas e ovalares, fls em espigas e fr capsular. Carminativo, expectorante e tônico.

BAMBUSINHO — Bambu chinês e a *Olyra polypodioides* Trin. Gramínia erbacia estolhosa e hidrófila. Fos ovalares e verde escuras; fls em cachos de espiguetas axilares. Sp decorativa.

BAMBU VERDADEIRO — Bambu. — VERDE — Bambu chines.

BANANA, BANANEIRA — Designação de certas sps de Amariáceas, Aráctias, Marantáceas e mormente Musáceas. Algumas são decorativas, as mais importantes se recomendam pelas suas bagas, saborosas e muito nutritivas.

—**ANÁ** — Banana nanica (De referência apenas ao tamanho do fr.).

—**ANICA** — Banana nanica.

—**CATURRA** — Banana nanica.

—**CHINESA** — Banana nanica.

—**COMPRIDA** — Banana da terra.

—**CURTA** — Banana de São Tomé.

—**DA CHINA** — Banana nanica.

—**D'AGUA** — Banana nanica.

—**DA PRATA** — *Musa paradisiaca* L., var argentea. Sp representativa e conhecida, do Ge e da Fa das Musáceas. Desenvolve-se em touceiras. De seu cau — rizoma — surge longa fuste aéria — cauloma — formada à cesta das bainhas das fos. Floração em espigas; fr baga alongada com costelas longitudinais. Tidos como intutivos os frs das Musáceas, são hoje reputadíssimos, pelo seu alto valor alimentício e mesmo medicinal. Essa sp tem sido considerada a var *champa* da *Musa sapientum* L.

—**DA TERRA** — *Musa paradisiaca* L., var *normalis*. Musácia que difere especialmente da B. da prata e das sps congêneres pelo maior comprimento de seus frs e que são comíveis cosidos.

—**DE CAIENA** — Banana da terra.

—**DE CHIFRE** — Banana da terra.

—**DE IMBÉ** — Cipó imbé.

—**DE ITALIANO** — Banana nanica.

—**DE NICURÍ** — Sumaré.

—**DE RAPOSA** — Gravatá (B. karratas).

—**DE SÃO TOMÉ** — *Musa sapientum* Kunt., var *vittata*. Musácia de médio porte, com frs grossos, saborosos, especialmente assados ou em doces.

—**DE SEMENTES** — *Musa rosea* Jacq. Musácia representando as

spas primitivas e hoje raras do Ge *Musa*, com sementes bem desenvolvidas na polpa dos frs, que mesmo assim podem ser comíveis.

—**DO BREJO** — *Caladium striipes* Schot. Aracia palustre. Suas volumosas tuberas são comíveis. Fos ovalares e longo pecioladas; fls em espádices; fr — baga — também comível. Tem o mesmo apelido o Cipó imbé.

—**DO PARAIZO** — Banana de São Tomé.

—**DOURADA** — Banana ouro.

—**FIGO** — Banana de São Tomé.

—**IMBÉ** — Cipó imbé.

—**MAÇÁ** — *Musa paradisiaca* L. Musácia de médio porte, muito cultivada pela excelência dos frs, de polpa delicadíssima. Às vezes encontram-se, nos mesmos, núcios esclerosados que lhe diminuem o valor — pedras. A Maçaninha é uma de suas vars.

—**MAL** — Banana de sementes.

—**NANICA** — *Musa chinensis* Sweet. Musácia muito cultivada. Contrasta com seu pequeno porte o tamanho desmesurado de seus cachos (são propriamente espigas). Bagas longas, cilíndricas, recurvadas e de polpa muitíssimo adocicada.

—**OURO** — *Musa paradisiaca* L., var *regia*. Musácia com frs pequenos, parecidos com a B. maçá, porém de inferior qualidade. Polpa amarela-dada e docíssima.

—**RAJADA** — Banana de São Tomé (injustificável).

—**ROXA** — *Musa paradisiaca* L., var *violacea*. Musácia com bagas do feitio da Ba. de São Tomé, porém com o epicarpo arroxeado. Apresenta vars.

—**VERMELHA** — Banana roxa.

BANANEIRA BRAVA — Bananeira do mato e Bananeirinha do mato.

—**DA INDIA** — Bananeirinha de jardim.

—**DE LEQUE** — Árvore do viajante.

—**DE MADAGASCAR** — Árvore do viajante.

—**DO MATO** — *Heliconia bihai* L. Musácia sub arbustiva e inculta. Latifólios elípticos, longo peciolados e de bainhas envaginantes; fls encarnadas e bracteadas; fr cápsula com sementes esféricas. Serve de ornamento.

BANANEIRINHA — Bananeirinha de jardim.

- DA INDIA — Bananeirinha de jardim.
- DA JAMAICA — Bananeirinha do mato (*H. psittacorum*).
- DE FLOR — Bananeirinha de jardim.
- DE JARDIM — *Canna indica* L. Canácia sub arbustiva, rizomatosa, formando touças e muito decorativa. Latifólios; fls em espigas eretas, notáveis pela coloração de suas amplas corolas — amarelas, encarnadas, roxas e zebrinas — consoante as vars.
- DO MATO — *Heliconia brasiliensis* HK e *H. psittacorum* L. Musácia muito afina. Brácteas encarnadas e amarelas, sendo que na segunda sp tomam as cores do papagaio. Merce o mesmo apelido algumas Citâmnias dos Ges *Calathea*, *Canna* e *Heliconia*.
- PAPAGAIO — Bananeirinha do mato (*H. psittacorum*).
- BANDA DE SARGENTO** — Palmeira africana.
- BARABU** — Pau roxo.
- BARACOATIARA, BARACUTIARA** — Muiracotiara.
- BARAUGA** — Biculiba.
- BARAÚNA** — *Melanoxylon brauna* Schot. Leguminosa de grande desenvolvimento. Cau tortuoso, fos compostas pinadas, fls amarelas em cachos piramidais. Lenho incorruptível, para obras de luxo. Adstringente. Ornamental. Vid Brauna.
- BARAUNINHA** — Barauna.
- BARAUVA** — Brauna.
- BAQUIRUVU** — Guapuruvú.
- BARBADAÓ** — Barbadinho.
- BARBA DE BARATA** — *Caesalpinia pulcherrima* Sw. Leguminosa arbórea e decorativa. Fos compostas pinadas; fls em cachos eretas, piramidais, encarnados ou amarelos. Fos purgativas, tóxicas em maiores doses. Ra fornecendo matéria corante.
- DE BODE — Capim barba de bode.
- DE BODE DE VASSOURA — Capim rebo de burro.
- DE BOI — Carrapicho da calçada e C. de cavalo.
- DE LAGOA — *Enhydra sessilis* DC. Composta erbácea, com fos denteadas; fls em capítulos esferoides; fr aquênio.
- DE MACACO — Barba de velho
- DE PAI VENTURA — Barba de velho,
- DE PAU — *Usnea barbata* L. Usneácia pendula, ramosa, com aparelho reprodutor discóide. Tem o mesmo apelido a Barba de velho.
- OU BARBAS DE S. PEDRO — *Polygala paniculata*. Poligálacea erbácia e erecta. Fos lancioladas; fls em longas espigas, violárias. Diurética, vomitiva, expectorante. Lactífera. E uma das falsas Ipecas.
- DE TIMAM — Barbatimão.
- DE URSO — Mondo.
- DE VELHO — *Tillandsia usneoides* L. Bromélia epífita, filiforme e pendente. Fos lineares. Serve para embalagem e corduaria. Adstringente; anti reumática. Com o mesmo nome: *Tillandsia recurvata* L. Menor que a sp precedente.
- BARBA DE VELHO VERDADEIRA** — Barba de pau.
- BARBADINHO** — *Hedysarum barbatum* L. ou *Meibomia barbata* Bent. Leguminosa erbácia e pubescente. Trifólios alternos; vagens articuladas e pilosas. Forragem, do grupo dos Carrapichos, rica em proteinas.
- BARBASCO** — Barbasso, Verbasco do Brasil e os Tinguís.
- BARBASSO** — *Pterocaulon virgatum* DC. Composta erbácia, tida como diurética. Além dos Timbós e Tinguís, tem o mesmo apelido a *Jacquinia armillaris*. Teofrástacia tóxica, especialmente para os peixes.
- BARBATIMÃO** — *Stryphnodendron harbatiman* M. Leguminosa arbórea. Fos compostas; fls em cachos de espigas, com o aspecto de barbas; vagens carnosas. Riquíssimo em taníco. Emético e hemostático; o cortex dá tinta de escrever. Outras sp do mesmo G e com o mesmo apelido: *S. floribundum* Bth.; *S. gardneriana* Tul; *S. rotundifolium* M; a conhecida por Moisés e a *Dimorphandra gardneriana* Tul., da mesma Fa.
- BRANCO** — *Stryphnodendron polypodium* M. Leguminosa do mesmo tipo do Barbatimão.
- VERDADEIRO** — Barbatimão (*S. lechatman*).
- BARDANA** — *Arcticum lappa* L. ou *Lanpa tomentosa* L. Composta sub arbustiva de cau tomentoso. Fos ovalares; fls em cachos de capitulos; fr aquênio. Sucedânea da Sal-saparrilha. Com o mesmo apelido, o Carrapicho de carnelho e o C. grande.

—MAIOR — Bardana (*L. tomentosa*)

—MENOR — Carrapicho de carneiro.

BARIRIÇÔ — *Trimezia lurida Salis.* Iridácia erbácia, formando touças. Longifólios radicantes; fls sobre longa raque. Seus bulbos são depurativos e laxantes. A *Cypella chartacea M.* da mesma Fa. tem o mesmo apelido.

—DO MATO — Baririçô.

BARONEZA — *Eichornia crassipes* Solms. Pontederiácea erbácia hidrófila e assaz prolífica. Fos de longo pecíolo que apresenta na base uma dilatação — flutuador; fls. azuis. Como sua congénere *E. azurea Kth.*, ou *Pontederia aquatica V.*, dentre outras, desprende-se das margens dos rios, nas cheias, dificultando a navegação.

BAROUGA — Bicuiba.

BARQUINHA DE NOÉ — Trapoeira-ba açu.

BARRA — Algodão de seda.

BARRIGUDA — *Cavanillesia arborea* K. Chim. Bombacácia que apresenta grande dilatação mormente na porção inferior do tronco; fr capsular; lenho levíssimo e resinífero. A *Chorisia speciosa S H.*, sp. afim da mesma Fa., tem o mesmo apelido. Além do óleo das sementes, sucedâneo do "de Oliva", produzem excelente paina, que envolve as sementes, a conhecida "já barriguda". Com esse nome tornaram identificadas as Embiratanhas, Paineiras e Sumaumas.

—**DE ESPINHO** — *Chorisia ventricosa M.* e a *Celba pubiflora Schum.* Da mesma Fa. das Barrigudas e do mesmo feitio, singularizando-se pelos inúmeros e espessos acúleos caulinares. Rápido crescimento; ornamental.

—**LISA** — Barriguda (*C. arborea*).

BARRIGUDINHA — *Erlope hyperionides M.* Labinda sub arbustiva e inculta, apresentando, de notável, as dilatações em seus ramos, anegradas, lustrosas e ócavas, servindo de piteiras — como também são conhecidas — e produzidas por insetos.

BARRIGUDINHO — *Boeravia paniculata L.* e *C. Tich.*, var *lelocarpa*. Nictaginácea erbácia. Assim também é conhecida a Barrigudinha.

BARRIGUDO — Barriguda (Indistintamente).

BASEIUBA — Castiçal.

BASILICAO — Mangericão (Indistintamente).

BASILICUM GRANDE — Alfavaca cheirosa.

BASTAO DE SÃO JORGE — Espada de ogum.

BATALHA — Canela da fo larga.

BATANA — Bacaba.

BATÃO — Gonçalo Alves.

BATARRABA, BATARRAVA — Beterraba.

BATATA ALEMÃ — Batata americana.

—**AMERICANA** — *Solanum tuberosum L.* Solanácea erbácia e muito cultivada. Cau subterrâneo — tubérculo — que se ramificando no solo, forma outros tantos do mesmo teor em amiláceos e substância azotada, de grande consumo universal. Apresenta numerosas vars.

—**BRAVA** — Parreira brava.

—**CAINHA** — Batata doce (var amarela).

—**CHILENA** — Batata americana.

—**DA PRAIA** — Salsa da praia.

—**DA ANGOLA** — Batata doce, especialmente a vermelha.

—**DA ILHA** — Batata doce.

—**DA TERRA** — Batata doce.

—**DE BIRI** — Bananeirinha de jardim.

—**DE BÓTI** — Parreira brava.

—**DE EMERI** — Bananeirinha de jardim.

—**DE PARMENTIER** — Batata americana.

—**DE PURGA** — *Operculla convolvulus* Man., ou *Ipomoea operculina* M. Convolvulácia sarmentosa. Fos lobadas; fls. campanuladas e solitárias; fr capsular. Suas tuberas, fécientes e resinosas, dão a "purga de batata", depurativa e purgativa.

—**DE RAMA** — Inhame de Angola.

—**DE TEIÚ** — Taiuiá.

—**DOCE** — *Ipomoea batatas* Lam. Convolvulácia rasteira. Fos cordiformes; fls campanuladas. Suas ras transformam-se em tuberas que armazenam amiláceos e são procuradas pelo excelente sabor. Ramos e fos dão boa forragem. Consoante a coloração da polpa ou do tegumento das tuberas, têm-se as seguintes vars: branca ou leucorrhiza, amarela ou indívia, vermelha ou porphyrorhiza. Pelos nomes vulgares distinguem-se: Orelha de onça, Viuvi arrependida, da fo fina, da rainha, Americana, Porto-riço, Roxa, Santo Antônio e outras.

- DOCE DA BRANCA — Vid Batata doce.
- DOCE DA FOLHA REDONDA — Batata doce (var. *indivisa*).
- DE ANGOLA — Batata doce (var. *porphyrorhizis*).
- DO MAR — Salsa da praia.
- DO REINO — Batata americana.
- INGLES — Batata americana.
- PORTUGUESA — Batata americana.
- PURGANTE — Batata de purga.
- BATATARANA** — *Vigna repens* Ktz. Leguminosa sarmentosa e litorânia. Trifólios, fls amarelas e vagens curvas. Boa forragem.
- BATATA ROXA** — Vid Batata doce (var. vermelha).
- TUPINAMBA OU TUPINAMBO — Topinambo.
- BATATEIRA** — Salsa da praia.
- BATATINHA AMARELA** — Baririçô e Curcuma. Impreciso porque cabe ainda a muitas sps.
- DA PURGA — Baririçô.
- DE CAPEBA — Parreira brava (Despropositado).
- DO CAMPO — *Cypera herbertii* Sweet. Iridácia erbácia de fcs radicantes; fls em cachos, sobre longa raque. Bulbo laxativo. Com o mesmo apelido: a Iridácia *Moraea aphylla* e o Baririçô.
- PURGATIVA — Batatinha do campo (*C. herbertii*).
- BATEDEIRA** — Gritadeira.
- BATE TESTA** — Camapu.
- BATIBUTÁ** — Batiputá.
- BATINGA** — Ivitinga.
- BATIPUTÁ** — *Ouratea parviflora* Bail. Oenácia arboreta, com fcs elípticas, fls amarelas em cachos e fr. capsular. Amargo-tônico. Sementes oleosas, dando a "manteiga de Batiputá" para queimaduras e úlceras.
- MANSO — Batiputá.
- BATISSONIA** — Sorriso de Maria.
- BATONIA, BATÔNICA** — Betônia.
- BATUQUINHA** — Coração da Índia.
- BAUACU** — Babaçu.
- BAUBA, BAUVA** — Umbaba.
- BAUNILHA** — *Vanilla aromaticus* Sw.; *V. planifolia* Andr.; *V. pompona* Schied (ornamental). Orquídácia aproveitadas especialmente pelos frs aromáticos — cápsulas alongadas.
- DA BAHIA — Baunilha de Nicurí.
- DA FAVA GRANDE — Baunilha de Nicurí.

- NICURÍ — *Vanilla palmarum* Lind. Orquídácia epífita das Palmeiras e mormente do Nicurizeiro. Sarcênito de fcs espessas e orbiculares, fls violáceas e longas cápsulas.
- DO PERU — Heliotrópio (*H. peruvianum*).
- DOS JARDINS — Heliotrópio (*H. peruvianum*).
- BAUNILHÃO** — Baunilha (*V. pompona*).
- BAUNILHA SILVESTRE** — Baunilha de Nicurí.
- BAXIUBA** — Paxiuba.
- BEQUIBA** — Bicuiba.
- BEGÔNIA** — Designação de inúmeras sps de Begoniáceas, do Ge. Begônia. São, de ordinário, vcs erbácias, tenros, com fcs assimétricas, fls viscosas, medicinais ou decorativas. Algumas figuram com apelidos — Azeda, Azedinha, Erva azeda.
- REAL — *Begonia rex* Putz. Begoniácia rizomatosa e ornamental. Fcs radicantes, reniformes, encarnadas na página dorsal e ao longo do pecíolo. Fls. roséas, em belas cimeiras, longa raque.
- SANGUE — *Begonia sanguinia*.
- SANGUÍNIA — *Begonia sanguinea* Rad. Begoniácia sub arbustiva e ereta. Fcs assimétricas, crenadas e encarnadas na face do dorsal; fls em cimeiras. Ornamental, diurética e febrífuga.
- BEIJO DE FRADE** — *Impatiens balsamina* L. Balsaminácia erbácia e ereta. Fcs lancioladas; fls simples ou dobradas, albas, roséas, encarnadas; fr. cápsula rúptil à menor pressão. Para os simbolistas, representa a impaciência. Muito ornamental. Seiva catártica e diurética.
- DE FREIRA — Mariinha sem vergonha.
- DE MOÇA — *Bumelia speciosa*. Sapotácia arbórea. Lenho para carpintaria. O Cosmos tem idêntico apelido.
- DE PALMAS — Crista de galo (*Celosia*).
- BEIJOEIRO** — Estoracheiro.
- BEIJOS** — Espirradeira e Mimo do céu.
- BELA CORFIA** — Barriguda (*C. speciosa*).
- EMILIA — Emilia.
- MARGARIDA — Margaridinha.
- BELANCIA** — Melancia.
- BELAS** — Cipó de São João (*P. ignea*).

— NOITES — Bonina.

BELDROEGA — *Portulaca racemosa* L. Portulácia erbácia e prolífica. Fos espatuladas e carnosas; fls amarelas ou albas e cápsula globoide. Sp pouco exigente. Emoliente. Fos e rebentos comíveis e para isso cultivada.

— DA FLOR GRANDE — Onze horas.

— DA PRAIA — *Seauvium portulae-castrum* L. Aizoácia erbácia e prolífica. Difere da Beldroega, por ser rasteira, ter fos lancioladas e ser arenícola. Fls axilares com brácteas escorlates. Fixadora das areias.

— GRANDE — Beldroega.

— MIUDA — Bel'droega da praia.

— PEQUENA — *Portulaca oleracea* L. Portulácia erbácia. Difere essencialmente da Beldroega pelas fos que são abovadas, menores, e pelo cau rasteiro ou semi prostado. Fos comíveis, mucilaginosas e vermisfugas. A sp apresenta vars. Vid. Amor crescido.

— VERDADEIRA — Beldroega.

— VERDE — Beldroega.

BEM CASADOS — Dois amigos.

— ME QUER — Mal me quer.

BENÇÃO DE DEUS — Língua de vaca.

BENGALA DE CAMARÃO — Cinó de rego.

BENGALEIRA — Bananeirinha de jardim.

BENGÓ — Capim de Angola.

RENITO — Jequirits.

BENJAMIN — Figueira Benjamin.

BENJOEIRO — Limoeiro do campo. Impreciso, porque também é conferido ao Estorãoquiro.

BENJOIM — Limoeiro do campo.

— DO NORTE — Bálsamo de tolu.

PEQUE — Betis.

BEREGUEDÉ — Folha de fogo.

BERENGELA — Beringela.

BERGAMOTA — Vargamota.

BERI — Bananeirinha de jardim.

BERIBA, BERIBÁ — Biriba.

BERINGELA — *Solanum melongena* L. Solanácia sarmentosa e cultivada. Fos lobuladas; fls violáceas; fls bagas, cambiando de volume, coloração — roxas ou brancas — e formatos — ovóides e epíspoides — comíveis cosidos. Denominação também do neto de moça, mas conservada àquela sp.

— **BRANCA** — *Solanum ovigerum* Dun. Solanácia do mesmo tipo da

Beringela, apresentando frs não comíveis, brancos e com a forma de ovo.

BERIRIÇÔ — Baririçô.

BERIVA — Biriba.

BERTALHA — *Basella rubra* L. Basellácia sarmentosa ramosissima e prolífica. Fos ovalares e carnosas, apreciadas em culinária; fls em longas espigas; fr — drupa pequena — alva, ou rubra, sendo que os desta var dão matéria corante. Emoliente.

— **BRANCA** — *Basella alba* L. Var de Bertalha.

BETARU AMARELO — Espinho de vintem.

BETE — Bétis.

BETERRABA — *Beta vulgaris* L. Quenopodiácia erbácia, de cau napiforme, arroxidado e comível, rico em sacarose, e donde se extrae açúcar. Latifólios também comíveis. Sp universalmente conhecida, com numerosas vars — de tubérculos redondos ou achatados, brancas ou amarelas. Tem sido estimada como var hortense ou rapa da *B. vulgaris*.

— **BRANCA** — Ace'ga e a B terraba branca.

— **CAMPESTRE** — Acelga.

BÉTIS — *Piper eucaalyptifolium* Rudge Piperácia arbustiva de cau nodoso, fos lancioladas e fls em longas e delgadas espigas. Aromática, estimada como febrifuga e eupéptica. Entre outras sps congêneres, tem o mesmo apelido a *P. antidispeptica* Caminhão e a Capeba (*P. rohrli*).

— **CHEIROSO** — Bétis.

BETLE — Bétis.

BETÔNIA — *Hyptis multiflora* Pohl. Labiada sub arbustiva e inculta. Fos ovalares, denteadas e pilosas; fls em capítulos axilares. Passa por diurética, eupéptica e febrifuga.

BETONICA — Betônia.

BETRIS — Bétis.

BEVULAQUA — Cairuquá.

BEXUQUILHO — Ipecacoanha (Indistintamente).

BIAS — Bananeira do mato.

BICO DE ARARA — Mulungú (Indistintamente).

— **DE CEGONHA** — Gerânio.

— **DE CORVO** — Vid Manduibrana.

— **DE GROU** — Gerânio.

— **DE PAPAGAIO** — *Centropogon surinamensis* Pers. Companulácia arboreta. Fos lancioladas; fls, de cor rosa encarnada e recurva, solitárias e axilares. Ornamental. Com 9

mesmo apelido e menor propriedade o Bico de Incr e o Muungu.

—DE PATO — Sete casacas.

BICUBA — Bicuiba.

BICUIBA — *Myristica bleuhyba* Schot

Miristicácia arbórea e ornamental. Fos oblongas; fls em cachos; drupa, produzindo óleo, suscédneo da "manteiga de Cacau". Madeira de lei, donde flue o "sangue da Bicuiba", adstringente.

—**AÇU** — *Myriaticca officinalis*

M. Miristicácia ultissima e com as propriedades da Bicuiba. Fos lanceloladas; fls em cachos e axilares. Lenho encravado; drupas oleosas; sementes aromáticas.

—**BRANCA** — Bicuiba.

—**DA FOLHA MIUDA** — Bicuiba.

—**MIRIM** — Bicuiba.

—**REDONDA** — Bicuiba açu.

—**VERMELHA** — Bicuiba.

BICUIBUÇU — Bicuiba açu.

BICUUBA, BICUUVA — Bicuiba (Indistintamente).

BIGUA TINGA — Aninga (Indistintamente).

BILI-BILI — Biribiri. O primeiro apelido, o menos vulgar, devia ser o preferido, pois corresponde ao sobrenome da sp.

BILIMBI, BILIMBIM — Biribiri.

BILIMBINO — Biribiri.

BILREIRO — *Guarea trithiloides* L. Meliácia frondosa e ornamental. Fos compostas pinadas; fr capsular, não comível e píroide. Lenho de segunda, duro e cneurnado. Córtez e fos purgativos. Algumas vars.

BIMBEIRA — Barauna ou Brauna.

BIMBITO — Jequiriti.

BIQUIBA — Bicuiba (Indistintamente).

BIRBA — *Araticum* (Indistintamente).

BIRBISSONA — Buriti palmito.

BIRI — Bananeirinha de jardim.

BIRIBA — *Eschweilera speciosa*. Lecitidúcia arborea e florestal. Fos vernicosas; fls amarelas; fr capsular com deiscéncia transversal — pixídio — não comíveis. Córtez para cordaria; lenho resistente ao meio aquático. Deve ser denominada Biriba da Bahia para diferenciar-se das Anonáceas dos Ges *Duguetia* e *Rollinia*, que tem o mesmo apelido.

BIRIBA — Beriba, Graveola e a *Anona sericea* Dum. Anonáceas.

BIRIBA DA BAHIA — Vid Biriba.

—**DE PERNAMBUCO** — *Duguetia lanciolata* S.H. Anonácia arbórea e copuda, do mesmo tipo da B. veradeira, porém com frs enjoativos. Córtez fibroso, para cordaria e estopa.

—**DO CAMPO** — *Araticum do brejo*.

—**VERDADEIRO** — *Duguetia macrograviana* M. Anonácia do mesmo feitio dos Araticuns. Arboreta de fos lanceloladas e fr bacálio, globóide, amarelo e edule. Fibras para cordas e estopa.

—**VERDE** — Beriba verdadeiro.

BIRI-BIRI — *Averrhoa bilimbi* L. Oxalácia arboreta e cultivada como adorno. Fos compostas pinadas; fls caulinares; frs bagas acres ricas em ac. oxálico e usadas especialmente para tirar manchas de roupas, sendo também refrigerante e contra o escorbuto.

BIRIRIÇÓ — Baririçó.

BIRRA ALVA — Diamba.

BIRREIRO — Bilreiro.

BISCUI — Capeia.

BISNAGA HORTENSE — Cenoura.

BISTURI DO MATO — Sumaré.

BITRE — Capeia e especialmente *Betis*.

BIURÍ — Lágrimas de Nossa Senhora.

BIXA, BIXÉ — Açafrão.

BLEDO — Bredo (Indistintamente).

BOA MORTE — Bonina.

—**NOITE** — *Ipomoea bona-nox* L. Convolvulácia sarmentosa de grande desenvolvimento. Cordifolio; fls albas, de amplas corolas; fr capsular, com sementes servindo para a falsificação do café. Com o mesmo apelido, as *Vincas* ornamentais, especialmente a var *rosea*.

—**NOITE BRANCA** — Boa noite.

BOAS NOITES — Boa noite.

BOA TARDE — *Vinca major* L. var *alba*. Apocinácia sub arbustiva, sempre floresc., lactifera e muito cultivada.

E' do mesmo tipo, a Boa noite do Ge *Vines*, que também figuram nos Ges *Lochnera* e *Pervinea*. Vid. Boa noite.

BOBÓ — Babá.

—**FRUTA** — Babá.

BOCA DE BEZERRA — Boca de leão.

—**DE DRAGÃO** — *Epidendrum rapiferum* Lind. Orquídácia de fos lanceloladas e grandes fls verde amarelas, sobre longa raque. O E. *dichromum* Lind., o E. *fragrans* Sw.,

algumas sps congêneres, são identificadas com igual apelido.

—DE LEÃO — *Antirrhinum majus* L. Escrofulariá erbácia e ornamental. Fos lancioladas; fls assiméticas em cachos erectos, de várias cores; fr cápsula. Tida como diurética e emoliente.

—DE LOBO — Boca de leão.

—DE SAPO — Fel da terra e Quina de ra.

BOCAIBA, BOCAIUNA, BOCAUBA — Macauba.

BOCETA DE MULA — Chichá.

BOCUBA — Bicuiba.

BOCUUBA, BOCUUVA — Bicuiba.

BODELHA, BODELHO — Carvalhinho do mar.

BODILHÃO — Carvalhinho do mar.

BOGARI, BOGARIM — *Jasminum sambac* Ait. Oleácia arbustiva e semi sarmentosa. Frs. albas, dobradas, perfumosas e vistosas. Fr baga insignificante. Ornamental.

—MIUDO — Bogari.

BOIA — Chichá. Cabe a muitas sps, donde a imprecisão do apelido.

—CAÁ — Rabugem de cachorro.

—UNHA DE ANTA — Chichá.

BOI GORDO — *Cassia rugosa* G. Don. Leguminosa arbustiva. Trafólios; fls amarelas em rácimos; vagem grossa e cilíndrica. Ornamental. Passa por diaforética e tónica.

BOLA — Algodão da praia.

—DE NEVE — *Viburnum opulus* L. Caprifoliácia arbustiva e ornamental. Fls albas e verdes, em corimbos; fr aquênio. Adstringente.

BOLDRANA — Bardana.

BOLEITA — Andá açaú.

BOLOTEIRO — Visgueiro.

BOLSA DE PASTOR — *Capsella bursa-pastoris* Moen. Crucífera erbácia e inculta. Erecta. Fo partida; fl alba em espigas, e fr síliqua. Hemostática. Com o mesmo apelido: o Braço de preguiça, o Bucho de boi e o Chapeu de frade.

BOMBAIONA — Japecanga.

BOMBALINA — Toranja.

BOMBANAÇA, BOMBANASSA — Bombonaça.

BOMBÃO — Babá.

BOMBEIRA — Bombonaça.

BOMBONAÇA, BOMBONACHA, BOMBONASSA — *Carludovica palmata* P. & R. Cielantácia acaule, com o fétio de Palmeira. Grande fos palmati-partidas, de longíssimo pecíolo; fls espatuladas e aromáti-

cas; baga carnosa. Fornece fibras para os "chapeus do Chile". Ornamental.

BOM HOMEM — Pau de colher.

—PARTO — Milhomens (Indistintamente).

BONINA — *Mirabilis jalapa* L. Nicotaginácia erbácia e prolífica. Caú geniculado; fos simples; fls alvas ou róscas, meteóricas, desabrochando ao entardecer. Fos emenagogas; ra purgativa.

—DOS CAMPOS — Margaridinha.

BONS DIAS — *Ipomoea purpurea* Rot. Convolvulácia, sarmentosa e ramosa. Fos cordiformes; fls campanuladas, alvas ou violáceas; fr capsular.

BORASSO — *Borassus flabelliformis* L. Palmácia alta e robusta. Latifólios em leque; fls em espigas; frs côcos globoïdeos, cor de queimado, volumosos, comíveis quando verdes, ebúrneo quando seco; lenho negro e duríssimo. Sp elegantissima.

BORBOLETA — Lírio do brejo.

—AMARELA — *Hedychium flavescens* Carey. Zinziberácia do mesmo tipo do Lírio do brejo, portanto com fls. amarelas.

—DO BREJO — Lírio do brejo.

BORDÃO DE VELHO — Avarema tomo.

BORITI — Buriti.

BORLA — Astrácea.

—DE BISPO — *Calliandra chaperae*. Leguminosa arboreta de ramificação difusa. Penífólios; fls em glomérulos; fr. vagem. Com o mesmo apelido e fétio a *C. tweediei* Bth.

—DE SARGENTO — Astrácea.

BORRACHA BRAVA — Crista de galo (*H. foetidum*).

BORRAGEM BRAVA — Crista de galo (*H. foetidum*) e o Hellotrópio — *H. indicum* L. Borraginácia subarbustiva, com fos lancioladas, fls em espigas escorpióides e alvas e fr drupáceo. Emoliente.

BOTÃO DE OURO — *Xyris laxifolia* M. Xiridácia erbácia, com longifólios lineares, fls em capitulos de longa raque e fr capsular. Usada contra as lesões cutâneas. Com o mesmo apelido: o Agrônio do Brasil, o Ranúnculo do Brasil, o Mal-me-quer, o Cordão de ouro e o *Ranunculus bonariensis* Poir. Ranunculácia hidrófila e rasteira. Fos

- cordiformes e fls amarelas. Sp narcótica.
- BOTICA INTEIRA** — Douradinha do campo.
- BOTUCUDO** — Juiz de paz.
- BOUCOUBA** — Bioubá.
- BOUQUÉ DE NOIVA** — *Spiraea chamaedrifolia* L. Rosácea ornamental, com fls albas em rácimos. Tida como diurética. Tem o mesmo apelido o Alfineto de noiva.
- BOXINHO** — Pau roxo.
- BRACAIBA** — Pimenta de galinha.
- BRAÇO DE PREGUIÇA** — *Solanum cernuum* V. Solanácea arboreta, com fos elípticas, fls em cimeiras e bagas. As fos substituem o Chá da Índia. Passa por depurativo e diurético.
- BRACUÍ** — Maria preta (*Vitex*).
- BRADAMUNDO** — Cardamomo.
- BRANQUILHÃO** — Brinquinho.
- BRANQUILHO** — *Sebastiania koitzschiana* M. Arg. Euforbiácia arbórea. Cau armado, fos coriáceas e ovalares, fls em espigas. Madeira de segunda.
- BRASIL** — Pau Brasil.
- BRASILETO** — Pau Brasil.
- BRASSICA** — Couve (Indistintamente).
- BRAUNA** — *Sechinosepia brasiliensis* Engl. Anacardiácia arbórea. Fos compostas pinadas; fls em paniculas e fr drupáceo. Madeira de lei. Segundo C. Tor., há distinção entre Barsuna e Brauna.
- PRETA** — Brauna.
- BREDO** — *Amaranthus virides* L. Amarantácia erbácia e sub espontânea. Fos inteiras aproveitadas em culinária; fls em rácimos de espigas. Fr capsular, insignificante. Algumas sps possuem esse apelido e todas elas congêneres, dentre as quais o *A. blitum*. São igualmente denominadas Carurús.
- CARURÚ** — Bredo (*A. virides*) e Carurú bravo.
- DE ESPIGA** — Brêdo grande.
- DE ESPINHO** — Brêdo de Sto. Antônio.
- DE NAMORADO** — Crista de gallo (*Celosia*).
- DE PORCO** — Carurú de espiga (impreciso por ser conferido a outras sps).
- DE STO. ANTÔNIO** — *Amaranthus spinosus* L. Amarantácia sub arbustiva. Cau armado e canelado; fos lanceoladas; fls em espigas

- abundantes; fr capsular. Fos e brotos comíveis.
- DO CHILE** — Bredo de Sto. Antônio.
- DO PERU** — Bredo (*A. virides*).
- FEDORENTO** — Mussambé de espinho.
- GRANDE** — *Amaranthus major* Salz., ou *A. gracilis* Desf. Amarantácia sub arbustiva verde e ramosa. Fos ovalares; fls em espigas também esverdiadas. Sp ruderal.
- GRAUDO** — Bredo grande.
- IMPERIAL** — Crista de gallo (*A. gangeticus* L. var *melanoculus*).
- MACHO** — Bredo (*A. blitum*).
- MAJANGOME** — Lingua de vaca.
- MAJOR GOMES** — Lingua de vaca.
- MALABAR** — Bredo (*A. blitum*).
- RABAÇA** — Bredo (*A. blitum*).
- ROXO** — Crista de gallo (*A. gangeticum*).
- VERDADEIRO** — Bredo (*A. virides*).
- VERMELHO** — Veludo e Bredo de Sto. Antônio.
- BREJAUBA, BREJAUVA, BRIJAU-VA** — *Astrocaryum ayri* M. Palmação de altura média, formando touças. Penífólios; fls em espigas espatuladas; drupa piróide. Espíque muito espinhoso. Excelente madeira; laca, porém não quebra.
- BRETALHA** — Bertalha.
- BREU ALMÊCEGA** — Almêcega (*P. heptaphyllum*).
- BRANCO** — Almêcega (*P. icemaria*).
- BRILHANTINA** — *Pilea microphylla* Mig. Urticária erbácia e ramosíssima, para orla de canteiros. Fos pequenas e abundantes; fls albas.
- BRASILEIRA** — *Pilea hyalina* Fenz. Urticária erbácia, ereta e de haste sucosa. Fos elípticas e serrilhadas. Sp monóica.
- BRINCO** — Flor do paraizo.
- DE CABRA** — *Swartzia mollis* Bun. Leguminosa arbustiva. Penífólios elípticos; fls axilares; fr vagem, de única semente, acumulada e pequena.
- DE MULATA** — *Swartzia apetala* Radl. Leguminosa.
- DE PRINCESA** — *Fuchsia integrifolia* Cham. Enoterácia arbustiva e ornamental. Fos ovalares; fls em rácimos pendentes, rubras, singelas ou dobradas; fr baga. Sp congêneres têm o mesmo apelido, bem como o *Hibiscus molleoides*. — Mal-

- vácia arbustiva e muito decorativa pelas suas abundantes fls de corola sanguínea, mantendo-se sempre enrolada. Tais fls caducam e caem precocemente.
- DE RAINHA — Brinco de princesa (*H. mollcoidea*).
- DE SAGUÍ, SAGUÍM — Avaremoto-momo e Angico.
- DE SAGUIRÚ — Avaremoto-momo e Angico.
- DE SAOÍM, SAUÍ — Avaremoto-momo e Angico.
- DE VIUVA — Cascavel.
- BRINGELA** — Beringela.
- BRINQUINHO** — Brinco de cabra.
- BRIÓ DE ESTUDANTE** — Barbas de barata.
- DE ESTUDANTE FLOR DE PAVÃO — Barbas de barata.
- BRISAS** — Coamos.
- BRUTÍ** — Buriti.
- BUACU** — Babaçu.
- BUBÁ-AÇU** — Pau Peroba.
- BUCHA** — *Luffa cylindrica* Roem. Cucurbitácia gavinosa, de grande desenvolvimento e sub espontânea. Fos ásperas e lobadas; fls amarelas; fr — anfisarcas — var de baga, alongada, podendo atingir a um metro em certa sub sp. Tal fr apresenta trançado fibroso, reticular, que vale de esponja, estopa e tem muito mais importantes utilidades industriais.
- COMUM — Bucha.
- CHUCHÓ — Bucha de purga.
- DE METRO — *Luffa cylindrica* Rox., var longa.
- DE PURGA — *Luffa acutangula* Rox. Cucurbitácia parecida com a Bucha, apresentando porém frs menores, com arestas ou costelas longitudinais, comíveis cosidos quando verdosos. Maduros, sua polpa é drástica, catártica e emética.
- DOS CAÇADORES — Bucha.
- DOS CAMPISTAS — Bucha de purga.
- DOS PAULISTAS — Bucha e Bucinha.
- DOS PESCADORES — Bucha.
- FEDORENTA — Bucha de purga.
- GIGANTE — Bucha (Var de metro).
- PEPINO — Bucha de purga.
- BUCHINHA** — *Luffa operculata* Cogn ou *L. purgans* L. Cucurbitácia gavinosa. Fos palmadas e denteadas; fls amarelas campanu-

- ladas; fr piróide, mole e terminado por opérculo. Drástico e vomitivo.
- DO NORTE — Bucha.
- BUCHO** — Bucho de boi e Chapéu de frade.
- DE BOI — *Zeyheria tuberculosa* Bur. Bignoníacea alta. Cau rugoso; pentafólios palmados; fls, em rácimos violáceos; fr cápsula escabrosa, com sementes aladas. Lenho de segunda. Sp adstringente e depurativa, impropriamente conhecida por Ipê.
- DE RA — Camapu.
- BUCUIBA, BUCUUBA, BUCUUVA** — Bicuiba.
- BUGANVILEA, BUGANVILIA** — Tres Marias.
- BUGRINHO** — Chá de bugre e panganba.
- BUNDA DE MÃI IZABEL** — Mái Izabel.
- DE MULATA — Amarelinha (*Thunbergia*).
- BURAEM** — Buranhem.
- BURANHEM** — *Pradosia lactescens* Radl. Sapotácia florestal. Fos longo, ovalres; fls em cachos; baga elipsóide e edule. Lenho para carpintaria. Adstringente, lacticífero e tóxico. O apelido corresponde às sps dos *Ges Chrysophyllum*, *Lucena* e *Pomelia*, da mesma Fa.
- BURECI, BURICÍ** — Murici.
- BURI** — Patioba da Bahia.
- ACU — Patioba da Bahia.
- DA PRAIA — Cachandó.
- MIRIM — Cachandó e Piçandó.
- BURITÍ** — *Mauritia vinifera* M. Palmeira alta e robusta. Palmífolio: fls em espiguetas, de raque helicoidal; fr drupa elipsóide e escamada, edule, dando o "óleo do Buriti". O cau e as espeltas servem para a fabricação de licor vinhoso. É ainda ornamental, dá bró e palmito.
- BRAVO — *Mauritia armata* M. Palmeira arbustiva, flexuosa e formando touças. Fos flabeliformes; fls em espigas espatuladas; fr drupa edule. Dá licor vinhoso. Sp de cau espinhoso.
- DO BREJO — *Mauritia flexuosa* L. Palmeira de ponderável altura, delgada e formando touceiras. Fos palmadas; fls coriáceas em espigas; drupa avermelhada. Ornamental. Dá marfim de seu albumem e óleo do fr.
- MIRIM — Buriti bravo.
- NANA — Buriti bravo,

—PALMITO — *Tritrinax brasiliensis*. Palmácia arborcta, elegante, com fós em leque e de bainhas espinhosas; drupas pequenas. Ornamental.

BURITIRANA — Buriti bravo.

BURRACHA — Borragem brava.

BURRÃO — Grama de Jacobina.

BÜSSULA — Gérbera.

BUTA, BUTI — Parreira brava.

BUTIA MIRIM — Abutua miuda.

BUTUA — Parreira brava.

BUTUÁ DE CORVO — *Cochlospermum insigne* SH. Coccopermácia arbustiva e decorativa. Fós palma-

tíferas; fls amarelas, em rácimos terminais; fr capsular, com filamentos parecidos aos do Algodão. Ra amarga. Madeira leve.

BUTUINHA — Abutua miuda.

BUXO, BUCHEIRA — *Buxus sempervirens* L. Buxácia arbustiva, ou mesmo arboreta ramosíssima e ornamental. Fós pequenas e coriáceas; fls unissexuadas, a'bas e fétidas; fr cápsula. Lenho duro. Serve para jardins de inverno.

—ARBORESCENTE — Buxo.

—GRANDE — Buxo.

BUXUMA — Mutamba.

C

- CAA — Fumo bravo (*E. scaber*).
 —AO — Sensitiva.
 —APIA — Contra erva.
 —ATAIA — Douradinha (*L. diffusa*).
 —CAMBUÍ — Erva de cobra (*E. serpens*).
 —CHI — Congonba de Goiáz.
 —CHIRA — Anil.
 —CICA — Mastruço e Curraleira (Impreciso).
 —CO — Sensitiva.
 —EO — Sensitiva.
 —GAMBÁ — Manacá.
 —JANDIVA — Erva do diabo (*P. scandens*).
 —NEMA — Coerana.
 —OPIA — Capianga.
 —PEBA — Capeba.
 —PENA, CAA-CAPEUA — Capeba.
 —PIA — Contra erva.
 —PIÁ AÇU — Contra erva.
 —PIÁ MIRIM — Contra erva.
 —PIÁ PRETO — Contra erva.
 —POMONGA — Erva do diabo (*P. scandens*).
 —PONGA — Beldroega pequena.
 —PUCA — Cambucá.
 —QUERA — São João.
 —TAIA — Erva do diabo (*P. scandens*).
 —TAIBA — Catuaba (Indistintamente).
 —TIÁ — Curraleira.
 —TUIBA — Catuaba (Indistintamente).
 —UAÇU — Taioba.
 —VITINGA — Couvetinga.
 —VU — Anil.
 —VURANA — Anil.
 —XIXÁ — Pimenta de galinha.
CABAÇA, CABACEIRA — Cucurbita *lagenaria* L., podendo ser considerada var de Abóbora d'água. Cucurbitácia gavinosa. Fr baga — anfisarcia — de pericarpo lenhoso, globóide ou de pESCOÇO, servindo de recipiente, amplo e leve, especialmente para água. Polpa e sementes, tóxicas e amargas.
 —AMARGOSA — Cabaça.
 —DE COLO — Cabaça (Var com pESCOÇO).

- DE ROMEIRO — Abóbora d'água.
 —PURUNGA — Cabaça.
CABACINHA — Taiuiá. Impreciso; cabe à Sapucaia, à Sapucainha e outras esp.
CARACINHAS — Estefânia.
CABACINHO — Buchinha.
CABAÇO, CABACEIRO DE CÓIA — Cabaça.
 —MARIMBA — Cabaça.
CABAÇU — Genipapo.
CABEÇA BRANCA — *Cereus dybowski* B. e R. Cactária arborescens do Nordeste. Cau cilíndrico, coberto em sua extremidade de longos pelos alvados.
 —DE BOI — *Stenocereus graveolens* Lind. Orquídacia de latifólios elípticos, fl cor de creme, de labeio em forma de saco, alvo e pintalgado. Ornamental.
 —DE CABRITO — Peito de moça.
 —DE FRADE — *Melocactus bahiensis* B. e Rose. Cactária hemisérica, armadíssima, tendo superiormente um disco circular encarnado. Tem o mesmo apelido o *Echinocactus ottonis* Lehm., do mesmo tipo e, bem assim, a Mucuna, cuja semente lhebra uma coroa de frade.
 —DE MOLEQUE — Taiuiá.
 —DE NEGRO — *Annona coriacea* M. Anonácia arbustiva de folhas ovíduas e coriáceas, fls carnosas e amarelas e grandes bagas edéus. Do mesmo grupo dos Araticuns. Impreciso, pois o Araticum cortiça, o Repolho roxo e o Taiuiá têm o mesmo apelido.
 —DE VELHO — Cacto cabeça de velho.
CABELINHO DE JESUS — Borla de bispo.
CABELO DE ANJO — Borla de bispo.
 —DE MOÇA — Melindre.
 —DE NEGRO — *Erythroxylum campestris* S. H. Eritroxiliácia arbustiva e selvática. Folhas simples; fls esbranquiçadas e axilares; drupa cuspíndida; córtex purgativo; madeira de lei. Tem o mesmo apelido a Diamba. De suas vars a mais tóxica.

- DE URSO — Mondo.
- DE VÊNUS — Avenca (*A. cap-*
veneris).
- CABELOS DO REI — Barba de ve-
lho.
- CABELUDA — Folha de fogo.
- CABELUDINHA — Folha de fogo.
- CABEUNA — Jacarandá negro.
- CABIRUNA — Óleo pardo.
- CABIRUVA — Óleo pardo.
- CABIUNA, CABIUVA — Jacarandá
negro.
- DO CAMPO — *Dalbergia miscolobium* Bth. Leguminosa arbórea.
Fos compostas de elementos elípticos; fls aromáticas e vio'áceas; va-
gem pequena; madeira de lei.
- RAJADA — Jacarandá negro.
- PRETA — Jacarandá negro.
- CABOCLÁ — *Zinia multiflora*. L.
Composta, do mesmo tipo do Ci-
umes de velha. Fos lancioladas; fls
amarelas ou encarnadas em capítu-
los. Sp ornamental.
- CABORÉ — Jacarandá negro.
- CABOREIRA, CABUREIRA — Óleo
pardo.
- CABO VERDE — Boi gordo e Man-
duriara.
- CABREUVA, CABRIUVA — Óleo
pardo.
- AMARELA — Óleo pardo.
- DO CAMPO — Óleo pardo.
- PARDA — Óleo pardo.
- VERMELHA — Óleo pardo.
- CABREUVINHA — Óleo pardo.
- CABRIUNA — Óleo pardo.
- CABRUÉ — Óleo pardo.
- CABUCU — *Coccoloba latifolia* Lam.
Polygonácia arbórea, podendo ser-
vir de ornamento. Fos orbiculares
e coriáceas; fls em espigas; fr ba-
ga não comível. Madeira de se-
gunda. *C. martii* Muell. Sp do mes-
mo tipo, com latifólios ova'ares e
bagas édules.
- CARUF — Aroeira verme'ha.
- CABUIÁ — Vela da pureza.
- CABURAIA — Óleo pardo.
- CABURÉ, CABURÉ-IBA — Óleo
pardo.
- CABURÍ — Cambuí (Indistintamen-
te).
- CACÁLIA AMARGA — Carqueja.
- CAÇAMBA DO MATO — Sapucáia.
- CACAORANA — Cacau maracujá e
menos propriamente a *Herrania*
mareae, aliás da mesma Fa.
- CACATEIRA — Melão de São Ca-
etano.
- CAÇATINGA — Cassatinga.
- CACAU — *Theobroma cacao* L. Es-
terculiácia arbórea e elegante. Fos
elípticas, amplas e acuminadas; fls
caulinares; fr capsular com sul-
cos longitudinais, contendo de 20
a 65 sementes. A sp representa
uma das maiores fontes de receita
do Brasil. O Cacau não é tão só
produto de sobremesa, aliás muito
apreciado pelo sabor e virtudes nu-
tritivas. Além do "chocolate",
suas sementes dão a "teobromina",
de grande emprego em medicina e
a "manteiga de Cacau", fluidissi-
ma, de valor terapêutico e indus-
trial. Não está apurado existir na
Bahia o "Cacau crioulo" puro, que
a-pesar-de fornecer o "Cacau fino",
bem aclimável em seu solo, tem sua
cultura desaconselhável por Sostenos
de Miranda. O que parece haver,
são vars ou híbridos do *T. cacao*
como o *T. pentagona* Bern — o
"Cacau forasteiro" e o *T. lelo-
carpa* Bern ou "Cacau calabacilo".
Quanto maior proporção de gens do
"crioulo", no patrimônio hereditá-
rio, afirma o referido geneticista,
melhor a qualidade do produto.
- CALABACILO — Vid Cacau.
- COMUM — Cacau.
- CRIOULO — Cacau.
- DA NOVA GRANADA — Cupuaçu.
- DA PRAIA — Mamorana.
- DE CARACAS — Cupuaçu.
- DO PERU — Cupuaçu.
- FORASTEIRO — Vid Cacau.
- JACARÉ — Cacán maracujá.
- MARACUJÁ — *Theobroma micro-
carpa* M. Esterculiácia arbórea,
com as características do Cacau, po-
rém sendo os frs sulcados transver-
salmente. Madeira de lei.
- CACAURANA — Cacau maracujá.
- CACAU SELVAGEM — Mamorana.
- CACHANDÓ — *Diplothemium mariti-
num* M. Palmácia quase acaule.
Longas fos pinadas; f's em espádi-
ces; fr noz angulosa, de albumem
comível. As fos, flexíveis e resis-
tentes, segregam cera util.
- CACHAPORRA DE GENTIO — *Ter-
minalia fagifolia* M. Combretácia
arbórea e tanifera. Fos ovalares,
fls em espigas e fr capsular. *Ter-
minalia argentea* M. Outra sp con-
gênere, de fos lancioladas, f's em
umbela de espigas e fr — sâmara
— adstringente e purgativo. Madei-
ra de lei.
- CACHEM — Cega olho.
- CACHETA — Pau de tucano.

- CACHICHI** — Cascaveleira.
- CACHO DE OURO** — Chuva de ouro (Indistintamente).
- DE PEDRA** — Carvalhinho do mar.
- CACTO** — Denominação de algumas Asclepiadáceas, Crassuláceas, Euforbiáceas e, especialmente, inúmeras Cactáceas.
- CABEÇA DE VELHO** — Pilocereus senilis Lem. Cactácia arbustiva, de ramos cilíndricos, cuja extremidade alvacenta é coberta de longos pelos albos.
- JAPONÊS** — Bryophyllum tubiflorum Harv. ou Kalanchoe tubiflorum Harv. Crassulácia arbúscula e ereta. Fos carnosas, cilíndricas, dispostas em fileiras verticais e paralelas; fls albas e tubulosas. No extremo das fos, formam-se brotos prolíficos. Curiosa sp ornamental.
- MELÃO** — Cabeça de frade, outros Melocactus e Echinocactus. Do mesmo tipo dêsses e com o mesmo apelido é o Cactus melocactus V.
- ROSA** — Ora pro nobis.
- CACULAGE** — Quitoco.
- CADORNA** — Unha de gato.
- CAENA** — Capcha.
- CAERANA, CAEIRANA** — Coerana.
- CAETÉ** — Coquinho. Denominação também de várias esp. de Marantáceas e Canáceas, respectivamente dos Ges Caethea e Canná. Algumas são decorativas.
- DE CHEIRO** — Cardamomo.
- IMBIRI** — Coquinho.
- CAFÉ, CAFÉIRO, CAFEZEIRO** — Coffea arabica L. Rubiácea arbustiva, ramosa e elegante. Fos semi coriáceas; fls albas e aromáticas; fr baga de aspecto drupáceo. Sp melífera e de muitas utilidades. Suas sementes, além da bebida universalmente conhecida — o Café — que alia ao sabor e ao aroma as propriedades tónicas, estimulantes e alimentícias, dão a "cafeína", interessante alcaloide, cardio-tónica. Todas as partes do ve são sproveitadas: lenho resistente; fos diuréticas e cardiotónicas; pericarpo e o pó resultante do decocto — "pó de Café" — bom adubo. O Café comum, sp em aperço, deu margem a muitas vars e híbridos, assinalados por nomes vulgares — "Bourbon", "Africano", "Maragogipe", "da Chapada" — tida como das melhores —, "Dutra", "Murtta" dentre outros e também por sobrenomes científicos — angusti-
- folia, erecta, macrocarpa, monoperna, xanocarpa, etc. No mercado, consoante a importância do produto, figuram os rótulos: "lino", "escolha", "chato", "ordinário", "bom", "regular", "superior" e mais alguns de caráter regional.
- BETICAO** — Café dos navegantes.
- BRAVO** — Erva de rato. (improprio, pois é conferido a diferentes sps).
- COMUM** — Vid Café.
- CRIOULO** — Vid Café (C. arabica).
- DE MARAGOGIPE** — Café — Coffea arabica L., var macrocarpa.
- DE MATO GROSSO** — Mucuna.
- DE SÃO FIDELIS** — Café de São Gonçalinho.
- DE SUDÃO** — Noz de cola.
- DO DIABO** — Caseria guinensis Urb. Fincurtiácia arboreta, com fos lancioladas, fls axilares e fr capiular. Sp adstringente. São Gonçalinho e Porangaba têm o mesmo apelido.
- DO MAIO** — Cordia coffeoides War. Borráginácia arbustiva, de fos lancioladas, fls campanuladas e fr drupáceo. Tabernaemontana laeta M. Apocinácia arboreta, com fos lancioladas e fls em cimeiras. Torna-se ainda mais imprecisa a designação, por ser também do Mata pastão e do São Gonçalinho. Outra Cordia, a salicifolia, ainda é conhecida pelo referido apelido.
- DO PARA** — Café dos navegantes.
- DOS NAVEGANTES** — Mucuna pluricostata Rodr. Leguminosa sarmamentosa, com trifólios membranosos, fls com arestas no pericarpo e sementes pretas.
- NEGRO** — Fedegoso.
- CAFEZEIRO BRAVO** — São Gonçalinho.
- CAGAITEIRA** — Stenocalyx dysentericus Berg. Mirtácia arbórea e tortuosa. Fos lancioladas; fls albas e solitárias; bagas comíveis e adstringentes, sendo por isso anti diarréicas. Lenho para carpintaria.
- CAGAITO** — Cagaiteira.
- CAGA MATERIA** — Vasa matéria.
- CAGAMBA** — Tipi e, especialmente, o Manacá.
- CAGUATÁ** — Camboatá (Indistintamente).
- CAÍA** — Fumo bravo.
- CAIANA, CAIENA** — Vid Cana de açucar. Var muito conhecida,

- CAIANITO** — Caimito.
CAIAPIÁ — Contra erva.
—DO GRANDE — Contra erva (*D. multifloris*).
—PRETA — Contra erva (*D. multifloris*).
CAIAPO — Purga de caboclo.
CAIARANA — Cangerana.
CAIATE — *Omphalea diandra* L. Euforbiácia sarmentosa, com latilóios ovalares; fls esverdiadas, em cimeiras paniculadas; fr cápsula globóide e comível. Sp oleosa e cicatrizante.
CAIAUÉ — Dendê.
CAIÇARA — *Solanum pulverulentum* Sa. is (?). Solanácia arboreta, parecendo var de Jurubeba. Fos elípticas e pulverulentas; fls violáceas em cachos; fr baga esférica, pequena e não comível. Sp inulta.
CAIMBAIBA — Lixeira.
CAIMBÉ — Lixeira.
CAIMITO — *Chrysophyllum cainito* L. Sapotiácia frondosa e ornamental. Fos lancioladas discolores; fls campanuladas e axilares; baga elipsóide com o aspecto do Abacate e de bom sabor.
—VERMELHO — Caimito.
CAIMPE — Lixeira.
CAINCA — Cipó cruz verdadeiro.
—VERDADEIRA — Cipó cruz verdadeiro.
CAINITE, CAINITO — Caimito.
CAIOTA — Chuchú.
CAIRANA — Cangerana.
CAIRUCU, CAIRUSSÚ — *Hydrocotyle asiatica* L. Umbelífera rizomatosa e estolhosa. Fos orbiculares; fls albas, em pequenas umbellas; fr cápsula ovóide e lenhosa. Contra as lesões cutâneas. Passa por amarga, diurética, depurativa e nareótica.
CAISSARA — Caiçara.
CAITATA — Capigoba (*P. acre*).
CAIUINHA — Marianinha.
CAIXÃO — Jequitibá (Indistintamente).
CAIXETA — Pau de tucano.
—FALSA — Pau de tucano.
CAJA, CAJAEIRO, CAJAZEIRA, CAJAZEIRO — *Spondias lutea* L. Anacardiácia de rápido e grande desenvolvimento. Córtez gretado e espesso, prestante à xilografia; fos compostas pinadas; fls albas em paniculas; fr drupa acre-doce e refrejante. Gera mente inulta.
—AQU — Cajá manga.
- AMARELA** — Cajá.
—DE FRUTO GRANDE — Cajá manga.
CAJADO DE SÃO JOSÉ — Flor de São Joro.
CAJÁ DO SERTÃO — Cajá.
—ESPÚREA — Cangerana.
—MANGA — *Spondias mangifera* Linn. Anacardiácia elegante, parecida com a Cajá, embora menor no porte. Seus frs muito maiores — drupas — elipsóides, são muito apreciados.
—MIMOSO — Cajá.
—MIRIM — Cajá.
—MIUDA — Cajá.
—PEQUENA — Cajá.
CAJARIA — Contra erva.
CAJARANA — Cajá umbú e especialmente a Cajá manga e a Cangerana.
CAJÁ UMBÚ — *Spondias lutea* L., var purpurea. Anacardiácia arbórea, ramosissima, com os caracteres do Umbuzeiro. Os frs, todavia lembram os da Cajazeira, sendo melhores que os de ambas sps. Melifera por ser sempre floreira.
CAJAVANA, CAJAVARANA — Umbú.
CAJÁ VERMELHA — Serigueia.
CAJU, CAJUEIRO — *Anacardium occidentale* L. Anacardiácia de grande desenvolvimento mesmo em terrenos secos e áridos. Fos ovalares; fls em paniculas eretas; fr aquênio — a "caetanha" — que quando verde — "maturi" — é excelente aceipe e seco fornece, do pericarpo, óleo cáustico de valor industrial. As sementes torrefeitas, além de saborosíssimas, são nutritivas. De igual maneira que o pefeo é um elemento da fo, o pedúnculo, mormente desse fr, deve ser considerado parte do fr, sendo dilatado, suculento e de virtudes medicinais. A resina que flue do córtex, substitue a "goma árabea"; o lenho, excelente madeira. As inúmeras vars da sp têm justificativa em sua ampla distribuição geográfica e assim adstrita a repetidos cruzamentos. Tais vars assinalam-se propriamente na porção carnosa referida, consoante a cor, conformação, volume e sabor, tornando diferentes apelidos. De todas destaca-se o "Caju manteiga" da Ilha de Itaparica, devido à excelência da polpa inteiramente destruída de "pigarro" ou "eica".

—**AÇU** — *Anacardium giganteum* Hanc. ou *A. occidentalis* L., var *giganteum*. Anacardiácia com as características do Caju, porém de maior porte e maior porção carnosa do fr, que é encarnada e longa.

—**BANANA** — Caju açu.

—**BRANCO** — Cajuf. Denominação imprópria porque a mesma coloração é bastante contradícha em outras vars.

CAJUEIRO ANÃO — *Anacardium occidentale* L., var *nanum*. Os meados caracteres do Caju. O fr é grande na parte carnosa, sendo o Ve apenas arbusto e de floração precoce.

—**BRAVO** — Denominação muito conhecida da Lixeira. Também é consignada a uma Ocniácia, a *Ocotea sajicifolia* Engl., de folhas ciliadas, fls em panículas e drupas encarnadas. Sp ornamental.

—**BRAVO DO CAMPO** — Lixeira.

—**DA MATA** — Caju açu.

—**DA PRÁIA** — Caju.

—**DE TABOLEIRO** — Lixeira.

—**DO CAMPO** — Designação imprópria do Cajuf, pois também ajusta-se a todas as sps congêneres e a *Cupania emarginata* C. mb. Sapindácia arboreta, com penatífios, fls albas em panículas e fr drúpicio.

—**DO CAMPO COBERTO** — Cajuf.

—**DO MATO** — Lixeira. Impreciso pois cabe a quase todos os Cajufros.

CAJUF, CAJUÍL, CAJUFIM — *Anacardium humile* S. H. ou melhor *A. microceratum* Ducke. Anacardiácia do mesmo tipo do Caju, do qual difere pelo tamanho reduzido do cau e especialmente do fr.

CAJU MANSO — Caju.

—**MANSO DO MATO** — Lixeira.

—**MIRIM** — Cajuf.

—**PEBA** — Lixeira, devendo caber melhor ao Caju açu.

—**RANA** — Caju anão e Cajuf.

—**RASTEIRO** — Cajuf.

—**SILVESTRE** — Lixeira.

CALÁDIO — Inúmeras sps de Aráceas do Ge *Caladium*. Muitas são decorativas e singularizam-se pelas folhas, geralmente sagitadas, coloridas e de longo pecíolo e outras peças inflorescências de belas espártas. Servem de tipo o *Caladium bicolor* Vent e os Tinhorócs. Há também sps hortenses, como o Mangará.

—**ESCULENTO** — Taioba.

CAI ALU — Quiabo.

CALAMO BRAVO — *Mariscus jacquinii* HBK. Ciprácacia erbácia e tuberosa, com folhas lineares; fls em espigas, dispostas em umbela; fr aquênio. Hidrófilo.

CALANDEIRINE — Capim calandrina.

CALANGA DA CHINA — Calanga do Japão.

—**DO JAPÃO** — *Kempferia calanga* L. Zingiberácia erbácia, ornamental, de folhas radicantes, notável pelo rápido desenvolvimento do elemento floral.

—**PEQUENA** — Calanga do Japão.

—**VERDADEIRA** — Calanga do Japão.

CALÇADO DE VÉNUS — Algumas sps de Orquidáceas do Ge *Cypripedium*.

CALCANHAR DE COTIA — Billreiro.

CALÇAO DE VELHO — Verbasco do Brasil.

CALÇAS DE VELHA, ou de VELHO — Verbasco do Brasil.

CALÉNDULA — Clumes de velha, Mal-me-quer (Impreciso por ser conferido ainda a outras sps.)

CALJANDRA DOS JARDINS — Borla de bispo.

CALICE DE VÉNUS — Trombeta branca.

CALONDRO — Cabaça.

CALUMBA — Calunga.

CALUMBI — Unha de gato.

—**D'AGUA** — *Mimosa asperata* L. Leguminosa arboreta, de folhas compostas pinadas e vagens pilosas. Sp inculta.

CALUMI — Sensitiva.

CALUNGA — *Simaruba ferruginea* S. H. Simarubácia arbórea. Penífolios de elementos elípticos; fls em cachos terminais. Corteza e rãs febrífrugas, estomáquicas e tóxicas. Também a *Quassia ferruginea* D. Diet. Tem o mesmo apelido q milhomens (*A. trilobata*).

CAMACAN — Mutamba.

CAMAÇARI — *Caraipa fasciculata*

Cham. Guttifera de grande desenvolvimento, servindo para mastros de embarcações. Cau linheiro; fls em panículas terminais; cápsula triangular e ereta. Lenho, róseo, para marcenaria. Látex inseticida, usada na cura da sarna e das feridas.

—**DA BAHIA** — Camaçari.

—**DE CARUNCHO** — Camaçari.

—**VERMELHO** — Camaçari.

CAMA DE COELHO — Bamburral.
—DO MENINO DEUS — Brillantina
(*P. microphylla*).

CAMALOTINHO — Arroz do brejo.
CAMAMBAIA — Barba de veado e às
Samambaias (Indistintamente).

CAMAMBU — Camapu.

CAMAPU — *Physalis alkekengi* L e
outras Solanáceas congêneres: *P. brasiliensis* Send., *P. angustata* L.,
P. peruviana L., *P. pubescens* L.
e *P. viscosa* L. Sps sub arbustivas
ou erbáceas, eretas ou prostradas,
caracterizadas pelas suas bagas es-
féricas e comíveis, encerradas em
cápsula membranosa, formada pelo
cáliz. Este envólucro — hexágono
— e o fr. constituem a lanterna.
Sps incultas às quais se atribuem
virtudes terapêuticas.

CAMAPUAN — Cunana. Lembra
também o Camapu.

CAMARÁ — Indistintamente os Ca-
marás e Cambarás.

—AMARGOSO — Pau Pereira.

—APERÁ — Mentrasto.

—BRANCO — Cega olho.

—BRAVO — Cega olho.

—DE BILRO — Pau Pereira.

CAMARADINHA — Verbena.

CAMARÁ DO MATO — Pau Pereira.

—JAPÓ — Maria preta (*C. curassavica*).

CAMARAMBÁIA — Cruz de Malta.

CAMARASINHO DE CAMPINA —
Cega olho.

CAMARATUBA — *Cratylia floribunda* Bent. Leguminosa semi escan-
dente, com trifólios velutinos, fls
em cachos; vagens. Pouco exigente
e boa forragem, impregnando ao
leite das vacas o aroma de suas fls.
Tem sido incuído no Ge Disc'ea
da mesma Fa.

CAMARU DA BAHIA — Imburana.

CAMASSARI — Camaçari.

CAMBA-ACAN AÇA — Mutamba.

CAMBAIBA, CAMBAJBINHA — Li-
xeira.

CAMBANAMBI — Tamboril.

CAMBARÁ — Apelido de algumas As-
clepiadáceas, Loganiáceas e Voquisá-
cias, muitas Compostas e numerosas
Verbenáceas. Das Compostas serve
de exemplo o *Eupatorium heteran-*
thus Bak — Erbácia piloso, com
fls longo pecioladas, fls em capítulos
encarnados e fr aquênio. Sp ornamental.
Verbenáceas: *Lantana camara* L.,
L. undulata Schr. — Arbusto de cau canelado, fls esca-
broas e fls albas em espigas; *L.*

radula Sw., do mesmo tipo da pre-
cedente, porém com fls em capítulos;
L. mutabilis Lipp., cujas fls,
alternativamente, são albas, amare-
las e encarnadas. São sps elegan-
tes, incultas, forrageiras e medici-
nárias.

—**BRANCO** — *Lantana brasiliensis*
Lk. Verbenácia arbustiva, com fos
lancioladas; fls em capítulos erectos
e fr drupáceo. Forragem.

—**DA FOLHA GRANDE** — *Lantana macrophylla* Sch. Verbenácia com
os caracteres gerais do Ge. Fos
ampolas, fls amarelas em capítulos,
passando ao encarnado. Peitoral.
Moquinia polymorpha Les. Compos-
ta arboreta, de cau gretado, fos lan-
cioladas, fls em cachos de capítulos.
Lenho aromático para carpintaria.
Peitoral.

—**DE CHEIRO** — Cambará vermelho.

—**DE CHUMBO** — Cambará verme-
lho.

—**DE DUAS CORES** — Cambará (*L.*
mutabilis). Impróprio, porque nes-
ta sp ha 3 cores, impreciso uma vez
que ha outros em idênticas condi-
ções.

—**DE ESPINHO** — Cambará verme-
lho.

—**DE FOLHA MIUDA** — *Moquinia paniculata* DC. Composta arbusti-
va, de fos ovalares, fls em capitu-
los, dispostos em paniculas difu-
sas. Fr. aquênio.

—**DE MEIA LEGUA** — Cambará branco. (Por ser padrão de boa
terra, meia legua, em seu derredor.

—**DE LIXA** — Cambará branco.

—**DO MATO** — Cambará da folha
grande e Pau Percira.

—**GUAÇU** — *Vernonia polyanthes*
Les. Composta arbustiva ou arbo-
reta, de fos lancioladas, fls em ca-
pitulos, dispostos em paniculas de
ramos recurvados. Fr aquênio. Cór-
tex radicular fosforescente.

—**JUBA** — Cambará vermelho.

—**MIUDO** — Cambará vermelho.

—**MIUDO DE ESPINHO** — Cambará vermelho.

—**TINGA** — Cambará branco.

—**UÇU** — Pau cachorro.

—**VERDADEIRO** — Cambará verme-
lho.

—**VERMELHO** — *Lantana camara*
L. ou ainda *Lantana aculeata* L.
Impropriamente denominado C. de
espinho, pois é apenas aculeado.
Uma das sps mais representativas
do Ge *Lantana*. Verbenácia arbus-

tiva, de cau quadrangular. Fos ovalares, escabrosas, aromáticas e serrilhadas; fls vermelhas, em capítulos, no vértice de longa fuste. Sp meífera, peitoral, febrifuga e tônica. Ornamental.

CAMBARBA, CAMBARRA — Lixelra.

CAMBIUNA — Jacarandá preto (D. nigra).

CAMBOATÁ, CAMBOATÁ, CAMBOTÁTAN — *Cupania racemosa* Radi. Sapindácia arbórea de fos compostas pinadas, fls em cachos axilares e fr capsular e ajado. O Bilreiro tem o mesmo apelido.

—BRANCO — *Matayba guyanensis* Aubl. Sapindácia arboreta, ramosa, com fos compostas de amplos folhos ovalares, fls albas, em espigas eretas e fr capsular.

—DA BAHIA — *Picramnia bahiensis* Turc. Simarubácia arbórea, com fos compostas pinadas, fls violáceas e fr bacúcio-olíveo. É amargo-tônico e dá matéria corante.

—DE CAPOEIRA — Camboatá.

—DE REGO — *Garuga pinutta* — Burserácia arbórea, de cau canelado e pardacento, fos compostas pinadas e fr drupáceo. Madeira de lei. Existe uma var conhecida por C. azeite de peixe, cheiro que exala de seu lenho.

—MOSQUITEIRO — Sete casacas.

—PEQUENO — Carobinha de carrasco.

—SETE CASACAS — Sete casacas.

CAMBOETEIRO — Jacaré.

CAMBOI, CAMBOIM — Cambuí.

CAMBOITÁ — Camboatá (Indistintamente).

CAMBORIUNA — Jacarandá preto (D. nigra).

CAMBOTA — Bilreiro e Camboatá.

CAMBOTÉ — Carobinha do carrasco.

CAMBRAIA — Sangue de drago.

CAMBUCA, CAMBUCAZEIRO — *Maurilia edulis* Ndz. Mirtácia frondosa, de fos lancioladas, fls albas caulinares e fr drupáceo amarelo e comível. Madeira de lei.

—AMARELO — Cambucá.

—VERDADEIRO — Cambucá.

—VERMELHO — *Myrciaria plicatostipata* Berg. Mirtácia de bom desenvolvimento, com frs édules — bagas — vermelho escuros. Sp ornamental.

CAMBUCI, CAMBUIM — Cambucá e especialmente o Cambuí.

CAMBUI — *Eugenia vejosiana* Berg. Mirtácia arbórea e elegante. Cau liso; fos lancioladas; fls albas, em cachos; bagas édules. Adstringente. *Myrcia sphaerocarpa* DC. Mirtácia arboreta, com fos lancioladas, fls em panículas e bagas globoides, pouco apetecidas. Lenho para obras externas. Tem ainda o mesmo apelido o Angico branco.

—ANGICO — Angico branco.

—BRANCO — Angico branco.

—DA PRAIA — Cambuí e Feijão da praia.

—DA RESTINGA — Cambuí e Feijão da praia.

—DE CACHORRO — Cambuí e Feijão da praia.

—FERRO — Angico do campo.

—PRETO — *Myrciaria iheringii* Berg. Mirtácia arbustiva, de fos lancioladas, fos axilares e bagas roxas comíveis. Adstringente e madeira de primeira

CAMBUISINHO — Cambuí preto.

CAMBURI — Banana roxa.

—DE CHIFRE — Banana roxa.

—VERDADEIRA — Cambuí (*E. vellosiana*).

—VINHÁTICO — *Enterolobium lutescens* F. Ali. Leguminosa alta, do mesmo tipo do Vinhático. Sp tânigera.

CAMERUNGA — Carambola.

CAMINHO DOS PRADOS — Alcarávia.

CAMOETEIRA, CAMOETEIRO — Jacaré.

CAMOMILA — Macela, especialmente a gallega.

—ROMANA — *Anthemis nobilis* L. Composta erbácia, com fos multipartidas, fls em belos capítulos aromáticos. Além de ornamental é amargo-tônica, febrifuga e insecticida.

—VULGAR — Macela romana.

CAMPAINHA — Numerosas Campaniadas e convolvulárias, algumas tão somente conhecidas por dize apelido: Campanula glomerata L. Erbácia de fos lancioladas, fls violáceas e campanuladas. *Ipomoea brasiliiana* Meis. Convolvulácia armentosa de fos cordiformes e fls rosáceas e campanuladas. Morreria cicyoides Haj. Outra convolvulácia de pentáfilos elípticos e fls alvas campanuladas. Bons-dias e Cande-labro são aps com o referido apelido.

- AZUL — *Ipomoea longicuspis* Meis. Convolvulácia de folhas lobadas e flores arroxeadas.
- BRANCA — Salsa da praia (Impreciso, muitas espécies estão no mesmo caso e esta, por vezes, dá flores azuladas).
- DE CANUDO — Canudo.
- DE OURO — Flor de pau.
- DOS JARDINS — Chicara e pires.
- PURPÚREA — Campainha vermelha e Bons dias.
- RÓSEA — Canudo.
- VERMELHA — *Ipomoea horsfalliae* Hk. Convolvulácia de pentafólios lúzidios e verde escuros e bellissimas flores campanuladas, purpúreas, em pequenas cimeiras. Nenhuma trepadeira lhe sobressai em decoração. Sua var. alba é menos apreciada.
- CAMPOITA** — Camboata (Indistintamente).
- CANA** — Denominação de algumas Aráceas, Equisetáceas, Leguminosas e mui especialmente Gramíneas e Zingiberáceas.
- CANABI** — Conabi.
- CANA BRANCA** — Cana de macaco.
- BRAVA** — *Erianthus saccaroides* Mich. Gramínea rizomatosa, com o aspecto da Cana de açúcar, tendo porém o cau — colmo — fistuloso. Forma também touças e dá longos penachos florais.
- CANA VERDADEIRA** — Capim de Angola.
- DA CHINA** — Cana de açúcar (Var. saíngor).
- DA INDIA OU ÍNDICA** — Bananeirinha de jardim.
- DA TERRA** — Cana do mato.
- DE AÇUCAR** — *Saccharum officinarum* L. Gramínea de colmo meduloso, podendo atingir mais de 3 metros. Importante espécie que, há três séculos, constitui fonte de riqueza bahiana e onde exuberantemente têm sido experimentadas numerosas variedades, entre as quais as POJ. Dentro das variedades mais conhecidas, reproduzidas por estacas, ou "toléteas", tem-se: amarela, bourbon, caiana — corruela de Cayenne — crioula, imperial, luisieu, listrada, rajada, rosa, roxa, sarrango — corru'e a de salangor — etc. Adstritas a degenerações e moléstias, as variedades são geralmente renovadas.
- DE RAMBU** — Bambu.
- DE ESPANHA** — Cana do reino.
- DE FLECHA OU FRECHA** — Cana frecha.

- DE MACACO** — *Costus spicatus* Sw. Zingiberácia sub arbustiva. Latifólios ovalares, com bainhas; flores amarelas, em espigas e com brácteas encarnadas; fr. cápsula. Colmo meduloso e suculento, tido como refrigerante. *Costus spiralis* Rose. Outra espécie da mesma Fa. do mesmo sítio. Ambas ornamentais.
- DE PASSARINHO** — Andrequeia e Taboquinha.
- DE PROVENÇA** — Taquara (*A. donax*).
- DO BREJO** — Cana de macaco. Impreciso por ser conferido a outras espécies como o Cardamomo.
- DOCE** — Cana de açúcar.
- DO MATO** — *Costus igneus* Brow. Zingiberácia erbácea, semi ereta, de folhas ovalares, flores encarnadas, em cachos e fr. capsular. Colmo suculento e mucilaginoso.
- DO REINO OU RENO** — Taquara (*A. donax*).
- DO RIO** — Cana do mato e Ubá.
- DOS JARDINS** — Bananeirinha de jardim.
- DOS PAMPAS** — Capim dos pampas.
- FISTULA** — Chuva de ouro (*C. fistula*), Fedegoso, Fedegoso do mato, Gencuna e outras Leguminosas do mesmo Ge: *Cassia ferruginea* Serad., *C. multijuga* Rich. dentre outras.
- FISTULA AMARELA** — Chuva de ouro (*C. fistula*).
- FISTULA DE SÃO-TOMÉ** — Chuva de ouro.
- FISTULA IMPERIAL** — Chuva de ouro.
- FISTULA VERDADEIRA** — Chuva de ouro (*C. fistula*).
- FLECHA** — Cana frecha e Ubá.
- FRECHA** — *Gynerium sagittatum* Beau. Gramínea alta e elegante, em touceiras. Folhas lineares, longas e invaginantes; flores formando grandes penachos. Forragem de segunda; contém açúcar, em seus brotos suculentos.
- FRISTA** — Designação imprecisa de várias Leguminosas do Ge *Cassia*.
- IMPERIAL** — Vid Cana de açúcar, var. listrada.
- CANAMBI** — Tingui (*P. acuminatus*).
- CANAMO** — Cânhamo (Indistintamente).
- CANANGA DO JAPÃO** — Calanga do Japão.
- CANA PAUBA** — Mangue amarelo e M. vermelho.

- PONGA — Mangue amarelo e M. vermelho.
- PRISTA — Vid Cana frista.
- CANAPU — Camapu.
- CANARANA — Cangerana e Capim de Angola.
- FINA — *Panicum geminatum* Forsk Gramínea arbácia, de haste delgada e estriada. Fos lineares; fls. em espigas de espiguêtas, em posição distica. Sp hidrófila e forrageira.
- ROXA — *Panicum sizanoides* HB K. Gramínea sub arbustiva. Colmo estriado, com nós roxos; fos lancioladas, invaginantes e liguladas; fls em abundantes cachos de espiguetas. Boa forragem.
- CANARIA — *Cratylaria maypurensis* HBK. Leguminosa arbustiva e arenícola. Trifólios lanciolados; fls amarelas em cachos abundantes; vagens.
- CANA ROXA — *Saccarum violaceum* Humb. Var de Cana de açucar, de colmo roxo e pouco apetecida.
- ROXA DO BREJO — Cana de macaco.
- TINGA — Capim dos pampas.
- UBÁ — Ubá.
- CANCEROSA, CANCROSA — Malteno.
- CANCHO — Cauchó.
- CANDEIA — Designação de algumas Compostas, nem todas bem classificadas. São arboretas ramosas e incultas, cujo lenho inflamável serve de candeia. É muito encontrada a *Vanillosmopsis discolor* Bak. Sp inculta com ramificação difusa, fos lancioladas e fls em capítulos, constituindo grandes panículas eretas. Apresenta papus esbranquiçados. Embora de Ge *Piptocarpa* deve existir na Bahia, dentre outras sps a *Iundiana* Bak. e a *rotundifolia* Bak e algumas Candeias do Ge *Lychephora*, são bastante encontradas as do Ge *Moquinia*.
- BRANCA — *Moquinia lucida* Bak. Composta arboreta. Fos lancioladas, coriáceas e com o dorso branco; fls com papus esbranquiçados, em capítulos, dispostos em umbeja.
- DE CAJU — Pacari.
- MINHOÁ, MINHOAN — *Moquinia lucida* Bak, var (?). Do mesmo tipo da Candeia branca, porém mais elegante, com fls de papus amarelos e aromáticas.
- MUCERENGUE — Candeia Branca.
- CANDELABRO — *Polygala hygrophila* HBK. Poliga'facia erbácia, de fos lineares, fls em espigas e fr capsular. Sp hidrófila. Tem o mesmo apelido o Lustre, e mais acertadamente.
- CANDIEIRO — Candeia (Indistintamente).
- CANDOBLÉ — Cunananá.
- CANELA — Designação de certas Lauráciás aromáticas e medicinais, que se tem conferido a várias sps de Acantáciás, Compostas, Estiracáciás, Euforbiáciás, Leguminosas, Melastomáciás e Véjosianas. O vocabulo, sem nenhum qualificativo, a Caneleira da Índia e a poucas Lauráciás, como a *Nectandra grandiflora* Nees. Árvore alta, da fos coriáceas e oblongas, fls alvacentas em panículas e pequenas bagas.
- AMARELA — *Nectandra psalmonophylla* Nees. Laurácia arboreta de fos lancioladas e coriáceas, fls albas em cachos e bagas. Ainda com o mesmo apelido a Barauna, a Baruna e a Embiuia (*N. nitidula*).
- AMARGOSA — Casca de anta e Caneleira preta.
- BABOSA — Canela pimenta.
- BARAUNA — *Ocotea spectabilis* Mez. Laurácia alta. Fos lancioladas; fls. aromáticas, em panículas compostas; fr baga. Córtez amargo-tônico e adstringente. Lenho para obras externas.
- RASTARDA — Canela da fo. larga.
- BATALHA — Canela da fo. larga.
- BRANCA — Canela cheirosa e principalmente a Erva moura do sertão.
- BURRA — Canela capitão mór.
- CAPITÃO MÓR — *Nectandra myriantha* Meis. Laurácia arbórea. Fos ríjas e elípticas; fls albas, aromáticas em cimeiras difusas; baga amarela. Lenho bom para embarcações e de cheiro fecalóide.
- CHEIROSA — *Endlicheria hirsuta* Nees. Laurácia arbórea, com fos coriáceas e lancioladas, fls em cachos espécieiformes e muito aromáticas, fr bacálio. Lenho alvo para carpintaria.
- DA BAHIA — *Ocotea bahiensis* Mez. Laurácia arbórea. Fos lancioladas, fls em panículas difusas e fr bacálio. *Ocotea opaca* Mez. Arboreta litorânea, aromática e do mesmo feitio da sp precedente.

- DA FOLHA GRANDE — *Nectandra rigida* Nees. Laurácia alta, com fos lancioladas, amplas e coriáceas, fls albas e fr bacálio. Lenho para marcenaria.
- DA FOLHA LARGA — *Nectandra latifolia* Maz. Laurácia arbórea com latifólios ovalares, coriáceos e luzidios na face ventral; fls albas em cimeiras e fr bacálio.
- DA FOLHA MIUDA — Canela cheirosa.
- DA INDIA — *Cinnamomum zeylanicum* Syn. ou *Laurus cinnamonum* L. Laurácia arbórea, elegante e copuda. Fos aromáticas, fls em panículas e fr baga. Excelente madeira, cujo córtex dá a "canela" de largo emprego em culinária e em farmácia, por ser estimulante e eupéptica. Desenvolve-se na Bahia.
- DA PRAIA — *Ocotea complicata* Mez. Laurácia arbórea de córtex cinzento, fos ovalares e ríjas, fls albas, aromáticas, bracteadas e em panículas; fr baga; córtex aromático.
- DE CACHORRO — *Lippia* sp. Verbenácia arbustiva, de fos crenadas e ovalares.
- DE CAPOEIRA — Canela seca.
- DE CEILÃO — Canela seca.
- DE EMA — Cortas *Velosia* das espécies *Velosia* e *Barbacena*. São geralmente xerófitas, de longas fos verticiladas, arboretas, com fls violetas. O cau tem o aspecto do turso de ema, podendo seus ramos servirem de brocha para caiadura. Sps mais destacadas: *Velosia atropurpurea* M., *V. mariimba* V., *V. flavicans* M., *V. sulphurea* Poh., *Barbacena flava* M. e *B. purpurea* Hk.
- DE FOLHA LARGA — Embuia e especialmente a Canela da fo larga.
- DE FOLHA MIUDA — Canela cheirosa.
- DE JUDEU — *Borreria poaya* DC Rubiácia do grupo das Ipecacuanhas.
- DE MAU CHEIRO — Canela capitão mór.
- DE PAPAGAIO — Canela cheirosa.
- DE PÁRAMO — Casca de anta.
- DE VEADO — *Actinostemus lanceolatum* Said. Euforbiácia arbórea e tanifera. Fos lancioladas; fls unisexuadas em espingas; fr cápsula. Lenho duríssimo, para carpintaria. Tem idêntico apelido a Canela preta (*N. mollis*).

- DE VELHA — *Miconia albicans* Trin. Melastomácia arbórea e inculta. Fos com nervuras longitudinais, interligadas por muitas outras transversas; fls em cachos eretos e abundantes. Preconizada com excelente eupéptico.
- DE VELHA — *Ciumes de Velha*.
- DO CAMPO — Canela cheirosa.
- DO MATO — Louro bravo.
- DURA — Canela da fo grande.
- EMBUIA — Embuia.
- FEDORENTA — *Ocotea blanchetii* Mez. Laurácia arbórea. Fos longo elípticas, coriáceas e luzidias na pagina ventral; fls axilares em panículas. Lenho de segunda, para caixotaria, de cheiro fecaloide.
- FÉTIDA — Chichá. Cabe melhor à Canelas de mau cheiro — Capitão mor, Fedorenta e outras.
- FUNCHO — Canela gassafráz.
- GRANDE — Canela da fo larga.
- JACUÁ — Louro (*O. teleiana*).
- INHAIBA — Canela preta.
- JAPÓ — Canela capitão mór.
- LIMÃO — Louro (*Ocotea teleiana*).
- LOURO — Canela fedorenta.
- MANDIOCA — Mandiocai.
- MASSAPÉ — Canela preta.
- MERDA — Canela capitão mór.
- MESCLA — Canela barauana.
- MIRIM — Canela seca.
- CANELÃO — *Ocotea spixiana* Mez. Laurácia arbórea, de fos coriáceas, longo elípticas e de preço' o cotonoso; fls em panículas; fr baga. Tem o mesmo nome a Canela capitão mór.
- CANELA PARDA — Louro amargo-sô.
- PIMENTA — *Ocotea puberula* Nees. Laurácia arbórea. Fos lancioladas, coriáceas e luzidias; fls axilares, em pequenos rácimos, albas; fr baga escura. Lenho para caixotaria e aromático, como seu córtex.
- POCA — *Styrax latifolius* Pohl. Estiracácia arbustiva. Fos longo elípticas, coriáceas e de nervuras salientes; fls albas, em cachos compostos; fr drupa, encarnada e tomentosa. Lenho para carpintaria. A Cuia do brejo tem o mesmo apelido.
- PREGO — Canela preta.
- PRETA — *Nectandra globosa* Mez. Laurácia alta, com fos coriáceas e ovalares, fls albas, em cachos corimbosos e fr — baga — globóides. Ra dá corante vio'áceo. Lenho de cerne escuro e alburno encarnado.

- Nectandra mollis** Nees. Árvore de ramos pilosos, folhas lancioladas e coriáceas; fls albas aromáticas, tomentosas e em cimeiras, fr bagas amarelas. Lenho resistente, para carpintaria e marcenaria.
- PRETA AMARGOSA** — Louro amargo.
- PRETA DA SERRA** — Louro amargo.
- PRETA VERDADEIRA** — Canela preta (*N. mollis*).
- PUANTE** — Canela capitão mór.
- RAPADURA** — Caraípé verdadeiro (*L. utilis*).
- SANTA** — *Vochysia laurifolia* War. Voquiácia arboreta e decorativa. Folhas lancioladas; fls com tripétalos, monadelas e em cachos; cápsulas da aromática, lenho para carpintaria.
- SASSAFRÁZ** — *Ocotea sassafras* Mez., ou *Mespilodaphne sassafras* Meis. Laurácia alta e decorativa. Folhas lancioladas e coriáceas; fls em espigas de longa raque; baga. Corteza e raiz aromáticos, bem como todas as porções aéreas da sp. Lenho e sementes oleosas. Madeira para carpintaria.
- SASSAFRÁZ DA SERRA** — *Ocotea indecora* Schot. Laurácia arboreta, do tipo da *C. sassafraz*, tendo porém folhas mais largas.
- SECA** — *Nectandra ieucaantha* Nees. Laurácia arbórea, com folhas coriáceas e lúzidas, fls aromáticas, esbranquiçadas e em cachos; baga. Sp amargo-tônica e aromática.
- SEIBA, SEIVA, CEIBO** — Canela da fo grande.
- TAPINHOAN** — *Ocotea glauca* Mez. Laurácia arbórea, de folhas elípticas e coriáceas, fls em cachos de espigas. Tem o mesmo apelido o Tapinhoã.
- TRAMPA** — Canela capitão mór e *C. fedorenta*.
- CANEEMA** — Coerana (Indistintamente).
- CANFO** — Bacupari.
- CANGABÁ, CAGAMBA, CANGAMBÉ** — Manacá.
- CANGERANA** — Cabralia cangerana Sa'd. Meliácia de ponderável altitude e envergadura. Imparipinifólios; fls albas e axilares; fr capsular não comível. Corteza amargo e resinoso; raiz adstringente. Febrifugo. Madeira de primeira, amarela ou encarnada, consoante a var.
- AÇU** — Cangerana.
- MILUDA** — Bireiro.
- CANGICA** — Pau concha.
- CANGUÇU** — *Buchnera rosea* HBK. Ecrofúlia arbustiva, com folhas lancioladas, fls em espigas e fr capsular. Tida como letárgica.
- PRETO** — Canguçu.
- CANHAMO** — Diamba.
- AMERICANO** — Papoula de São Francisco.
- AFRICANO** — Espada de ogum.
- BRASILEIRO** — Papoula de São Francisco.
- DA CHINA** — Rami.
- DA ÍNDIA** — Diamba.
- DA MAURICIA** — Piteira (*F. gigantea*).
- DA NOVA ZELÂNDIA** — Espada de ogum e, especialmente o Linho da N. Zelândia.
- DE BOMBAIM** — Papoula de S. Francisco (Injustificável o apelido).
- PERRINE** — Papoula de S. Francisco.
- VERDADEIRO** — Diamba.
- CANHARANA** — Cangerana.
- CANHERANA** — Cangerana.
- CANIÇO** — Taquara e Taquari.
- CANIMARCA** — Cipó cruz.
- CANINANA** — Securidácia lanceolata S.H. Poligálacia sarmentosa, de folhas lancioladas e coriáceas, fls rosas, em cachos, que pela abundância e beleza, distinguem esta sp. Tem o mesmo apelido o Cipó cruz e a *Chilococca densiflora* M., que é Rubiácia arbustiva e decorativa, tida como diurética.
- CANIVETE** — *Erythrina reticulata* Pres. Leguminosa do mesmo feitio do Mulungú. Arboreta aculeada, trifoliada, fls sanguineas e vagens.
- CANJARANA** — Cangerana.
- CANJOÃO** — São João.
- CANOÁ** — Trapoçiraba-açu. Em virtude das brácteas envolverem dessa forma as fls.
- CANOÃO** — Capim palmeira e outros, donde a imprecisão do apelido.
- CANSA CAVALO** — Maria preta. Impreciso, pois não se tem certeza a qual delas se ajusta.
- CANSANÇAO** — Designação de algumas Euforbiáceas e Urticáceas, que se caracterizam, especialmente, por pelos urentes e espinhos ou acúlicos. Tais sps podem ser cíndidas em Cansanção de leite e C de espinho. Com o mesmo nome se

- conhece, ainda, a *Loasa parviflora* Schrad. Loasiácia erbácia e urente. Fos ovalares e denteadas; fls a base, em pequenos rácimos; fr bacácio.
- BRANCO — Cansanção de leite.
- CANUDEIRO — Sapucainha. Mui impreciso, por se ajustar a outras espes.
- DE ESPINHO — Urera baccifera Gaud. Urticácia arbustiva e aculeada. Fos longo ovalares; fls em cimeiras; fr aquênio comível. Do mesmo Ge e da mesma categoria, devem ser citadas a *U. sub peltata* Miq. e a *U. Caracasana* Gris. Arbusto espinhosso de fos cordiformes e fls em cimeiras. Fr aquênio.
- DE LEITE — Jatropa urena Muell. Euforbiácia rústica, lactífera e inteiramente munida de pêlos mui urentes. Fos palmadas; fls pequenas, alvas, em cimeiras. Fr cápsula. O latex dá borracha. *J. vitifolia* M Arg. Sp do mesmo tipo, porém arbustiva e com espinhos. Cau fistuloso, fr. elipsóide. Também da mesma Fa. tem mercido o mesmo apelido o Penão.
- VERDADEIRO — Cansanção de espinho (*U. sub peltata*). Improprio, pois, quanto aos efeitos urentes, o C. de leite excede aos demais.
- CANUDO** — *Ipomoea fistulosa* M. Convolvulácia arbustiva e esgaçada. Cau fistuloso; fos lancioladas; fls campanulas vloácticas e fr capsular. Cultivada como ornamento mas considerada praga para o agricultor. Abundantissimo nas margens do S. Francisco.
- AMARGOSO — Pau Pereira.
- DE CACHIMBO — Canudo de pito. (*M. fistulifera*) e São João.
- DE PITO ou DE PITA — Sapucainha. Apesar de consagrada a essa sp, o apelido tem sido conferido a outros Ves: S. João; *Cassia floribunda* Cav. Leguminosa ornamental e arbustiva. Fos compostas, paripinuladas; fls amarelas axilares e terminais; fr vagem erecta. Fos que substituem a Sene; *Mabea fistulifera* M. Euforbiácia arboreta e elegante, de fos lancioladas, fls em beás panículas e fr capsular. Sp adstringente, amargo-tônica e febrífuga.
- DE PURGA — *Rauwolfia blanchetii* DC. Apocinácea arbustiva, com fos ovalares e verticiladas, fls em pequenas umbelas e fr drupáceo. Ral purgativa.
- DE SAO JOAO — Canudo de pite (*M. fistulifera*).
- ERBÁCIO — *Ipomoea sanfranciscana*. Convolvulácia erbácia, rizomatosa e rústica. Embora pareça bastante com o Canudo (*I. fistulosa*), seu cau não é lenhoso. As tuberas, ingeridas pelo gado, são tóxicas.
- CANUDEIRO** — Canudo de pito (*C. bicapsularis*) — São João.
- CAOBI** — *Copaiba vermelha*.
- CAOPUNGA** — Coentro.
- CAPA HOMENS** — Milhomens (*A. cymbifera*). Impreciso, porque também é do Cipó caboclo, da Contra erva e da Paina de penas.
- CAPAMONGA** — Erva do diabo.
- CAPAROSA** — *Neea theifera* Oerst. Nictaginácia sub arbustiva, com fos elípticas e opostas, fls dióicas, em cachos de longa raque e fr aquênio. Adstringente. *Ludwigia caparosa* Bail. Enoterácia arbustiva e tunígera. Fos lancioladas, fls amarelas e fr cápsula. Dá matéria corante negra.
- DO CAMPO — Caparosa (*N. theifera*).
- SILVESTRE — Caparosa (*N. theifera*).
- CAPEBA** — *Piper marginatum* Jacq., *P. rohrri* DC. Piperáceas sub arbustivas e afins. Cau geniculado; fos escabrosas, largo ovalares e aromáticas; fls em espigas. Tidas como desobstruentes do fígado e diuréticas.
- CHEIROSA — Capeba.
- CAPECHENGUIL** — Capichingul.
- CAPELA** — *Hemigraphis colorata*. Acantácia ramosa e rasteira, para orla de canteiros. Fos ríjas, roxas e de brilho metálico na página superior e violácea na oposta; fls alvas pequenas.
- DE VIUVA — *Petrea volubilis* L. Verbenácia semi escandente, ramosa e ornamental. Fos coriáceas e verde escuras; fls azuladas ou violáceas, em longas espigas, coriáceas e eretas; fr capsular. Do mesmo tipo: *Petrea blanchetiana* Schnau e *P. racemosa* Nees.
- CAPENA** — Capeba.
- CAPERIÇOBA VERMELHA** — Caruru amargoso (*E. vajerianaefolia*).
- CAPETICÔBA** — Capiçoba.
- CAPEUA, CAPEVA** — Capeba.
- CAPIA** — Contra erva.
- CAPIANGA** — *Vismia brasiliensis* Chois. Guttifera arboreta e inculta.

Fos inteiras e ríjas; f's em cachos eretos; fr banga, com sementes aladas. Combustível.

CAPICHINGUI — *Croton celtidifolius* Baij. Euforbiácia arbustiva, de córtex encarnado. Fos ovalares, f's em cachos e fr capsular. Lenho alvo e leve. Dá matéria corante. Tem o mesmo apelido o Vejame (*C. campestris*).

CAPICOBRA — *Erigeron bonariensis*. Composta erbácia e ereta. Cau pouco ramificado; fos lineares & viscosas; f's em capítulos formando rácimos terminais e axilares. Sp ruderal. *Polygonum acre* H. B. K. Poligonácia erbácia, flexível e pubescente. Fos espatuladas; f's albas ou rosáceas. Anti hemorroidal, diurético e vermífugo.

CAPICURU — Bacupari do campo.

CAPILARIA — Avenca (*A. cap.-veneris*).

—**DE MONTPELIER** — Avenca (*A. cap.-veneris*).

—**DO COMÉRCIO** — Avenca (*A. cap.-veneris*).

—**DO MÉXICO** — Avenca (*A. tenurum*).

CAPIM — Denominação de algumas esp. de Comelináceas, Eriocáles, Liliáceas e Leguminosas, muitas Ciperáceas e inúmeras Gramíneas. São geralmente erbáceos ou arbúsculos, prolíficos, formando aglomerados e forrageiros.

—**ACU** — Capim lixa (Impreciso por ajustar-se a várias esp.).

—**ACU DA BAHIA** — *Eragrostis bahiensis* R. e Schul. Gramínia rizomatosa e resistente. Fos, com bainha e lígula, lineares, escuas e estriadas; f's em amplas panículas de espiguetas; fr cariopse. Forragem de segunda; ornamental.

—**AGRESTE** — Capim redondo e C. sapé. Muitas esp. merecem esse apelido, donde sua impropriedade.

—**ALPISTE** — Milho a'pista.

—**AMARGOSO** — *Elionurus latifolius* Uces. Gramínia cespitosa, de fos longas e lineares; f's violáceas, em panículas de espiguetas. Forragem amarva. *Pappophorum mucronatum* Nees. Gramínia resistente, de colmo geniculado, de meio metro de alta. Fos lineares, longas, estreitas e invaginantes; f's em panículas, estreitas, de espiguetas. Forragem medíocre. Ainda, com o mesmo apelido, se conhece o C. palmeira.

—**ANDIRAUICE**, **ANDREQUICE** ou ainda **ANDREQUICI** — Andrequicé.

—**ANGOLA** — Capim de Angola.

—**ANGOLINHA** — *Panicum heloides*. Sendo var do C. de angola, merecia ser então — *Echinochloa polystachya*, var heloides. Difere da sp mater, pelo menor porte, colmo mais delgado, mais tenro e filoso.

—**ARROZ** — Arroz de brejo a Canarrana roxa.

—**ATANA** — Capim mimoso.

—**AVEIA** — Capim massambrá.

—**BAHIA** — *Eriochloa annulata* Kunt. Gramínia estolhosa, rizomatosa, ramosa e resistente. Fos lineares, com bainha e lígula; f's em espigas de espiguetas argênteas. Sp elecente, boa forragem.

—**BAMBU** — *Pharus brasiliensis* Radd. Gramínia lenhosa e rizomatosa. Colmo ereto; fos de limbo longo ovalar, que falta nas fos inferiores, reduzidas às bainhas e às lígulas; f's em panículas difusas. Forragem de segunda.

—**BAMBUSINHO** — Bambusinho.

—**BARATA** — Capim santo.

—**BARBA DE BODE** — *Aristida pallens* Cav. Gramínia robusta e resistente. Colmo estolhoso; fos escabrosas e filiformes; f's em panículas violáceas, que caracterizam a sp. Forragem de segunda. *Cyperus compressus* L. Ciperácia ristílica, de haste filiforme, triangular; fos lineares e verticiladas; f's em umbela composta de espiguetas; fr cariopse. *Sporobolus sprengei* Kunt. Gramínia ereta de fos escabrosas, com bainha e lígula; f's em cachos de espiguetas. Forragem inferior.

—**BARBADO** — *Andropogon riedellii* Trin. Gramínia cespitosa e sub arbustiva. Forragem inferior.

—**BATALAL** — Capim cebola.

—**ROSTA DE ROLA** — Capim de rola.

—**BRANCO** — *Chloris polydactyla* Sw. Gramínia sub arbustiva, ereta. Fos lineares, longas e estreitas, com bainha e lígula; f's em cachos de espiguetas. Forragem inferior.

—**BURRAO** — Gramá de Jacobina.

—**CABELO DE NEGRO** — Capim gordura.

—**CARFLUDO** — *Axonopus barbatus* Chas. Gramínia ereta e sub arbustiva. Fos filiformes e ríjas,

- com bainhas; espigas de espiguetas. Sp hidrófila, apresentando algumas vars.
- CALANDRINE, CALANDRINA — *Dactyloctenium aegyptium* Rich. Gramínea rasteira, de colmo fieljoso: fos lineares, hiperas e pilosas; fls em 4 pequenas espigas de espiguetas; fr cariopse encarnada. Forragem de primeira.
- CAMALOTA — Gramá de Jardim.
- CAMELÃO — *Kyllinga rungensis* Lk. Ciperácia erbácia, em touceiras. Fos lineares e acuminadas; fls em capítulos; fr aquênio. Hidrófilo, adstringente.
- CANOÃO — Capim palmeira.
- CAPIRANA — Capim pé de galinha.
- CATINGUEIRO — Capim gordura.
- CEBOLA — *Chloris distichophylla* Lag. Gramínea erbácia e vivaz. Fos lineares, disticas, munidas de bainha e lígula; fls em cachos de espigas. Além de diurético e febrifugo é excelente forragem.
- CEVADA — Capim massambará.
- CHEIROSO — *Vetiveria zizanioides* Stapf. Gramínea erbácia, vivaz, em touceiras abundantes. Fos longas, lineares e invaginantes; fls em cachos de cachos de espiguetas. A sp. distingue-se pelas rns válidas e lenhosas, tidas por antissépticas, insecticidas, tónicas e calmantes, sendo, acima de tudo, muito aromáticas. Há outras sps conhecidas pelo mesmo nome, ou por Canim de cheiro, dentre Ciperácias e Gramíneas. Vd. Canim santo.
- CIDADE — Mate-me embora.
- COLONIAO — Capim Gulaé.
- COLUMBIANO — Capim Veneziano.
- COMPRIDO — *Paspalum dilatatum* Poir. Gramínea vivaz, erbácia e rizomatosa. Fos lineares e acuminadas, com bainha e lígula; fls em longa espiga de espigas. Sp mui resistente; boa forragem.
- COMPRIDO DA AUSTRÁLIA — Capim comprido.
- COMUM — Mate-me embora.
- COQUEIRINHO — *Panicum rugulosum* Trin. Gramínea erbácia e ramosa. Colmo geniculado; fos oválares, com bainha estrinda; fls em cachos de espigas. Boa forragem. Tem o mesmo apelido q. C. palmeira.
- CORTANTE — Tiririca (várias sps).
- CORTESIA — Capim d'egua.
- DA CIDADE — Mate-me embora.
- DA EUROPA — Capim sempre verde.
- D'AGUA — Canarana fina e Capim peba.
- DA GUINÉ — Capim massambará.
- DANDA — *Cyperus palustris* Schra, var *oligostachys*. Ciperácia erbácia, ereta, de pequeno porte. Fos radicantes, lineares, cujas bainhas constituem breve cauloma; fls em espigas, no ápice de longa fuste. Praga dos terrenos, em virtude da proliferação pelas suas tuberas. Fora da Bahia é conhecido por Tiririca. Não deve ser confundido com o Dandá, de rizomas odorantes.
- DA PRAIA — Capim de Angola e Rabo de mucura. Apelido impreso.
- DA PRAIA AÇU — Capim lixa.
- DA ROÇA — Capim grama.
- DAS BERMUDAS — Mate-me embora.
- DE ANDAR — Dandá.
- DE ANGOLA — *Echinochloa polystachya* Hitch. Gramínea vivaz, robusta e hidrófila. Fos lancioladas e invaginantes; fls em espigas de pequenas espiguetas eretas. Sp sub exponencial. Excelente forragem, prestante à fenação. Com mesmo apelido, o Capim do Pará.
- DE ANGOLA AÇU — *Panicum barbideone* Trin (Capim do Pará), var robusta. Gramínea com alguma semelhança com o C. de Angola.
- DE BEZERRO — Capim peba.
- DE BODE — Capim barba de bode (*A. pallens*).
- DE BOLOTA — *Rhynchospora caphalotes* Vahl. Ciperácia sub arbustiva, de fos lineares e verticiladas e fls em espigas, formando capítulos. Rico em celulose. O nome é pouco significativo, pois inúmeras Ciperácias possuem tais inflorescências, em forma de bolota.
- DE BOTAO — *Cyperus luzulae* Retz. Ciperácia erbácia, de haste triangular, fos lineares, com bainha e fls em capítulos de espiguetas, lembrando botões.
- DE BOTÃO GRANDE — Capim serra.
- DE BURRO — Mate-me embora.
- DE CABRA — *Setaria verticillata* Beau. Gramínea erbácia e ereta.

- Fos longo pecioladas e invaginantes; fls em cachos de espigas, densas e terminais. Forrageira.
- DE CAPIVARA — Capim pé de galinha (*P. cruz-galli*).
- DE CARNEIRO — *Paspalum chrysitis* Doel. Gramínea ramosa e erbácia. Fos lancioladas, fls em umbelas de espigas. Forragem de segunda.
- DE CAVALO — Capim do Pará e Capim Guiné.
- DE CHEIRO — *Andropogon nardus* L. Gramínea erbácia e ereta. Longas fos invaginantes, sobre haste geniculada; fls em cachos de espigas. Ros aromáticas; fos febrifugas e carminativas. *Torulinum confertum* Hamil. Ciperácia erbácia e vivaz. Haste triangular; fls em espigas, formando umbelas compostas. Sp litorânea. Vid Capim santo e *C. gordura*.
- DE CONTAS — Lágrimas de Nossa Senhora.
- DE CORADOURO — Capim pé de galinha.
- DE CORTE — Capim do Pará e C. Guiné. Impreciso por se ajustar a muitas outras sps forrageiras.
- DE CUBA — Capim massambará.
- DE EGUA — *Sacciolepis vulvooides* Trin. Gramínea hidrófila e sub arbustiva. Fos invaginantes, de limbo longo lanciolado; fls em espigas de espiguetas. Sp rica em celulose.
- DE ESTEIRA — Tabua.
- DE FEIXE — Capim de Angola.
- DE FRECHA — Cana frecha.
- DE FREI LUIZ — Capim gordura.
- DE GUATEMALA — Capim marinheira.
- DE JOHNSON — Capim massambará.
- DE LASTRO — Capim do Pará.
- DE MACAÉ — Capim de Pernambuco (*P. mandiocanum*).
- DE MISSANGA — Lágrimas de Nossa Senhora.
- DE MULA — Capim de Angola e C. Guiné.
- DE NOSSA SENHORA — Lágrimas de Nossa Senhora.
- DE PERNAMBUCO — *Paspalum mandiocanum* Trin. Gramínea erbácia, resistente e polimorfa. Fos lancioladas e invaginantes; fls em amplos cachos de espigas. Forragem muito nutritiva.
- DE PLANTA — Capim Bahia, C. do Pará e C. Guiné.
- DE RAIZ — Gramínea.
- DE RODES — *Chloris goyanensis* Kunt. Gramínea erbácia, estolhosa e vivaz. Fos lineares e invaginantes; fls em espigas, formando umbela. Sp forrageira, prolífica, resistente e exigente.
- DE ROLA — *Eragrostis ciliaris* Link. Gramínea erbácia, em touceiras. Fos lineares e invaginantes; fls em espigas de espiguetas. Bon forragem.
- DE SÃO CARLOS — *Paspalum laetum* Lam. Gramínea erbácia, ereta, pouco exigente e prestante à semente. Fos lancioladas e invaginantes; fls em espigas de espiguetas, longas e terminais. Forragem regular.
- DE SÃO PAULO — Capim marinheira.
- DE SAPO — *Paspalum extenuatum* Nees. Gramínea erbácia, com fos lancioladas e fls em espigas. Forragem de segunda.
- DE SOCA — Capim Guiné.
- DE TENERIFE — Capim favorito.
- DE TESO — Capim Venezuela.
- DE TOUCEIRA — C. Guiné.
- DE UM SÓ BOTÃO — *Kyllinga punctata* Mchx. Ciperácia erbácia, com fos lineares e fls terminais, constituindo um gomérulo de espiguetas — sp de capítulo solitário. Forragem de segunda. *Cyperus leucanthus* Schra. da mesma Fa e do mesmo tipo. O apelido abrange outras sps dos gêneros *Kyllinga* e *Cyperus*.
- DE VENEZUELA — Teosinte.
- DE ZORRO — Capim rabo de burro.
- DO CAMPO — Capim Bahia.
- DO EGITO — Capim massambará.
- DO PARÁ — *Panicum barbinode* Trin. ou *P. numidianum* Lam. Gramínea de longa haste, estolhosa e vivaz. Fos lineares e acumuladas; fls em cachos de espiguetas. Sp cespitosa, hidrófila; excelente forragem.
- DO POMAR — Capim pé de galinha.
- DO SALGADO — *Sesuvium portulacastrum* L., vars sub sessilis. Aizoácea erbácia das areias litorâneas descobertas. Sp carnosa e encarnada, com fos cilíndricas e pequenas fls encarnadas. Parecida com a Onze horas. Tem o mesmo apelido o Capotiraguá.

- DO SECO — Capim guiné.
- DOS CAPOEIRÓES — Capim dos pampas.
- DOS NAMBIQUARAS — Capim rabo de mucura.
- DOS PAMPAS — *Gynerium argenteum* Nees. ou *Cortaderia argentea* Stap. Gramínea arbustiva formando abundantes touceiras, viváz e de extraordinário efeito ornamental devido às abundantíssimas inflorescências prateadas, círcicas e de longa fuste. Fos longo lineares e radicantes.
- ELEFANTE — *Pennisetum purpureum* Schuma. Gramínea viváz, erbácia, mui resistente. Fos de metro, lineares e invaginantes; fls em cachos de longas espiguetas. Excelente forragem.
- ESPINHA DE PEIXE — Espinha de peixe.
- ESTRELA — *Dichromena ellata* Val. Ciperácia erbácia, de haste triangular, de fos lineares acuminadas — as em contacto com a inflorescência, dispostas em estrela, apresentando listra alva na base. Tem o mesmo nome a *Dichromena pubera* Val. Ciperácia erbácia e rasteira, com fls em capítulos. Diurcticos.
- FAVORITO — *Panicum Teneriffae* R. Br. Gramínea erbácia, viváz, em touceiras. Fos lineares e acuminadas, ríjas e glaucas; fls em cachos de espiguetas. Boa forragem, suportando cortes repetidos; prestante à fenoção.
- FINO — Capim do Pará, tido como a var *hellioides* desta sp. Apelido muito impreciso porque também é do C. Angolinha, do rabo de rato (*I. laxum*) e do Bahia.
- FINO DA FOLHA COMPRIDA — Canarana fina.
- GENIBRE — *Paspalum falcatum* Nees. Gramínea erbácia e tuberosa, de fos lineares e ríjas; fls em panículas de espiguetas. Boa forragem. *Paspalum maritimum* Trin. Sp estolhosa, tuberosa e erbácia. Tem ainda o mesmo apelido o Capim de Pernambuco.
- GERIVA — Capim palmeira.
- GIGANTE DAS BAIXAS — *Panicum grumosum* Nees. Gramínea erbácia e rizomatosa, em touças. Fos lancioladas e invaginantes; fls em cachos de espiguetas. Boa forragem dos solos úmidos e sombrios. *Panicum rivulare* Trin. Sp
- sub arbustiva, cespitosa e de colmo fistuloso. Fos longo lancioladas; fls em abundantes panículas. Boa forragem.
- GOMOSO — Marianinha (as spa conhecidas).
- GORDO — Capim gordura.
- GORDURA — *Panicum melinis* Trin. Gramínea erbácia, ramosa e ereta. Colmo nodoso; fos viscosas, lancioladas, aromáticas e pilosas; fls. em panículas de longa fuste. A sp figura entre as melhores forragens conhecidas. Consta que o odor das fos afugenta as serpentes.
- GRAMA — *Paspalum platicaulon* Poir. Gramínea erbácia, ramosa e estolhosa. Fos lancioladas e invaginantes; fls em espigas de espiguetas. Bôa forragem, resistente ao pisoteio.
- GRAMA DAS BAIXAS — Capim comprido.
- GRAMA DA GUINÉ — *Paspalum paniculatum* L. Gramínea sub arbustiva e estolhosa. Fos longo lancioladas, com bainhas; fls em espigas de espiguetas, ao longo da raiz. Bôa forragem.
- GUAIAMUM — Capim branco.
- GUATEMALA — Capim marmelada.
- GUINÉ — *Panicum maximum* Jacq. Gramínea sub arbustiva, resistente, viváz, ereta e ramosa. Fos longo lancioladas invaginantes; fls em grandes panículas de espigas, difusas e de longa fuste. Fr cariopse, procurado pelas aves. Sp polimorfa, destacando-se, entre suas vars o C. guinézinho, de fos menores, inflorescência pendente, forragem mais tenra, sendo por isso preferido.
- IMPERIAL — *Paspalum scoparium* Flueg. Gramínea sub arbustiva e decorativa. Haste cespitosa; fos longo lineares e com bainhas; fls em abundantes espigas compostas. Forragem de boa qualidade, apresentando a var — Capim teosinto — com o mesmo apelido.
- INDIGENA — Junco de cangaíba.
- JARAGUA — *Hyparrheria rufa* Stap. ou *Andropogon rufus* Kunt. Gramínea arbustiva, viváz e de rápido crescimento. Fos lineares, até 2 metros de comprimento; fls em espigas, formando pequenas inflorescências. Sp resistente, um tanto exigente e boa forragem, antes da

- floração. Disso lhe adveio o nome de provisório.
- JERIVA — Capim palmeira.
- JOSSA — Capim santo.
- LEQUE — Capim palmeira.
- LEVE — Capim santo.
- LIMAO — *Andropogon schoenanthus* L. Gramínea sub arbustiva, vivaz, estolhosa, formando touças. Fos longo lancioladas, invaginantes e aromáticas; fls em cachos de espigas. As tuberas e partes verdes, têm o odor do Limão. Serve para chá, sendo sudorífico.
- LIXA — *Panicum altissimum* Meyer. Gramínea de extraordinário crescimento, vivaz e resistente. Fos longo lancioladas, ríjas e asperas, com bainhas; fls em amplas panículas. Bôa forragem.
- LUCA — Capim mourão (*S. indicus*).
- MACHINDE — *Arundinella brasiliensis* Radd. Gramínea reptante, vivaz, resistente e polimorfa. Fos lineares e acuminadas; fls — denso cache de espigas. Forrageiro.
- MANDANTE — Capim de Angola.
- MANGA DO CAMPO — Capim amurgoso (*E. latiflora*).
- MÃO DE SAPO — Capim de sapo.
- MARAJÓ — Capim milhã do brejo.
- MARINHO — Capim santo (*K. odorata*).
- MARMELADA — *Panicum leandri* Trin. ou *Brachiaria plantaginea* Link. Gramínea erbácia, ramosa e pouco exigente. Fos lancioladas e escabrosas; fls em espigas de espiguetas. Bôa forragem.
- MASSAMBARA, MAÇAMBARA (melhor grafia) — *Andropogon halapensis* Brot. Gramínea vivaz, estolhosa, ereta, exponânea e pouco exigente. Fos lancioladas e invaginantes; fls em panículas de espigas e difusas; sementes apetecidas pelas aves. Bôa forragem, própria à fenação.
- MASSAMBARA MIRIM — *Andropogon nutans* L. Gramínea vivaz e rizomatosa. Fos lineares e arredondadas; fls em rácimos de espiguetas. Forragem fraca, mal aceita pelos animais.
- MASSAPÉ — Capim sapé.
- MATAI-ME EMBORA — Mate embora.
- MELADINHA, ou MELADINHO MINEIRO — Capim Guiné.
- MELADO — Capim gordura.
- MELOSO — Capim gordura.
- MEMBECA — *Andropogon viscidus* L. Gramínea erbácia, elegante, prestável à fenação. Fos asperas, lancioladas e largas; fls em cachos de espigas. Ra diurética. Sp rica em celulose; matéria para balaios, chapéus e outras utilidades domésticas.
- MERUQUIA — *Eragrostis vahlii* Nees. Gramínea erbácia, rizomatosa, ereta e cespitosa. Fos lineares, escabrosas e invaginantes; fls, em cachos de espiguetas, abundantes. Forrageiro.
- MEXICANO — Capim massambará.
- MILHAN BRANCO — *Panicum velutinum* Nees. Gramínea erbácia e ereta. Fos lancioladas e ásperas, com bainhas; fls em cachos de espiguetas. Forragem fraca.
- MILHAN DO BREJO — *Paspalum virgatum* L. Gramínea erbácia, hidrófila, ereta e cespitosa. Fos ríjas, longo lancioladas e invaginantes; fls em cachos de espiguetas. Bôa forragem.
- MILHAN DO CAMPO — Capim Guiné e o *Panicum crus-ardeae* Wil. Gramínea forrageira.
- MILHAN ROXO — *Panicum fasciculatum* Nees. Gramínea erbácia, pilosa e ereta. Fos lancioladas e invaginantes; fog em cachos de espigas. *Panicum malacophyllum* Trin. Gramínea sub arbustiva, com fos longo e ípticas, fls em espigas de espiguetas difusas. Sp anual e forragem de segunda. Tem, ainda, o mesmo apelido, o Capim milhan do brejo.
- MIMOSO — *Eragrostis articulata* Nees. Gramínea erbácia e xerófita. Fos lineares, ríjas e invaginantes; fog em cachos de espiguetas. Forragem. *Panicum brevifolium* L. Gramínea erbácia e vivaz, com fos lancioladas, fls em abundantes panículas. Sp adstrita a futações e boa forragem. *Panicum papporum* Nees. Gramínea erbácia, com fos lineares, acuminadas e invaginantes e fls em espigas de espiguetas. Forragem. Tem ainda o mesmo binômio o Capim favorito.
- MIMOSO DO CEARÁ — *Anthenophora hermaphrodita* Kunt. Gramínea ramosa e erbácia, com fos lineares acuminadas e fls em espigas. Forragem.
- MIMOSO DO PIAUÍ — Capim clandestine.

- MINEIRO — Mate-me embora.
- MOLE — Capim peba.
- CAPIMONGA** — Carapicú e Capim santo (*K. odorata*).
- CAPIM MOURÃO** — *Sporobolus indicum* R. Br. Gramínea erbácia e resistente. Flos filiformes, longas e invaginantes; fls em espigas de espiguetas. Forrageira. Com o mesmo apelido o Capim de egua.
- MURUBÚ, MURUMBÚ — Capim guiné, que fora estimado como var desta sp.
- NAVALHIA — Capim de Angola. Impróprio pois cabe melhor às Tíricicas.
- NAVALHEIRA — *Hypolytrum schraderianum* Nees. Ciperácia sub arbustiva, com longas fós lineares, de bordas cortantes e fls em abundantes panículas eretas. É uma das Tíricicas.
- PALMA — *Panicum petiolatum* Nees. Gramínea erbácia, ereta e xerófita. Fós lanceoladas e estriadas, munidas de bainha; fls em cachos eretos. Forragem.
- PALMEIRA — *Panicum su'catum* Aubl. Gramínea sub arbustiva, vivaz, rizomatosa e ornamental. Fós amplas, longo elípticas, acuminadas e de longa bainha; fls em longas espigas de espiguetas. Bôa forragem.
- PANASCO — *Aristida setifolia* HBK. Gramínea erbácia e prolífica. Fós lineares estriadas e invaginantes; fls em cachos de espiga. Forragem de primeira.
- PAPUA, PAPUAN, PAPUXO, PAPOUA, PEPUXO — *Ichnanthus candicans* Doel. Gramínea erbácia, ramosa e resistente. Fós elípticas e invaginantes, fls em cachos de espiguetas. Prolífica, bôa forragem, apresentando vars.
- PARAGUÁ — Capim de Angola.
- PÉ — *Eragrostis megastachya* Link. Gramínea sub arbustiva, ramosa e xerófita. Fós longo lineares; fls em panículas de espiguetas. Forrageira.
- PEBA — *Andropogon bicornis* L. Gramínea erbácia e prolífica. Fós lineares e acuminadas; fls em espigas de espiguetas. Praga dos terrenos. Tendo as mesmas utilidades do Capim sapé, também é conhecido por este apelido. Dentre suas vars, destaca-se a genuina. Peça mesma grafia — *Andropogon bicornis* Bent e não de L. assina-
- la-se uma sub var de Capim da burro.
- PÉ DE GALINHA — *Eleusine indica* Gaert. Gramínea erbácia, ereta e espontânea. Fós lineares e invaginantes; fls em espigas de espiguetas no extremo de longa raque. Adstringente. Além desta, a mais conhecida por esse apelido, existem outras sps: *Panicum sanguinale* L. Gramínea erbácia, ereta e resistente, apresentando muitas vars. Fós lanceoladas e invaginantes, fls como as da sp precedente, porém de espigas menores. *Panicum crus-galli* L. Gramínea sub arbustiva, ereta e robusta, também com muitas vars. Fós do mesmo tipo das precedentes, porém mais largas; fls em maior número de espigas, que se alternam em toda a raque. *Gymnopogon radians* Paro. Gramínea do mesmo aspecto, vivaz e cespitosa, com abundância de espigas. Ótima forragem.
- PÉ DE MOLEQUE — *Sporobolus tenuissimus*. Gramínea ereta, de colmo delgado, de metro de altura; fós lineares e acuminadas; fls em cachos compostos, no vértice da raque.
- PÉ DE PAPAGAIO — Capim pé de galinha (Indistintamente).
- PÉ DE PERIQUITO — *C. Calandrinia*.
- PEIBA — Capim peba.
- PÉLO DE RATO — Capim de rola.
- PELO DE URSO — Mondo.
- PENACHO — Capim de rola e outras sps, especialmente o Capim dos pampas.
- PERNAMBUCO — Capim de Angola, C. do Pará e C. gigante das baixas, donde a imprecisão do apelido.
- PINTADO — *Pharus scaber* HBK. Gramínea essencialmente ornamental e semi ereta. Fós amplas, flabeliformes e ríjas; fls em cachos eretos e difusos. Sp hidrófila.
- PORORÓ — *Valetta insularis* Chas. Gramínea erbácia e cespitosa. Fós lanceoladas, e pilosas; fls em longas espigas de espiguetas. Excelente forragem. Tem idêntico apelido o Capim Ixa.
- PROVISÓRIO — Capim jaraguá.
- PUBA — Capim pé de galinha e especialmente o C. peba.

- QUISSÉ . *Panicum molinoides* Trin. Gramínea erbácia ou sub arbustiva, viváz e cespitosa. Fos lineares e invaginantes; fls em longo cacheo ereto e denso.
- RABO DE BOI — Capim rabo de burro.
- RABO DE BURRO — *Andropogon condensatus* HBK. Gramínea sub arbustiva, ramosa, apresentando inúmeras varas. Fos lineares e invaginantes; fls em cachos abundantes, de espigas. Forragem de valor discutido.
- RABO DE MUCURA — *Pennisetum setosum* Rich. Gramínea sub arbustiva, erecta, formando touceiras. Longas fos lineares, largas, acuminadas e invaginantes; fls em espigas elegantes.
- RABO DE RAPOSA — *Panicum sphaerocarpus* Salz. Gramínea erbácia, de fos lineares, acuminadas e fls em cachos erectos. *Setaria geniculata* Beau. Gramínea erbácia, viváz, ramosa e rústica. Fos longo lancioladas e invaginantes; fls em longa espiga, densa e estreita, de longa fuste. Sp sujeita a flutuações e forragem de má qualidade. *Setaria scandens* Schrad., do mesmo tipo da sp precedente e algumas outras não existentes na Bahia.
- RABO DE RATO — Capim de egua.
- RASTEIRO — Capim gengibre (*P. falcatum*).
- REDONDO — *Trachypogon polymorphus* Hack. Gramínea erbácia, selvática e pouco exigente. Longas fos coriáciás e lancioladas, com bainhas; fls amarelas, em espigas. Forragem de segunda.
- REI — Bariricé.
- ROSARIO — Lágrimas de Nossa Senhora.
- ROSETA — *Cenchrus echinatus* L., var *tribuloides*, ou *C. tribuloides* L. Gramínea erbácia, viváz e ramosa. Fos lineares, acuminadas e longas; fls em curtas espigas de capítulos pequenos, eriçados de picantes, que aderem aos pés dos animais. Constitue um dos mais genuinos Carrapichos. *Cenchrus viridis* Spreng. Outra Gramínea do mesmo tipo embora mais alta, também xerófita ou arenícola e com picantes análogos. Forragem de segunda.
- ROXO — Capim gordura.
- SÂNDALO — Capim cheiroso (*Vizcainoidea*).
- SANGUINÁRIO — Capim pé de galinha (*P. sanguinale*).
- SANTO — *Kyllinga ouorata* Vahl. Ciperácia do grupo dos Capins, cheirosos — erbácia rizomatosa, robusta. Fos lineares de metro; fls em capítulos. Ras e fos aromáticas tidas por anti espasmódicas e carminativas.
- SAPE — *Imperata brasiliensis* Trin. Gramínea erbácia, rizomatosa, prolífica e invasora. Fos linear-acuminadas, com bainhas e de coloração ferruginea, quando secas; fls em elegantes penachos prateados — paniculas — sobre longa fuste. Forragem quando nova. Embora tida como praga, fornece muitas utilidades domésticas, inclusive a cobertura das choupanas.
- SAPE MACHO — *Imperata contracta* Hitch. Gramínea sub arbustiva, rizomatosa, resistente. É do mesmo feitio do C. capé, com as mesmas propriedades.
- SAPÉ VERDADEIRO — Capim sapé.
- SEDA — Mate-me embora.
- SEMPRE VERDE — *Poa nemoralis* L. Gramínea erbácia, rizomatosa, erecta e resistente. Fos longo lancioladas e invaginantes; fls em abundantes e vistosas paniculas erectas. Excelente forragem, servindo à fenação. Apresenta varas, sendo aliás tida como var do C. Guiné (S. Brito), estimada, por outros, como var *gongyoides* desse mesmo. Com idêntico apelido, Bonدار regista a sp *luxurians* do mesmo Ge *Poa*.
- SERRA — *Mariscus rufus* HBK. Ciperácia erbácia e rizomatosa. Haste triangular, fos coriáciás, lineares e de bordas vulnerantes; fls em umbelas de espigas. Forragem fraca.
- SIRI (CIRI, melhor grafia — Capim limão).
- TAPICURU GRANDE — Capim mi há do brejo.
- TINGA — *Setaria glauca* Beau. Gramínea erbácia, ereta e ramosa, com longifólios lanciolados, fls em espigas compostas. Invasora e forrageira. Tem idêntico apelido o Capim rabo de raposa. Para C. Tor trata-se de var de *Panicum sanguinale*.

— TRAPOERABA — *Panicum gladiatum* Wawr. Gramínea erbácia e ramosa. Flos lancioladas; fls em abundantes cachos de espigas.

— TURPUÇU — Capim mithé do brejo.

— VASSOURA — Capim peba.

— VASSOURA VERDADEIRA — Capim peba e sua var genuina.

— VENEZUELA — *Axonopus scoparius* Hitch. Gramínea sub arbustiva, vivaz e resistente. Flos ate 40 cent.; fls em panículas de espigas. Bóia torram, suportando 4 cortes anuais.

— VETMELHO — Canarana fina e Capim Jaraguá.

— VETIVER — Capim cheiroso (V. zizanoides).

— ZABELÉ — *Raddia portoi*. Gramínea erbácia.

— ZARANZA — *Leptocryphium lanatum* Nees. Gramínea erbácia, vivaz, rizomatosa, formando touças. Flos lineares e invaginantes; fls em panículas de espiguetas, de longa fuste e prateadas. Mais ornamental que forrageira.

CAPIPEBA, CAPUPUBA — Capim peba.

CAPIPOATINGA, CAPIUATINGA

— *Syngonanthus niveus* Rhui Eriocaulácia erbácia e inculta, com flos lineares e verticiladas, fls em pequenos capítulos, de longa raque, muito decorativos.

CAPIRUCU — Bacupari do campo.

CAPITÃO — Erva capitão.

— DE SALA — Caga olho.

— DO CAMPO — Cambará (Indistintamente) e Purga de caboclo.

— DO MATO — Purga de caboclo.

CAPITICOBA — Capiçoba (*E. bonariensis*).

CAPITINGA — Capim tinga.

CAPITIÚ — *Siparuna guyanensis*

Aubl. Monimiácia arboreta e aromática. Flos oblongas, com células oleiferas; fls em cimeiras; fr drupa armada de picantes. Tem esse apelido o Cardamomo (*R. occidentalis*).

CAPITUVA — *Rhynchospora aurea* Vahl. Ciperácia sub arbustiva e hidrófila. Cau triangular; flos longo lineares e serrilhadas; fls em espigas, formando cachos umbeliformes. Serve para esteiras e utilidades domésticas.

CAPIUVA — Pau pombo.

CAPIVARA — *Aristolochia bilobata* Dic. Aristoloquiácia do mesmo tí-

po do Mithomens. Suas grandes corolas, recurvas, emitem cheiro desagradável. Sp considerada anti ofídica.

CAPIXAVA — *Sebastiania brasiliensis* Muel. Euforbiácia arbustiva e polimórfia, apresentando inúmeras vars. Flos lancioladas, fls em pequenas espigas e fr capsular.

CAPIXINGUI, CAPIXINGUIT — Capichinguit.

CAPOC — Sumauma. Precisamente a planta que a sp produz.

CAPOEIRA BRANCA — Braço da preguiça e Caçara (Impreção).

CAPOROROCA — *Myrsina brasiliensis* DC. Mircinácia arboreta, de flos elípticas e coriáceas, fls albas e axilares e fr drupácia. Madeira alva de segunda. Tem o mesmo nome a *Myrsine flocculosa* M. e a Azeitona do mato.

— ACU — Azeitona do mato.

— BRANCA — Capororoca e a Rapanea parvifolia Mez. Arbusto da mesma fa, quasi com os mesmos caracteres e também conhecida por *Myrsine bahiensis* Casar.

— COMUM — Rapanea guyanensis Aubl. Mircinácia alta, frondosa e tanifera; flos coriáceas e oblongas; fls monóicas, albas e axilares; fr drupa. Madeira de lei. Dentre suas vars se encontra a sub-acuta "peculiar à Bahia", segundo P. Cor.

— DA FOLHA LARGA — Capororoca.

— PICANTE — Casca de anta.

— VERMELHA — Azeitona do mato.

CAPOROROQUINHA — Azeitona do mato.

CAPOTIRAGUA — *Iresine portulacoides* SH. Amarantácia erbácia e estofoosa. Cau encarnado, fôrrentes e ovalares, fls a.bas, em capítulos. Arenícola e litorânea.

CAPUATINGA — Capipoatinga.

CAPUCHINHA, CAPUCHINHO, CAPI-

PUCINA — Chagas e, com muito menos propriedade, a Macairea se-ricea Cogn. Melastomácia arbustiva, com flos tormentosas e oblongas e fls rosas, em cachos.

— GRANDE — Chagas.

CAPUEIRA BRANCA — Braço de preguiça.

CAPUPUNA — Capim peba.

CAPUTUNA, CAPUTUVA — Laranjeira do mato.

CAQUEIRA, CAQUERA — Canudo de pito (*C. bicapsulares*).

— FEMEA — São João.

CAQUI — *Diospyros kaki* L. Ebenácia arbórea, com frs descolor e elíptica e frs bacáceos, carnosos, luzidios, amarelo avermelhados, do volume da Maçã e mui apreciado. Pouco cultivado na Bahia, onde aliás desenvolve-se muito bem.

CAQUIBOSA — Guaxima (*U. lobata*).

CARÁ — Designação vulgar de muitas Dioscoríacias, Ge *Dioscorea* e algumas Aráctias. As sps da primeira destas Fas são na Bahia mais conhecidas por Inhames. Vid Inhame. São Vés que se recomendam pelo excelente sabor e propriedades de suas volumosas tuberas, no tocante ao valor alimentício.

BARBADO — *Dioscorea dodecaneura* V. Dioscoríacia sarmentosa, com frs cordiformes, fls em longas espiras axilares e fr. capsular. Tuberas saborosas, elipsóides e ricas em amiláceos.

CARACÁ — Vid Crissiuma.

CARACALA — Caracol.

CARACHICHÚ — Pimenta de galinha.

CARACOL, CARACOLEIRO — *Phaseolus carcalla* L. Leguminosa viváz e ornamental. Trifólios; fls de corola espiralada, grande e aromática. Geralmente inculta.

CARÁ DA COSTA — Inhame da Costa.

DA TERRA — *Dioscorea polygonoides* H. e Plomp. Dioscoríacia volvél, com frs ovalares e acuminadas, fls unisexuadas e fr cápsula. Tuberas comíveis.

DE ANGOLA — Inhame de Angola.

DE CABOCLO — *Bomarea salicifolia* Roem. Amarilidácia sarmentosa, de frs lancioladas, fls amarelas em umbela e fr capsular. Ra tuberosa, que passa por diurética.

DE FOLHA COLORIDA — Caratinga (*D. piperifolia*).

DE ESPINHO — Inhame sapateiro.

DE PELE BRANCA — Caratinga (*D. piperifolia*).

DO AR — Inhame de Angola.

GIGANTE — Inhame japonês.

CARAGOATA, CARAGUATÁ — Denominação de inúmeras sps de Bromeliáceas dos Géns *Caraguata*, *Aechmea*, *Bilbergia*, *Dyckia*, *Nidularium*, *Tillandsia*, dentre outros. São geralmente epífitos, de pequeno porte e de grande valor ornamental. A Pitcaira, a Babosa e, bem

assim, os Caroás e Gravatás têm o mesmo apelido.

CARAIBA — *Cordia calocephala* Cham. Borriginácia arbórea, com frs ovalares, denteadas e alternas, fls campanuladas, albas, em capítulos e fr drupáceo. Lenho para carpintaria. Tem o mesmo apelido, o Ipé, indistintamente, e o Pau parraiba.

CARAIPÉ VERDADEIRO — *Licania sclerophylla* M. Rosácea de grande porte, de frs coriáceas, ovalares e acuminadas, fls pequenas, em longos cachos compostos. Fr drupa com sementes oleosas. Essa sp é também nomeada Oiticica. *Licania utilis* Frits. Sp da mesma Fa e porte da precedente, quasi com os mesmos caracteres. Lenho duro, prestante à carpintaria e marcenaria.

CARAJÁ — Vid Crissiuma.

CARAJURÚ — *Arrabidaea chica* Verlot. Bignoniácia sarmentosa, ornamental, com muitas sub sps e varas. Trifólio de elementos ovalares e acuminados, fornecendo matéria corante encarnada; fls em belas paniculas; fr capsular. Melifera e adstringente.

CARÁ LISO — Caratinga.

CARAMBOLA, CARAMBOLEIRA — *Averrhoa carambola* L. Oxalácia arbórea, ramosa e ornamental pela abundância de fls e de frs. Fos compostas pinadas; fls caulinares multicegos, em pequenos cachos; fr baga amarela, acre doce, aquosa, com costelas mui salientes. Anti-fébril e refrigerante.

AMARELA — Biribiri (Impróprio, porque a Carambola, sp congênere, tem frs da mesma cor).

CARAMEMO — Cabaça.

CARA MOELA — Inhame sapateiro.

CARAMURÚ — Catuaba (Sem distinção de sp).

CARANA — Carandá.

CARANAIBA — Carnauba.

CARANATA — Gravatá (Indistintamente).

CARANDA — *Copernicia australis* Boc. Palmácia de média altura, hidrófila e em aglomerados. Fos flabeliformes, de longo pecíolo; fls espataladas; fr drupa. Cerifa como a Carnaúbeira, sp com a qual tem muita semelhança. A Carnaubá tem o mesmo apelido.

UBA — Carandá.

GUACÚ — Buriti.

CARANDAI — Buriti palmito, Carandá e Carnauba. (Mais ajustada à segunda sp.).

CARANDA MURITI — Carandá e Buriti palmito.

—**PIRANGA** — Buriti palmito.

CARANDATAI — Carnauba.

CARANGUEJO — Ananás pejado.

CARANHA — Caroá (Qualquer sp.).

CARAOATA — Caroá e Gravatá.

CARAPA — Andiroba.

CARAPA — Andiroba e Contra erva (Mais cabível à primeira sp.).

CARAPIÁ — Contra erva e Malva do campo.

—**AÇU** — Contra erva.

—**VERDADEIRO** — Contra erva.

CARAPICÚ — Urena sinuata L. Malvácia sub arbustiva, pilosa e muito encontradiça. Fos lobadas; fls róseas, solitárias e vistosas; fr capsular, aderente como os Carrapichos. Fornece fibras têxteis; peitoral e emoliente.

CARAPINHA — Andiroba.

CARAPITÁIA — *Amaryllis candida* Lind. Amarílidácia erbácia, de bolbo comível. Fos longas e canaliculadas superiormente; fls solitárias e albas; fr capsular. Ornamental.

CARAPOMONGA — Carapicú.

CARA SEM BARBA — Caratinga.

CARATINGA — *Dioscorea glandulosa* Koit. Dioscoreácia tuberosa e ornamental. Cordifólios; fls unisexuadas e solitárias; fr capsular. *Dioscorea pterifolia* H. e Bomp. Sp congênere da primícias, também tuberosa, com latifólios acumulados, fls em pequenos grupos e solitárias.

—**BRAVA** — *Dioscorea laxiflora* M. Diocoriácia sarmentosa e tuberosa, com fos sagitadas; fls em espigas e fr capsular. *Dioscorea sinuata* V. Sarmentosa da mesma Fa. e também tuberosa. Fos sagitadas e cordiformes; fls assexuadas, em panículas de espigas as masculinas, em longas espigas as femininas; fr capsular.

—**DO MATO** — Caratinga brava (D. laxiflora).

CARAUÁ — Caroá e Gravatá (Indistintamente).

CARAUATÁ — Caroá e Gravatá (Indistintamente).

CARAUABA — Pau paraíba e especialmente a Caroba.

CARAUBEIRA — Caroba e Carobeira.

CARAVATÁ — Gravatá (Indistintamente).

CARCUNDA DE JACARÉ — Jacaré.

CARDAMOMO — *Renealmia brasiliensis* Schum. Zingiberácia sub arbustiva, em touceiras e ornamental. Fos amplas e longo elípticas, invaginantes; fls em rácimos piramidais, alvas e róseas, de brilho porcelânico e perfumosas; fr cápsula. Rizoma aromático, tônico e carminativo. *Renealmia occidentalis* Sweet. Sp da mesma Fa, menor, cespitosa, ornamental, aromática e rizomatosa, muito parecida com a sp precedente.

—**DA TERRA** — Cardamomo. Apelido justificável, pois diferencia este do verdadeiro, o *Elettaria cardamomum*.

—**DO BRASIL** — Cardamomo (*R. brasiliensis*).

—**DO BREJO** — Lírio do brejo.

—**DO MATO** — Lírio do brejo.

—**DOS RIOS** — Agrião.

—**EM CACHOS** — Cardamomo (Do Ge *Renealmia*).

CARDEAL — Papagaio e especialmente o Pingo de lacre.

—**DO BRASIL** — Pingo de lacre.

CARDEIRO — Espinhento. Impreciso, por ajustar-se aos Cardos, indistintamente.

CARDO — Designação de algumas Compostas, Papaveráceas e mormente várias Cactáceas. Guardam apenas entre si a presença de acúleos, espinhos ou picantes.

—**AMARELO** — Cardo santo (Devido à coloração das fls).

—**ANANA** ou **ANANAZ** — *Cereus triangularis* Haw. ou *C. variabilis* Pfeif. Cactácia sub arbustiva de ramos pendentes e triangulares — 3 raramente 4 arestas, separadas por goteiras ou sulcos. Fls albas; baga comível. Sp inerme, tida como cicatrizante e vermífuga.

—**DA PRAIA** — Cardo ananá, Mandacaru e outras Cactáceas.

—**DE SANTA HELENA** — Juiz de paz.

—**MARIANO** — Cardo santo.

—**MELÃO** — As sps conhecidas por Cabeça de frade e Cacto meião, bem como, da mesma Fa, o *Melocactus goniodeschatus* Lem, globoide, pluricostada e armada. Fls encarnadas e baga.

—**MORTO** — *Senecio vulgaris* L. Composta erbácia e ramosa. Fos fendidas e estipuladas; fls em ca-

pítulos. As fós passam por emolientes e vermífugas.

—PALMATÓRIA — Palmatória.

—PENDURADO — Cactáceas do Ge. Knippsalis — pouco encontradiças na Bahia — São epífitos, geralmente de cau cilíndrico e articulado e pendente. Serve de exemplo — *R. macrocaantha* Miq. e a sp denominada Chitas.

—SANTO — *Argemone mexicana* L. Papaverácia erbácia, ereta e inculta. Fós pinatifendidas e de bordas espinescosas; fls amarelas-decorativas; fr cápsula alongada e espinhosa. O óleo, das pequenas sementes, é emético, purgativo, hipnótico e tóxico.

—SANTO DA AMÉRICA — Cardo santo.

—VINAGRE — Cardo ananá.

CARIJÓ — Potumujú e Purga de cabclo.

CARIOTA — Palmeira africana.

CARIPARI — *Acacia* sp. Leguminosa.

CARIPÉ — Caraipé verdadeiro (*L. utilis*).

—VERDADEIRO — Caraipé verdadeiro (*L. utilis*).

CARIÚ — Bredo.

CARIURA — São João.

CARLUDEVICIA BRASILEIRA — *Carludevicia chelidonura* Brud. Ci-

clantácia erbácia, com bifólios elípticos e invaginantes, fls unisexuadas e fls agregados.

CARNAIBA — Carnauba.

CARNAUBA, CARNAUBEIRA — *Copernicia cerifera* M. Palmácia alta, elegante, longeva, xerófita, com utilidades que se contam por muitas dezenas. Fós filabeliformes, de longo pecíolo, de cujo limbo se retira a preciosa "cera de Carnauba"; fls em enormes espádices; frs drupas ovoides. Sp nordestina, formando os extensos Carnaubais.

CARNAUVA — Carnauba.

CARNE DE ANTA — *Maytenus obisifolia* M. Celastrácia alta, com fós ovalares e coriáceas, fls em cachos de cachos pequenos e fr capsular. Lenho de primeira para marcenaria. As fós substituem o "Chá da Índia" e o Mate. Tem o mesmo apelido, a Casca de anta.

—DE VACA — *Rouapala elegans* Schot. Proteácia altissima, de lenho encarnado, lembrando a carne de gado. Penífolio e fls axilares. Madeira

de lei. O Pau concha, sp assim, tem o mesmo apelido.

CARNIÇA — *Caesalpinia beduncella* Roxb. Leguminosa semi escandente, robusta e armada de acúculos. Grandes fós compostas do 2º grau; fr vagem com o feitio de folículo e ericada de papilas espiniformes; sementes esferoides, empregadas contra asma. Sp litorânia.

CARNICULA — Carniça.

CAROA — *Neoglaziovia variegata* Mez. Bromeliácia acaule, robusta, pouco exigente e xerófita. Fós radicantes, de 2 metros, lancioladas e ríjas, fornecendo longas e excepcionais fibras têxteis; fls em espigas erectas e fr baga pequena.

—VERDADEIRO — Caroá.

CAROATA — Caroá.

CAROBÁ — Designação de algumas sps de Bignoniacias, particularmente do Ge Jacaranda. Encerram, em seu córtex, princípios amargos e adstringentes, sendo tida como anti-sífilíticas. Sem outro qualificativo merecem tidas as sps: Jacaranda brasiliana Pers. Arborata de fós compostas pinadas, fls azuis violáceas, em cachos e frs capsulares. Ornamental; J. nitida DC. Arbuseto de fós compostas imparipinuladas, fls em cachos abundantes, purpúreas e fr capsular chato.

—DA FLOR VERDE OU DA FOLHA VERDE — *Cybistax antisphyllica* M. Bignoniacia altissima. Pentafólios lanciolados, no ápice de longo pecíolo; fls esverdeadas, de longa corola tubular, em panículas difusas; fr — grande siliqua pluricostada. Lenho para marcenaria, fós com matéria corante, córtex depurativo.

—DE GOIÁZ — *Sparattosperma ellipticum* B e Chum. Bignoniacia arbustiva. Pentafólios digitados; fls alvas, em panículas, e fr capsular.

—DE MATO GROSSO — *Phryganocydia corymbosa* Bur. Bignoniacia arbustiva, gavinossa e decorativa. Fós elípticas, acumuladas; fls longo campanuladas, de cálice espatulado e em umbelas; fr cápsula chatá.

—DO CAMPO — Jacaranda paniculifolia M. Bignoniacia geralmente arbustiva e tanígera. Fós compostas imparipinuladas; fls infundibulares, roxas, em belos cachos; fr capsular. Bem depurativo. A Ca-

roba de flor verde tem o mesmo qualificativo.

— DO MATO — Tingui (*P. acuminata*).

— GUACU — Jacaranda *mimosaeifolia* Don. Bignoniácia arbórea e muito ornamental, tanto pela folhagem como pelas fls. Fos compostas pinadas do 2º grau; fls campanuladas recurvadas, roxas, em panículas abundantes e eretas; fr cápsula; lenho fraco.

— PRETA — Jacaranda *obovata* Cham. Bignoniácia arbustiva, com fos compostas, pinadas do 2º grau e folios oblongos; fls em cachos, longo infundibulares; cápsula.

— VERMELHA DE CIPÓ — Tecomária.

CAROBEIRA — *Tecoma caralba* M. Bignoniácia arboreta e decorativa, embora silvestre. Fos compostas pa'madas; fls aromáticas, amarelas, tubulosas, em cachos; fr cápsula longa e lanciolada. Lenho para carpintaria.

CAROBINHA — Designação de algumas Bignoniáceas dos gêns Jacaranda e Memória, geralmente sps arbustivas e com as virtudes da Caroba. *Memória pubescens* Schum. Arbusto piloso de fls. imparipinuladas, fls amarelas em cachos e longo fr capsular. No mesmo caso a Carobinha do carrasco.

— DO CARRASCO — Jacaranda caroba DC. Árvore alta, ornamental e de rápido desenvolvimento. Fos compostas pinadas do 2º grau, folios coriáceos; fls violáceas, longo campanuladas, em panículas; fr canela enipáido. Cortejo depurativo, adstringente e diurético.

— VFRDE — Caroba da flor verde.

CARORUCU — Vid Carobinha (Indistintamente).

CAROLIA — Amarelinha.

CAROLINA MIUDA — Jequiritsa.

CAROMILHO — Maiteno.

CAROTA — Chuchú.

CAROVA — Caroba (Indistintamente).

CARPIA — Lágrimas de N. Senhora.

CARPRIMEIRA — *Ambrosia ameri-*
icana.

CARPÚNIA — Alfavaca de cobra (*P. carpuna*).

CARQUEJA — Denominação geralmente dada a certas sps de Compostas, do gên. *Baccaris*. Além da presença de capítulos, comumente sessais, apresentam expansões aladas, longitudinais, e de número variável, em suas rama. São arbó-

rios, semi sarmentosos e, às vezes, sub arbustos, com fos rudimentares quando não existentes. *Baccaris genistelloides* Pers. Sub arbusto ramoso, com expansões alares e segmentadas. Sp áfila, com capítulos terminais e caulinares e fr aquênio. Amargo-tônica, vermisfuga, aromática e cicifera. Dentre as muitas vars, destaca-se a trimera, B. *Lundil* DC. Arbustiva com fos ovalares e pecioladas, fls em cachos de capítulos. Ainda com o mesmo nome, Luetzelburg assinala, na Bahia, as sps *B. rotundifolia* Spreng, *B. tenuifolia* DC e C. Tor., e a descrita como Alecrim do mato bem como as Litrárias *Ge Cuphea*, *C. ericoides* e *C. loricoides*.

— AMARGA ou AMARGOSA — Carqueja (*B. genistelloides*).

— DO BREJO — Carqueja do pantano.

— DO MATO — Carqueja (*B. genistelloides*).

— DO PANTANO — *Hydrolea spinosa* L. Hidrofilácia arbustiva, pilosa e armada de espinhos. Fos longo elípticas e glutinosa; fls. campanuladas, aromáticas, em cimas.

— DOCE — *Baccaris articulata* Pers. Composta de cau articulado, com duas expansões alares, xerofita e resistente. Fos mínimas ou nulas; fls em capítulos terminais ou caulinares. Amargo tônica, eupéptica, febrisfuga e diurética.

— ORDINARIA — Carqueja doce.

CARQUEJINHA — Carqueja doce.

CARRACHO — Carrapicho beijo de boi.

CARRANCUDA — *Poeckianthe grandiflora* Bth. Talvez a mesma sp que M. cita em seu livro "Através da Bahia" com a designação de Carranguda — *Caesalpinia acinaciformis* M., aliás não registada em sua grande obra. Leguminosa pilosa, com fos compostas imparipinuladas e acuminadas, com fls em pequenos cachos, albas, com manchas violetas.

CARRANCUDO — Itapicuri preto.

CARRAPATEIRA — Mamona.

CARRAPATO — Mamona.

CARRAPETA, CARRAPETA VERDADEIRA, CARREPETEIRA — Bilreiro.

CARRAPICHINHO — Carrapicho beijo de boi, C. da calçada e Carapicú. Impreciso, pois ajusta-se ainda a muitas outras sps.

CARRAPICHO, CARAPICHO — Denominação de inúmeras ssp's de Fas diferentes, em virtude de seus frs, eriçados de pêlos viscosos, cerdas ou picantes, aderirem, facilmente, à indumentária humana ou aos pêlos dos animais. Alguns são até vulnerantes ou pungentes, pertencentes a Vespervácios ou sub arbustos. Dentro as muitas Leguminosas em tais condições e somente com tal apelido, servem de exemplo — *Aeschynomene falcata* DC. Erbácia decumbente, de fos pinadas, fls amarelas, com vagens longas. Forrageira da qual são conhecidas algumas sub ssp's: *A. hispidula* HBK, sub arbusto de fos pinadas, fls papilionárias e vagens articuladas; *A. viscidula* Mich., muito afim da sp precedente; *Melioria affinis* Kunt, sp rasteira, pilosa, com trifólios, fls em cachos e vagens articuladas; *M. mollis* Vahl, sub arbusto piloso, com trifólios, fls azuladas em cachos e frs articulados; as ssp's conhecidas por Amores de vaqueiro, a *M. subsecunda* Vog. As ssp's de *Ge Desmodium* estão no mesmo caso. Nesse registo, a Fa das Gramíneas fornec farto material, com outros sobrenomes: Carrapicho da praia dentre outros. Ainda outras Fas — Malváceas, Tiliáceas e Verbáncias — possuem ssp's dignas desse apelido, embora conhecidas por outros nomes vulgares, Mai Izabel, Urinária, etc.

BARBADINHO — Barbadinho.

BEIÇO DE BOI — *Desmodium adscendens* DC. Leguminosa sub arbustiva, ramosa, pubescente, com os ramos decumbentes. Trifólios, fls rosas ou arroxiadas, em longas espigas terminais, fr vagem articulada, glutinosa. Bôa forragem, até para fenação.

BRAVO — Carrapicho de carneiro (O apelido cabe a todos os Carrapichos, donde sua imprecisão).

CABEÇA CHATA — Juiz de paz.

DA CALÇADA — *Triumfetta romboidea* Jacq. Tiliácia sub arbustiva, pilosa e viváz. Fos lobadas ovárias, sendo as inferiores mais largas; fls axilares, em cachos, amarelas; fls espinescetes e capsulares. Sp adstringente e textil. T. *semitrilobata* Jacq. Arbusto de fos polimorfas e lobadas, fls amarelas, em cachos, e fr cápsula espinhosa. As duas ssp's, além de fibras têxteis, pos-

uem celulose, para fabrico de papel.

DA PRAIA — *Acicarpha spathulata* R Br. Calicéracia rasteira e erbácia, com fos lancioladas, fls em capítulos, albas e fr aquênio, munido de espinhos pungentes. O Capim rosêta tem o mesmo apelido.

DAS ROÇAS — Capim rosêta.

DE AGULHA — *Bidens bipinnatus* L. Composta sub arbustiva, ereta, com fos pinatífidas, fls em bulbos e pequenos capítulos, reunidos em cachos, e fr aquênio, longo, terminado em picantes, que se fixam nas vestes humanas.

DE CARNEIRO — *Xanthium strumarium* L. ou *X. basilicum* Bak. Composta sub arbustiva. Fos ovalares ou cordiformes; fls esverdeadas em capítulos; fr capsular com picantes. Sp amarga, adstringente e emoliente. O Capim rosêta tem o mesmo apelido.

DE CAVALO — *Remirea maritima* Aubl. Ciperácia erbácia, rizomatosa e rasteira. Fos lineares e verticilladas; fls em capítulos de espiguetas. Rizoma aromático, diurético e sudorífico.

DE DUAS PONTAS — Carrapicho de agulha.

DE LAVADEIRA — Guaxima.

DE LINHO — Carrapicho da calça-da (*T. semitrilobata*).

DE OVELHA — Carrapicho beiço de boi.

DE SANTA HELENA — Juiz de paz e Carrapicho de carneiro.

DO CEARÁ — Ratâinha (*Ratânia*).

DO GRANDE — Carrapicho de carneiro.

GRANDE - *Arctium minus* Schran. Composta sub arbustiva e ruderal. Fos amplas e ovalares; fls roxas, em capítulos aderentes. Substitue a Bardana; o córtex dá fibras têxteis.

RASTEIRO — *Acanthospermum hispidum* DC. Composta do mesmo tipo do Juiz de paz, sp congênere, com espinhos nos frs e muito mais pungentes. E' sp aromática, amargo-tônica e diaforética. O Juiz de paz tem o mesmo apelido.

REDONDO — Guaxima.

CARRASCO — *Cambessedesia umbellata*. Melastomácia arbustiva e xerófita. Cau piloso; fos discojores, esbranquiçada na pagina dorsal e pilosa; fls alvas, em cachos umbeliformes; fr capsular.

CARRASQUINHA — *Malpighia coccinea* L. Malpigiúcia arbustiva, muito ramosa e ornamental. Fos pequenissimas, vernicosas, com angulos espinescetes; fls róseas, axilares; fr drupa encarnada. Lembra o Buxo.

CARRUIRA — São João.

CARTUCHEIRA — Trombeta (Indistintamente).

CARUÁ — Caroá (Indistintamente).

CARUBA — Cipó imbé.

CARUIBA — São João.

CARURU — Designação de várias espécies de Amarantáceas e, em piano secundário, de outras Fas. O vocábulo, na Bahia, significa certo alimento apimentado, de Quiabos ou Bredo, com azeite de Dendê. Não obstante tal afirmativa, existe nesse Estado spa que em outros lugares são conhecidas por Carurú: *Amaranthus deflexus* L. Amarantácia prostrada, erbácia e invasora. Fos lancioladas; fls em espigas recurvas. *A. retroflexus* L. Erbácia resistente e invasor. Cau anguloso; fos ovalares, de longo pecíolo; fls em cachos de espigas. Fos comíveis. *A. tristis*. Sub arbusto anguloso e ramificado. Fos glaucas, ovalares e longo pecioladas; fls em espigas, formando panículas difusas. Fos comíveis em caruru.

—**ACU** — Carurú bravo e Tintureira.

—**AMARGOSO** — *Erechtites hieracifolia*. Composta sub arbustiva e hidrófila. Fos lancioladas e fendas; fls albas, em capítulos corimbosos. *E. valerianaeifolia* DC. Fos longas e pinatífidas; fls róseas, em capítulos de cachos terminais e axilares; fr aquênio. Fos comíveis.

—**AZEDO** — Rosela.

—**BRAVO** — *Phytolacca thyrsiflora* Fenz. Fitolacácia sub arbustiva e ruderal. Fos largo ovalares e acuminadas; fls em longos e estreitos cachos; fr baga encarnada — matéria corante. Resolutivo e catártico.

—**DA BAHIA** — *Cochrorus aestuans* L. Tiúcia erbácia, de fos pilosas e ovalares, fls insuladas e fr capsular. Mais propriamente merecem tal apelido o Bredo e o Caruru do espiga.

—**DA GUINÉ** — Rosela.

—**DA MATA** — Crista de galo (*A. gangeticus*).

—**DE CACHO** — Tintureira (*P. edentata*).

—**DE ESPIGA** — Bredo grande.

—**DE PORCO** — Beldroga, Bredo e Carurú bravo, donde a imprecisão do apelido.

—**DE SAPO** — *Oxalis martiana* Zuc. Oxalácia, de cau bolioso, com trifolios longo peciolados e obcordiformes; fls róscas, em umbela, no ápice de longa fuste; fr capsular. Bolbos comíveis e procurados pelos animais.

—**DE SOLDADO** — Bredo (*A. virides*).

—**DE VEADO** — *Tournefortia elegans* Cham. Borruginácia arbustiva, com fos inteiras e longo elípticas; fls em cachos terminais e fr drupáceo. Sp mucilaginosa. Anti febril e contra a angina.

—**DO MATO** — Crista de gallo (*A. gangeticus*).

—**GRANDE** — Carurú de espiga.

—**GUACU** — Carurú bravo e Tintureira.

—**MI** — Velame (*C. campestris*).

—**MIRIM** — Bredo.

—**MIUDO** — Bredo.

—**SELVAGEM** — Carurú bravo.

—**VERDADEIRO** — Bredo (*A. blitum*).

—**VERDE** — Bredo (*A. virides*).

—**VERMELHO** — Veludo vermelho.

CARVALHINHO DO MAR — *Fucus vesiculosus* L. Fucácia erbácia, em contradição nas praias. Talo ramificado e membranoso, com vesículas pneumáticas, que lhe servem de flutuadores. Adubo. Fornece todo.

CARVALHO CATUCAEM — Carne de vaca e Pau concha.

—**DO BRASIL** — Pau concha.

—**DO PARANA** — Pau concha.

—**NACIONAL** — Pau concha.

CARVÃO DE FERREIRO — *Sclerolobium paniculatum* Vog. Leguminosa arbórea e inculta. Imparipinnulos; fls aromáticas, amarelas, em abundantes cachos de cachos. Bom combustível.

—**VERMELHO** — *Diptychandra epunctata* Tul. Leguminosa arboreta. Tetrafólios acuminados; fls amarelas, em cachos abundantes e eretos; vagem com duas sementes. Madeira para carvão ou cercados.

CARVOEIRA, CARVOEIRO — Carnão de ferreiro.

CASADINHA — *Eupatorium squalidum* DC. Composta arbustiva ramosa e inculta. Fos lancioladas, finamente serrilhadas; fls em longos

capítulos, em cachos umbeliformes, eretos e terminais. Emoliente.

CASADINHOS — Dois amigos.

CASCA ANTI-DIABÉTICA — Caju.

—**BRANCA** — Chá de bugre.

—**COTO** — Chá de bugre.

—**DA MOCIDADE** — Barbatimão.

—**DA VIRGINDADE** — Barbatimão.

—**DE ANTA** — *Drimys winteri* Forst.

Magnoliácia arboreta e elegante. Látilírios coriáceos; fls albas, em vistosas umbéreas; fr — baga vermelho escura. Dá a "casca de Winter", também chamada "melambo" e "capororoca". Eupéptica e antiescorbútica. Lenho para calxotaria. Ha outras sps, com o mesmo nome vulgar.

—**DE ANTA BRAVA** — *Rauwolfia bahiensis* DC. Apocinácia arbustiva de cau triotómico; fos coriáceas e verticilladas; fls em cimeiras; fr carpídio.

—**DE ANTA VERMELHA** — Casca de anta.

—**DE COTIA** — Erva moura do sertão.

—**DO BRASIL** — Buranhem.

—**DOCE** — Buranhem.

—**DO MARANHAO** — Casca preciosa.

—**PARA TUDO** — *Simaba cuneata* S.H. Simarubácia arboreta, com imparipinóculos, fls verdes, em cachos, e fr drupáceo. Tem igual apelido, a Erva moura do sertão.

—**PRECIOSA** — *Aniba canelilla* Mez. Laurácia de grande porte e envergadura, muito aromática. Fos lancioladas, fls em cachos, amarelas e tomentosas; fr baga. Todo o Vé é aromático, mormente seu córtex. Tônico, eupéptico e peitoral.

CASCARIA — *Casearia grandiflora* Chamb. Flacourtiácia arboreta, com fos inteiras, acuminadas e estipuladas; fls em capítulos e fr capsular.

CASCARILHA FALSA — Quina do Brasil.

CASCAVEL, CASCAVELEIRA — *Crotalaria retusa* L. Euforbiácia arbustiva, dos sertões. Fos lancioladas; fls amarellas, em longas espigas; fr — vagem cilíndrica cujas sementes chocáham dentro do pericarpo. Ha sps congêneres com o mesmo apelido.

CASINGA — Cipó cruz (*C. brachiatia*).

CASSAIU — Milhomens (*A. brasiliensis*, *A. Cympifera* e outras sps congêneres).

CASSATINGA — *Craton phlomoides* Pers. Euforbiácia arbustiva e selvática dos sertões. Fos longo elípticas, acuminadas e tomentosa na face dorsal; fls em cachos; fr capsular. Outras sps da mesma e até de Fas diferentes, de igual modo, são conhecidas.

CASSAÚ — Vid cassaiú.

CASSAVA — Mandioca.

CASSIA AMARELA — Chuva de ouro (*C. fistula*).

—**ARGENTINA** — *Tipuana speciosa* Bent. Leguminosa alta, esgalhada e ornamental para ruas e parques. Fos paripinuladas; fls amarelas e fr — vagens.

—**DO LEVANTE** — Esponjaira.

—**IMPERIAL** — Chuva de ouro (*C. fistula*).

—**MANSA** — Fedegoso.

—**MIUDA** — Fedegoso.

—**PAULISTA** — *Cassia siamea* Lam. Leguminosa arbórea, com grandes fos compostas pinadas, fls em grandes cachos piramidales e amarelas; vagens longas, estreitas e retorcidas quando secas. Ornamento recentemente introduzido na Bahia.

CASTANHA, CASTANHEIRO DA ÁFRICA — *Bilchia sapida* Koenig. Sapindácia arbórea e ornamental. Fos pinadas; fls aromáticas, em cachos axilares; fr capsular, encarnado, comível quando bem maduro. Lenho branco, para carpintaria. O Chichá tem igual apelido.

—**COMADRE DE AZEITE** — Caiaté.

—**DA COSTA DA ESPANHA** — Mamorana.

—**DAS GOIANAS** — Mamorana.

—**DE ANTA** — Abricô de macaco.

—**DE ARARA** — Andá-açu.

—**DE BUGRE** — Fruto amargo.

—**DE CAIATÉ** — Caiaté.

—**DE COTIA** — Caiaté e Sapucainha.

—**DE JATOBÁ** — Fruto amargoso.

—**DE MACACO** — Abricô de macaco e Cúia de macaco.

—**DE PEIXE** — Caiaté.

—**DO BRASIL** — Castanha do Pará.

—**DO BREJO** — Caperonia castaneifolia SH. Euforbiácia sub arbustiva e hidrófila. Fos lancioladas e serrilhadas; fls em espigas de longa fuste; fr capsular.

—**DO CEARÁ** — Mamorana e Barriguda (*C. arborea*).

—**DO MARANHÃO** — Castanha do Pará e Mamorana.

—**DO PARA** — *Burholletia excisa* HBK. Lecitidácia alta, frondosa e

elegante. Fos longo ovalares e discolores; fls albas, em rácimos terminais; fr pixídio, lenhoso, encerrando as reputadas "Castanhas do Pará". Com o mesmo nome, porém impropriamente, identifica-se, na Bahia, uma Bombácia, empregada como nativo (em cercas) — *Bombax affinis*. É do mesmo tipo da Mamorana, sendo de porte menor, frs menores, porém lisos e verdes.

— MINEIRA — Fruto amargoso.

— PURGATIVA — Crináte.

— SAPUCAIA — Sapucáia (Indistintamente).

— VERDADEIRA — Castanha do Pará.

CASTANHOLA — Amendoeira da Índia.

CASTICAL — *Eriartea excorrhiza* M. Palmácia alta e ornamental. Suas ras laterais, oriundas da porção inferior do cau, dão ao Ve o aspecto de castical. Fos longo pinadas; fls em espádices; fr drupa ovóide. Lenho negro e resistente.

— DO INFERNO — Graxa (singela).

CASTOR — Mamorana.

CASUARINA — *Casuarina equisetifolia* L. Casuarinácia, robusta, alta, ramosa, muito ornamental. As fos são substituídas por finos e verdes ramúsculos, filiformes e verticillados; fls unissexuadas; fr sâmara; lenho duro e compacto. Sp tanígera e tintorial.

— CAVALINHO — Casuarina.

CATAGÉ — Cabeça.

CATAGUA — Laranjeira do mato.

CATAIA — Casca de anta. Imprecesso pois também aplica-se à Capivara.

CATAIQUAÇU — Jaborandi (*P. pennatifolia*).

CATANDUBA, CATANDUVA — *Pithecellobium moniliforme* Bth. Leguminosa arbórea, com fos bipinadas. fls amarelas, em espigas, e fr vagem longa e p'ana. Tanígera e madeira de lei.

CATARINÁRIA — Fumo.

CATARRO — Grão de galo.

CATÃO — Cardo morto.

CATICOBA — Capicoba (*E. bonariense*).

CATINGA DE BARRAO — Maria preta e especialmente o Menstrato.

— DE RODE — Menstrato.

— DE CHEIRO — Anêmona do mato.

— DE CREOUZA — Catinga de mulata (*S. fluminensis*),

— DE GAMBÁ — Pau d'alho.

— DE MULATA — *Tanacetum vulgare* L. Composta erbácia, ereta, aromática e ornamental. Fos fendi das; fls em capítulos, em cachos terminais. Amargo-tônica e vermífuga. Ainda pelo mesmo apelido se encontram o Gerânio, o Mangericão e o Cordão de frade (*S. martinicensis*, ou *Stachys flu-minensis*).

— DE NEGRO — *Cleome gigantea* L. Caparidácia arbórea e decorativa. Fos compostas, de 7 foliolos digitados, fls esverdiadas e fr folicular. Anti reumática. Tem o mesmo apelido a Canela da fo grande.

— DE PORCO — Catingueira e Pau de rato.

— DE PRETO — Maria preta (*C. curassavica*).

— DE TATU — Catinga de negro.

CATINGUEIRA — *Cassipiparia pyramidalis* Tul. Leguminosa arboreta, de fos compostas, bijugadas e coriáceas, fls amarelas, em rácimos, e vagem longa e coriácea.

CATINGUEIRO — Capim gordura, Oiticica e especialmente o Pau de rato.

— DE FOLHA MIUDA — Pau de rato.

CATLEIA — Orquídacias, das mais encontradiças, muito decorativas, compreendendo vora e híbridos. Destacam-se as seguintes: *Cattleya schiediana*, *C. amabilis*, *C. granulosa*, *C. jahia*, *C. purpurina*, estudadas por Lindl.

CATOLE — *Attalea oleifera* BR. Palmácia alta e xerófita. Fos longas e compostas pinadas; fls amareadas, com espatas; fr drupa cilíndroide acuminada, oleosa e comível.

— **BABÃO** — *Cocua edulis* BR. Palmácia arbustiva, com fls compostas pinadas, fls unissexuadas. Druna pequena, oleosa e comível.

CATUABA — *Anemopaegma glaucum* M. Bignoníacia arbustiva e silvestre. Trifólios coriáceos; fls campanhadas; fr capsular. Tem as virtudes atribuídas à Catuaba verdadeira.

— **DO MATO** — Congonha dos campos.

— **VERDADEIRA** — *Anemopaegma mirandum* DC. Bignoníacia rizomatosa, arbustiva e elegante. Trifólio; fls amarelas, amplas e afuniladas; fr cápsula. Corteza e ra-

tidos como estimulante nervino, antiasmfíticos e mormente afrodisíacos. Apresenta a.gumas vars. Soares da Cunha apurou que a C. verdadeira deve ser a *Tetragastris catuba*, da Fa das Burseráceas.

— VERMELHA — *Erythroxylon catuba* McIs. Leguminosa arbórea. CATUCAEM, CATUCANEM, CATUCANHÉ — Carne de vaca.

CATUÍBA — Catuaba (Indistintamente).

CATUJI — Vasa matéria.

CAUAÇU — Quina-quina, porém mais cabível ao Cabuçú.

CAUAAUA AMARGOSA — Congonha do Rio.

CAUCHO — *Castilloa ulm* Ward. Morácea altissima, com sapopemas na parte inferior do cau, fos longo ovalares, fls unissexuadas e fr drupácia. Sp produtora de borracha; sementes oleosas.

CAUDA DE LEÃO — Cordão de fraude.

— DE RAPOSA — *Amaranthus caudatus* L. Amarantácia sub arbustiva e ornamental. Cau encarnudo, fos lancioladas e fls em longas e pendentes espigas encarnadas. Emoliente e peitoral. *Erigeron canadensis* L. Composta sub arbustiva e ruderal. Fos pilosas, radicantes e caulinares; fls albas, em grandes panículas; aquênio. Sp oleosa, estimulante e adstringente.

— DE ZORRO — Capim rabo de burro.

CAUNA AMARGOSA — Congonha do Rio.

CAÚSTICO VEGETAL — Erva do diabo.

CAUVI — Angico.

CAVA — Cavaní.

CAVALEIRO DAS ONZE HORAS — Onze horas.

— DE SALA — Cega olho.

CAVANI — Camarataba.

CAVATAN — Ipê (Indistintamente).

CAVITINGA — Casasatinga e especialmente a Couvetinga.

CAVIJUNA — Vid Jacarandá verda-deiro.

CAVONE — Couvetinga.

CAXAPIÁ — Contra erva.

CAXICOEN — Pau concha.

CAXINGUBA — Gameleira (Indistintamente).

CAXIXI — Cascavel.

CEBOLA — *Allium cepa* L. Liliácia universalmente conhecida pelos seus bulbos comíveis, os quais, con-

soante as vars, cambiam de cor, forma e volume. O mesmo nome é dado a outras Liliáceas e Amari-dáceas. Certas Guttiferas, incluem-se nesse rol, devido à configuração dos frs.

— BARRÃO — Cebola cecém.

— BERRANTE — *Hippocratea equisetifolia* Herb. Amarilidácia erbácia, bulbosa e ornamental. Fos lineares, fls vistosas, campanuladas, carnadas e no vértice de longa raque. É uma das Açucenas.

— BRANCA — *Allium aescalonicum* L. Liliácia, que difere especialmente da Cebola pelos bulbhos em que se devide o bulbo. Além de existir uma var de Cebola com tal qualificativo, o *A. aescalonicum* tem sido também considerado outra var da mesma.

— BRAVA — Cebola do mato, Cebola cecém e Mangue cebola, donde a imprecisão do apelido.

— CECÉM ou CENCEM — *Ararrylis belladonna* L. Amari-dácia bolbo-sa. Fos radicantes largas e lineares; fls encarnadas, em grupos de 4, no vértice da raque. Anti ás-mática, bêquica e vomitiva.

— COMUM — Cebola.

— DE TODO O ANO — Cebolinha.

— DO MATO — *Griffinalia parviflora* K. e Gawl. e outras sps do mesmo Ge da Fa das Amari-dáceas. A referida é bolbosa, com fos lan-cioadas, fls espatuladas, tubulosas, albas, sobre a raque.

— ESCALONICA — Cebola branca.

— HORTENSE — Cebola.

— LUANA — Cará de caboclo.

CEBOLEIRO — Tres Marias.

CEROLEIRO — Cebola branca.

CEBOLINHA — *Allium fistulosum* L. Liliácia erbácia e viváz. Fos tubulosas, longas e fistulosas; fls em umbelas, sobre a raque. Fr capsular. Em vez de bulbo, como na Cebola, apresenta uma dilatação do cau, inferiormente.

— BRANCA — Cebola branca.

— DO CAMPO — Alho do mato.

CEBOLINHO CHEIROSO — *Nothoscordum fragans* Kunt. Liliácia er-bácia e bolbosa. Fos lineares e radicantes; fls albas, em umbelas, sobre longas fustes — aromáticas. N. uniflorum Bak. Erbácia da mesma Fa, com fos longo lineares. fls simples ou duplas, sobre raque delgada e com espata fendida. Sp inculta.

CEDRINHO — *Cupressus lusitanica* Mill. Sp de Cipreste e Pau pombo.

CEDRO — Designação especialmente de algumas Pináceas e, em segundo piano, de certas Lauráceas e Meliáceas, todas fornecendo excelentes madeiras de lei.

—**AMARELO** — Cedro batata.

—**AROMÁTICO** — Cedro cheiroso.

—**BATATA** — *Cedrela fissilis* V. Meliácea alta, sem ramificação. Fos compostas de pínculos lanciolados; fls amplas, albas e em cachos; fr capsular e lenhoso. Lenho de excelente qualidade, encarnado ou róseo. Córtez adstringente.

—**BRANCO** — Bilreiro. Cedro batata e C. cheiroso, donde a impreciso do apelido.

—**CANGERANA** — Cangerana.

—**CHEIROSO** — *Cedrela odorata* L. Meliácea de grande desenvolvimento e do mesmo tipo do Cedro batata. Lenho tido por inseticídio, leve, encarnado e fornecendo óleo aromático.

—**DA BAHIA** — Cedro batata.

—**DA VARZEA** — Cedro batata.

—**DE CARANGOLA** — Cedro batata.

—**DO BUSSACO** — Cedrinho (*C. lusitanica*).

—**DO RIO** — Cedro batata.

—**FEMEA** — Cedro cheiroso.

CEDRO-I — Pau pombo.

CEDRON — *Lippia lycioidea* Steud. Verbenácea arboreta, ramosa e ornamental. Fos lancioladas; fls em espigas eretas, flexíveis, abundantes, albas e muito aromáticas. Melífera.

CEDRO-NA — Cangerana.

CEDRO PORTUGUÊS — Cedrinho.

—**PRETO** — Canela preta (*N. glabra*) e Mandiocai.

CEDRORANA — Bilreiro.

CEDRO ROSA — Cedro batata.

—**VERMELHO** — Cedro batata e C. cheiroso.

CEGA MACHADO — Sebastião de Arruda (A sp pertence à Fa das Leguminosas).

—**OLHO** — *Asclepias curassavica* Griseb. Asclepiadácia arbustiva, inculta e elegante. Fos lancioladas; fls em umbelas, de calice encarnado e corola amarela. Sp tóxica, devendo pois ser eliminada dos campos forrageiros. Seu látex, no conceito geral, produz cegueira. Tem o mesmo apelido as suas congêneres — *A. mellora* S. H.; *A. um-*

bellata V., e uma Hidrofilácia, a Carqueja do pântano.

CELERI — Aipo.

CELGA — Acélga.

CELÔSIA BRANCA — Veludo branco.

CÉM FOLHAS — Rosa Amélia.

CENEUAUA — Andrequicê.

CENOURA — *Daucus carota* L. Umbífera erbácia muito cultivada. O cau e ra constituem o eixo da planta, que, geralmente carnoso, é comível, variando de forma, volume e coloração de conformidade com suas vars. Fog pinatifididas; fls em umbelas; fr aquênio. Vale assinalar seu grande valor nutritivo.

—**DE MONTEVIDEO** — Cenoura.

CENTAUREA, CENTAUREA DA TERRA — Quina de raiz.

—**DO BRASIL** — Fel da terra e, especialmente, a Quina de raiz.

—**MENOR** — *Schucbleria tenuifolia* Don. Gencianácea erbácia, de cau delgado, fos filiformes, fls albas, em cimeiras, e fr capsular. Amargo-tônica.

CEREIBA, CEREIBUNA, CERIIBA — Mangue branco.

CAREITINGA — Mangue branco.

CEREJA DA AMÉRICA — Cajá.

—**DA ESPANHA** — Cajá.

—**DA TERRA** — Cereja do Paraná.

—**JUDIA** — Camapu.

—**DE PURGA** — Abóbora do mato e Tuiuá.

—**DE SÃO FIDÉLIS** — Gameleira branca.

—**DO BRASIL** — Cereja do Paraná e Gingreira.

—**DO INFERNO** — Camapu.

—**DO MATO** — Cereja do Paraná e Tuiuá.

—**DO PARANÁ** — *Dimorphandra exaltata* Schot. Leguminosa arbórea. Fos compostas biparinipinadas, fls albas, em ranfúsculas de espigas; fr vagem coriácia e indecidente. Lenho bom para carpintaria e marcenaria.

—**DE JUDIA** — Camapu.

CEREJEIRA — Gameleira, (Especialmente o *F. dollearia*). Apelido impreciso.

—**IAS ANTILHAS** — Carrasquinha.

CERIBA — Babunha (Impreciso pois confunde-se com um dos apelidos do Mangue branco).

CEVADA — *Hordeum vulgare* L. Gramínia sub arbustiva. Fos lineares, eretas e invaginantes; fls em belas espigas plumosas; fr cariopse,

rico, especialmente, em amilácios e proteinas, donde sua importância na alimentação humana e dos animais. Anti-escorbútica, bêquica e diurética.

CEVADINHA MIUDA — Capim pé de galinha (*P. sanguinale*).

CHÁ BRAVO — Chá preto.

CHACHIM — Samambaia imperial.

CHÁ DA AMÉRICA — Chá preto.

DA CAMPANHA — *Echinodorus grandiflorus* Miche. Alismácia erbácia, rizomatosa, hidrófila e ornamental. Fos coriáceas, ovalares, eretas ou natantes; fls albas, em cachos verticilados; fr aquênio. Depurativo, emoliente e tônico.

DA INDIA — Vassoura da fo amarela. Injustificável.

DA MARTINICA — Chá preto.

DAS ANTILHAS — Chá preto.

DA TERRA — Chá preto.

DE BOUBAS — Azougue dos pobres (*Apodanthera*).

DE BUGRE — *Rudgea viburnoides* Bent. Rubiácia arboreta e ornamental. Fos lancioladas; fls albas, em cachos terminais e fr bacácio. Além de outras virtudes terapêuticas, é tônico e anti-sifilítico. Sua outra denominação — *Coffea viburnoides* Cham. — diz de suas afinidades com o Café. Outras sps, dentre as quais a Porangaba, tem o mesmo apelido.

DE FRADE — Bucho de bol e Porangaba.

DE FRANÇA — Erva cidreira.

DE LAGOA — Macela (*E. viscosa*).

DE LIMA — Chá preto.

DE MARAJÓ — Chá preto.

DE MATO — Café do mato (*C. coffeeides*).

DE NEGRO MINA — Porangaba.

DE SOLDADO — Porangaba.

DO BRASIL — Gervão.

DO BREJO — Chapeu de couro.

DO MARANHÃO — Chá preto.

DO MÉXICO — Chá preto e Mastruço.

DO POBRE — Chapeu de couro.

DO RIO — Congonha do Rio.

DOS JESUITAS — Mastruço.

CHAGAS — *Tropaeolum majus* L. Tropaeólia erbácia, sarmentosa e ornamental. Fos peitadas; fls longo pecioladas, solitárias, esporoadas, com petais livres, simples ou dobrados e de varias cores, consoante as diferentes vars; fr capsular, servindo de condimento. Anti-escorbútica. Sp pouco cultivada.

DE JESUS — Barbas de barata.

DE SÃO SEBASTIÃO — Sete chagas.

—MAIOR — Chagas.

CHÁ INGLÊS — Vassoura de relógio.

CHALOTA DAS COSINHAS — Cebola branca (*A. aescalonicum*).

CHAMBURI, CHAMBURU — Jaracatiá e Mamoeiro (Indistintamente).

CHÁ MINEIRO — *Tournefortia volubilis* L. Borraginácia arbustiva e erecta. Fos lanceoladas e escabrosas; fls em espigas, formando cachos; fr baga. Substitue o veradeiro Chá da Índia *Echinodorus pubeascens* M. Alismatácia erbácia com fos elípticas, fls em oachos e fr aquênio. Sp tônica e depurativa.

—MINEIRO VERDADEIRO — Chá mineiro (*T. volubilis*).

CHAMPACA — Magnólia amarela.

CHAPEU DE COURO — *Echinodorus macrophyllum* Mich. Alismatácia erbácia, hidrófila e ornamental. Fos coriáceas e lancioladas; fls em glomérulos de longa raque; fr aquênio. Diurético, anti-sifilítico e laxante. *Eremanthus sphacerocephalus* Bak. Composta sub-arbustiva de fos longo ovalares, coriáceas e tomentosas, fls em capítulos, azuladas e fr aquênio. Tem ainda o mesmo apelido o Clumes de veijo e, segundo P. Cor., uma Amarantácia — *Gomphrena hispida* Moq. mal conhecida.

—DE FRADE — *Zeyeria montana* M. Bignoníacea arbustiva, pilosa e inculta. Fos — pentafólios palmados; fls tubulosas em belos cachos terminais; fr cápsula bivalve, erizada de picantes; sementes aladas. Anti-sifilítica.

—DE NAPOLEÃO — *Thevetia peruviana* Schum. Apocinácia arboreta, ramosa e ornamental. Fos linearas, acuminadas e verde claras; fls amarelas, em rácimos; fr capsular, longo no sentido lateral, tetra-locular. O látex contem um tóxico a tivetina. Córtez emético e febrífugo.

—DE SOL — Amendoeira da Índia.

CHÁ POMONGA — Erva do diabo.

—PRETO — *Capraria biflora* L. Es-crofulariácia erbácia e erecta. Fos lancioladas, serrilhadas perto do ápice; fls axilares, alvas, aos pares; fr cápsula com 2 sulcos longitudinais. Eupéptico e sucedâpio do Chá da Índia.

CHARÃOZINHO ROXO — Barbati-mão.

CHARUTO DO REI — Arraiadeira.

CHAUA — Maçaranduba.

CHEIRO — Coentro, Hortelã, Quiôôô, Salsa e outras sps, que emprestam aroma agradável, ou excitante, aos alimentos.

CHEQUE-CHEQUE — Coração da Índia e mais cabível ao Chique-chique.

CHERIMÓLIA — Gravéola.

CHIBANTE — Cega olho.

CHIBATAN, CHIBATÃO — Aderno e Gonçalo Alves.

CHICA — Carajurú.

CHICARA E PIRES — Campanula medium L. Campanulácia sub arbustiva, erecta, pilosa e muito ornamental. Fos longo ovalares e esabrosas; fls violáceas e tubulosas e fr capsular. Adstringente; cultivada.

CHICHÁ — Sterculia foetida L. Esterculiácia alta e robusta. Fos com postas palmadas; fls axilares, de cheiro manifestamente fecalóide; fr capsular encarnado. Ornamental; adstringente; lenho de segunda. Tem o mesmo apelido a Sterculia chicha SH, sp muito afim.

FEDORENTO — Chichá.

CHICHILSACA — Capim rabo de burro.

CHILE — Rosa da Turquia.

CHICO-PIRES — Sucupira.

CHICÓRIA — Chicorium endivia L. Composta erbácia, cultivada como hortaliça. Fos amplas, recortadas e acentuadas; fos azuladas e fr aquênio. De uma de suas vars, a sativa, dimanaram as Escarolas e Endivas.

AMARGA — Chicorium intybus L. Composta erbácia, viváz, aceita como hortaliça e má sucedânea do Café. Fos ovalares; fls em capítulos.

AMARGA DO CAMPO — Chicória.

SELVAGEM — Chicória amarga.

VERDADEIRA — Chicória.

CHILCA — Vassoura de ferro.

CHIMBÓ — Tamboril e especialmente a Timbauba.

CHINCHILA — Cravo de defunto, do miudo.

CHIPOTA — Fruto amargo.

CHIQUE-CHIQUE — Designação de certas Cactáceas xerofítas dos Gêns Cereus e Pilocereus, vg. C. peruvianus, C. zehntneri e o P. seto-

sus; de Leguminosas conhecidas por Cascavel, e raras Palmáceas.

CHITA — Apelido de várias Orquídáceas do Gê Oncidium, epífitas, devendo à coloração variada de suas fls. Vg. O. pohlianum Cogn. e O. pumilum Lodd, ambas de perianto amarelo, sarapintado de pontos escuros. Vid Chuva de ouro (O. varicosum).

CRESPA — Flor do Divino Espírito Santo.

CHIXA — Chichá.

CHOCALHO — Cascavel.

—DE CASCAVEL — Cascavel.

—DE RAPOSA — Cascavel.

CHONTA — Babunha.

CHOPOTÔ — Fruto amargoso.

CHORAO — Acalypha poiretii Spreng Euforbiácia sub arbustiva e ornamental. Fos ováires, verdes e pilosas; fls encarnadas em amentilhos; fr capsular. Tem o mesmo apelido, a Casuarina, o Salgueiro e o Veludo vermejho.

—DA VIUVA — Capela de viuva.

—DOS JARDINS — Cauda de raposa (A. caudatus).

—SALGUEIRO — Salgueiro.

CHORONA — Veludo vermelho.

CHOUPÔ — Populus nigra L., var pyramidalis. Salicácia alta e piramidal. Fos quadrangulares; fls unisexuadas, em espigas ramosas; fr capsular. Pouco cultivada na Bahia. Ornamental.

—PIRAMIDAL — Choupo.

CHUCHÔ — Sechium edule Sw. Cucurbitácia gavinosa e ramosissima. Fos palmati lobadas; fls amarelas unisexuadas; fr — pepónido — sps de baga, piróide e muito apreciado quando cozido.

—BRANCO — Sechium edule Sw., var glaucocarpa. Tem as características do Chuchô, porém os fr são esbranquiçados.

CHULAS — Rhipsalis sarmientacea Otto. Cactácia epífita — Cardo pendurado — erbácia, constituída de ramos cilíndricos, todos com o mesmo diâmetro, verdosos e ramificados. Fls albas e solitárias; fr baga.

CHUMBINHO — Cardiospermum grandiflorum Sw. Sapindácia sarmientosa e ramosa. Cau canelado e piloso; trifólios ovalares; fls em cachos axilares; fr — cápsula trilocular e vesiculosa. Calmante e expectorante.

—ROXO — Cambará (L. camara).

CHUPA-CHUPA — Ananáz pelado, Contra erva e outras sps, donde a imprecisão do apelido.

—**MEL** — Ananáz pelado. Canudo de pito (*M. fistulosa*) e Madeira Silva, donde a imprecisão do apelido.

CHUVA DE OURO — *Cassia fistula* L. Leguminosa arboréta, decorativa, forrageira e medicinal. Fos compostas pinadas; fls amarelas, em abundantes cachos pendentes; fr vagem longa e cilíndrica, contendo polpa purgativa. Madeira de lei; tanígera. Tem o mesmo apelido as seguintes Orquídáceas: *Oncidium flexuosum* Sim. Rizoma flexuoso, fos — 2 — radicantes; fls amarelas em longa fuste geniculada. *O. varicosum* Lind. Sp toda amarela. Pseudo-boobos oblongos; fls com labelo do feitio de "largo babador trilobado". Ambas muito decorativas.

—**DE PRATA** — *Moringa oleifera* Lam, var *pterygosperma*. Moringácia arboréta, ornamental, parecida com as Cassias. Fos imparipinadas; fls alvíssimas; fr capsular longo, de tres arestas e com semidentes alados.

CHUVIRINGANA — *Vallesia glabra* Link. Apocinácia arboréta, dicotómica e latífera. Fos longo ovalares; fls em cimeiras disparam; fr drupa.

CIBUEIRO — *Coussapea curranii* Blak. Morácia sarmentosa, lactífera e robusta. Fos ovalares, fls em falsos capítulos e fr drupáceo.

CICUTA — Erva capitão, em vista das fos serem venenosas.

—**FALSA** — Erva capitão.

CIDRA, CIDREIRA — *Citrus limonum* Riss., var *cedra*. Rutácia arboréta, robusta e elegante. Fos longo elípticas; fls alvas e odorantes; fr hispéricio de mesocarpo — camisa — muito espesso, servindo para doces. Madeira de lei.

—**DO MATO** — *Citriostoma spissace* M., *C. camporum* Tul., *C. limoniadora* R. e Pav. e outras sps de Monimiáceas brasileiras, hoje integradas no Ge Siparana. São Ves arbustivos ou arboretas, de fos aromáticas, tidas como calmantes e carminativas, fls em cimeiras e fr — uma infrutescência — polidrupa. Vid Capituí.

—**DOS CAMPOS** — Cidreira do mato.

CIDRÃO — Cedron.

CIDRILHA, CIDRÓ, CIDRON — Cedron.

—**BRANCA** — Cedron.

CIGANA DO MATO — Cipó quebrador.

CIUBA — Sumauma.

CILA BRANCA — Ráios de Jupiter.

CINA — Coité.

CINA-CINA — Rosa da Turquia.

CINAMOMO — Sabonete de soldado.

CINCO CHAGAS — Chagas e Caroba da fl verde.

—**EM RAMA, ou em RAMO** — Carobeira.

—**FOLHAS** — Caroba da fl verde e Tarumá.

—**FOLHAS DO CAMPO** — Carobeira.

CINGABÁ — Manacá.

CINZEIRA, CINZEIRO — Pau de tucano e Pau terra.

CIPÓ ABA — *Cymbretum leprosum*

M. Combretácia semi sarmentosa. Fos ovalares e escabrosas; fls amarelas em panículas; fr sâmara.

—**ABACATE** — *Salacia brachypoda* Hess. Hipocrateácia.

—**ALMECEGA** — *Mikania carnulosa* DC. Composta sarmentosa até 2 metros de comprimento. Fos carnosas, ovalares e opostas; fls em capítulos umbeliformes; fr aquênio. Inculto; colagogo.

—**AZOUGUE** — Taiuiá.

—**AZOUGUE LEGÍTIMO** — Azougue dos pobres.

—**AZUL** — Capela de viúva.

—**BELA FLOR** — Cipó de São João (*P. ignea*).

—**BRANCO** — *Coccoloba ilheensis* Wed. Poligonácia trepadeira. Fos compostas pinadas; fls albas em cachos; baga aceita pelos animais. Adstringente. Assim também é conhecido o *Adenocalymma gommosum* DC. Bignoníacia.

—**BRANCO DE CERCA** — Cipó branco (*C. ilheensis*).

—**BRASIL** — Flor de pau.

—**CABELUDO** — *Mikania hirsutissima* DC. Composta trepadeira, pilosa e melífera. Fos amplas, cordiformes e acuminadas; fls em capítulos, formando corimbos; fr aquênio. Diurético, anti reumático. M. *setigera* Schultz. Sp muito afim da precedente. Anti nefrítico.

—**CABOCLO** — *Davilla rugosa* Poir. Dileniácia sarmentosa, robusta, áspera e pilosa. Fos ríjas, silicosas

- c elípticas; fls em cachos de capítulos, amarelas e aromáticas; fr capsular. Adstringente, emoliente e purgativa, passando por afrodisíaca. Os ramos substituem o Vime.
- CAFÉ — Boa noite (*I. bona-nox*).
- CAGADO — Paina de penas.
- CAMARAO — Cipó de rego.
- CAPA HOMEM — Cipó caboclo e Paina de penas.
- CARIJÓ ou CORIJÓ — Cipó caboclo.
- CARNEIRO — Cipó suma e C. de penas.
- CATETE — Parabigonia maximiliana. Bignoniácia trepadeira.
- CATINGA — Guaco (*M. glomerata* e *M. amara*).
- CHEIRÔSO — Cipó cruz.
- CHUMBO — Cuscuta americana L; *C. indecora* Choisy; *C. umbellata* HBK. e muitas outras sps de Convolvuláceas, do mesmo Ge. São filamentosas, áfilas ou com fos atrofiadas, amarelas ou encarnadas, que florescem e flutificam enramando-se sobre outras sps. São parasitos na primeira fase da vida, munidos de sugadores.
- CHUMBO DA FLOR MIUDINHA — Cipó chumbo (*C. umbellata*) e outra sp, a *Cuscuta parviflora* Willd.
- CHUMBO ORDINÁRIO — Cipó chumbo — *Cuscuta racemosa* M.
- CORTINA — Cortina dos pobres.
- CRAVO — *Tynnanthus elegans* Miers. Bignoniácia sarmentosa, com o cheiro do Cravo. Trifólio cotonoso; fls amarelas embranquiçadas, em cachos; fr capsular. Tônico eupéptico e aromático, usado, por isso, de veículo, na qualidade de xarope, para certos medicamentos. Passa por afrodisíaco.
- CRUZ — *Chiococca brachiata* R. e P. Rubiácia trepadeira, em que os ramos se dispõem em cruz. Fos elípticas; fls albas e em cachos: bagas. O córtex radicular — "ra de cainca", ou "ra de Quina" — é diurético, emenagogo e purgativo. A sp apresenta as seguintes vars: *densifolia*, *lanciolata*, *microphylla*, *peciolaris*, *rigida* e *valida*. *Clematitis dioica* L. Ranunculácia trepadeira com a mesma disposição crucial dos ramos. Trifólios; cálice petaloide e ausência de corola; aquênio. Ras purgativas. Sp or-

- namental. Sua var *brasiliiana* tem fos simples e fls em umbelas. C. Tor. assinala com o mesmo apelido a *Anemopaegma hijarianum*, Bignoniácia em que o corte transverso do cau representa uma "cruz de Malta".
- CRUZEIRO — Cipó cruz (*C. brachiata*).
- CRUZ VERDADEIRO — Cipó cruz (*C. brachiata*).
- CUCURÚ — Cipó cururú.
- CUMARU-APE — Cipó cururú.
- CURURU — *Paullinia pinnata* L. Sapindácia trepadeira do grupo dos Timbós. Pentafólios lanciolados; fls albas em cachos bracteados; cápsula piróide, encarnada e trilobular. Sedativo. Fibras empregadas em utilidades domésticas. Ainda merece o mesmo apelido, a *P. cururu* L., sp muito afim da precedente, outras registradas como Cipó timbó, como a *Serjania lethalis* SH. da mesma Fa que é bastante tóxica. Cau longo: fos compostas, imparipinuladas e de folhos lanciolados; fls em cachos, albas e tomentosas. Esta ainda é conhecida por Cipó timbó.
- D'AGUA — *Serjania caracasana* Willd. Sapindácia gavinhosa e ramosa, podendo figurar entre os genuinos Timbós. Fos coriácias, compostas do 1º grau e imparipinuladas; fls albas, em cachos, e fr sâmara. *Amphilophium vanthieri* DC. Bignoniácia, longa e gavinhosa. Fos compostas, difólios lanciolados; fls roxas, em rácimos; fr capsular.
- D'ALHO — Pau d'alho (Impróprio por não ser essa sp sarmamentosa). Cipó de régo.
- DA PRAIA — Salsa da praia e impropiamente o Carrapicho de cavalo.
- DE AIMBÉ — Cipó imbé.
- DE AMARRAR CARANGUELJO — Cipó de corda.
- DE BATATA — *Ipomoea batatas* Chois. Convolvulácia, inculta e ramosa. Fos trilobadas; fls albas ou violáceas e campanuladas; fr capsular. Purgativo.
- DE BAMBURRAL — Cipó de corda.
- DE BOI — *Alsomitra brasiliensis*, Cog. Cucurbitácia trepadeira, fls unisexuadas em cachos; fr pepôndio, de sementes aladas.

- DE BREU — Cunaná.
- DE CABOCLO — Cipó caboclo e Treme-treme.
- DE CARIJÓ — Cipó caboclo.
- DE CERCA — Cipó cabeludo.
- DE CESTA — *Meloe populifolia* Bur. Magnoliácia gavinosa e elegante. Bifólios ovalares; fls de longas corolas afuniladas, em ramos; fr capsular.
- DE CESTO — Cipó de corda.
- DE CHAGAS — Capuchinha.
- DE COBRA — Parreira brava e ainda mais impropriamente a Cabeça.
- DE CORDA — *Cydiota sequinoctialis* Mier. Bignoniácia trepadeira e longa. Fos compostas de folíolos coriáceos e ovalares; fls em paniculas; fr cápsula vúmosa. Ornamento. Peltoral e adstringente.
- DE CRUAPÉ VERMELHO — Cipó cururú.
- DE CUNANA — Cunaná (Impróprio pois esta sp é erecta).
- DE FIGADO — *Cacalia quadriflora* V. Composta sarmentosa. Fos cordiformes, carnosas, luzidias e opostas; fls em capítulos, dispostos em umbelas; aquênio. Empregado nas moléstias do fígado.
- DE FOGO — *Clarus erosa* Ric. Vitácia pilosa, de médio porte, e trepadeira. Trifólios lanciolados; fls encarnadas, em cimeiras; fr baga mono seminifera. Sp urente.
- DE GATO — *Batcydia unguis* M. Bignoniácia trepadeira, robusta e ornamental. Bifólios lanciolados, com gavinhias trifidas; fls amarelas infundibulares; fr cápsula longa, lembrando uma vagem. Tanígera; febrífuga.
- DE JABOTI — Nandiroba.
- DE JAPECANGA — Japecanga.
- DE JATOBÁ — Fruto amargo.
- DE LEITE — *Oxypetalum banksii* R. e Schul. Asclepiadácia sarmen- tosa, de cau caneado, das zonas litorâneas. Fos ovalares, de base cordiforme; fls amarelas; folículos. O apelido se estende a várias outras sps do mesmo Ge, a muitas sps de outras Fas e até à Cunaná.
- DE LUTO — Trombeta roxa. Impreciso, porque esta sp não é sarmen- tosa.
- DE MACACO — *Stenolobium velutinum* Bth. Leguminosa escanden- te e pilosa. Trifólios; fls arroxen-

- das; vagens. Tóxica para os peixes.
- DE MORCEGO — Cipó de gato.
- DE PAINA — Paina de penas.
- DE PENAS — Echites peltigera Stad. Apocinácia sarmentosa e escanden- te, com fos ovalares e pel- tadas, fls em cachos, de coroa hipocraterimorfa e róscas; fr siliqua.
- DE REGO — Arrabidaea agnus- castus DC. Bignoniácia escanden- te, robusta, de cau canelado. Di- ou trifólios ovalares; fls roxas, em cachos; fr capsular.
- DE SÃO FRANCISCO — Echites violacea V. Apocinácia escanden- te, ramosa e ornamental. Fos longo ovalares e velutinas; fls hipocrate- rimorfas, roxas; fr siliqua.
- DE SÃO JOÃO — Pyrostegia ignea Pres. Bignoniácia escanden- te, robusta e decorativa. Trifólio, dos quais um se transforma em gavinha trifida; fls longo afuniladas, alaranjadas, em belos cachos umbeliformes; Banisteria eglandulosa Jus. Malpigiácia trepadeira, com fos luzidias, longo ovalares e acumi- nadas, fls em paniculas.
- DE TRES QUINAS — Cipó de rego.
- CIPODÓ** — Fruto amargoso.
- CIPÓ DO REINO** — Cipó Cruz (C. dioica).
- DOURADO — Cipó chumbo.
- DOUTOR — Cipó almêcega.
- EMÉTICO — Cipó cruz (C. bra- chiata).
- EN — Alcaçus.
- CIPONGO** — Boa noite (I. bona noz); Campainha azul; Samambaiá (L. polimorphum).
- CIPÓ ESCADA** — *Bauhinia splen- dens* HBK. Leguminosa de cau achata e fortemente ondulado. Fos simples e bilobadas; fls albas em cachos; fr vagem. Lenho exce- lente para embutidos em outras madeiras, em pequenas obras de luxo. *B. langsdorffiana* Bong. ou- tra sp com o mesmo apelido, mui- to afim da precedente, sendo, po- rém, gavinosa e apresenta fls fer- rugíneas. Da mesma é conhecida a var *hahliensis*.
- ESCADA DE MACACO** — Cipó escada.
- FLORÃO** — *Bauhinia pulchella* Bent. Leguminosa muito parecida com o Cipó escada e esta sp, a *B. splendens*, tem o mesmo apelido.

GARCÉS — *Davilla grandifolia* Moric. Dileniácia de médio porte, de bastante afinidade com o Cipó cabcoco, com fós maiores e ásperas e fr capsular, globoso, de uma bemente.

ICICA ou ISSICA — Cipó de sítodo.

IMBÉ — *Philodendron imbe* Schot. Arácia robusta, aderente às árvores, por meio de rás grâmpas. Fós de longo pecíolo e amplo limbo cordiforme; fls em espigas espatuladas; fr bagas. Adstringente, diurético e purgativo. Outras sps do mesmo Gé e muito afins, são conhecidas pelo mesmo apelido.

JAPECANGA — Japecanga.

JATOBÁ — Fruto amargoso.

MATA COBRAS — *Milhomens*, especialmente a *A. cymbifera*.

MATADOR — Cipó imbê.

MILHOMENS — *Milhomens* (Indistintamente).

MORORÓ — Cipó escada.

NAVALHA — Tiririca.

PARAGUAIA — Cipó suma.

PAU — Paine de penas.

PÉ DE LAGARTIXA, ou de **LAGARTO** — Cipó de São João.

QUEBRADOR — *Fridericia guilielma* M. Bignoníacea escandente e ornamental. Trifólios longo elípticos; fls em belos cachos terminais; fr capsular.

REGO — Cipó de rego.

SANTANA — Tres Marias.

SANTO — Azougue dos pobres e Paine de penas.

SICURIJÓ — Guaco (M. amara).

CIPÓSINHO DE COBRA — Capeba, porém mais cabível ao Guaco.

DE SÃO JOÃO — Cipó de São João.

CIPÓ SUMA ou SUMÁ — *Anchieta salutaria* SH. Violácia arbustiva, ramosa e muito ornamental. Fós coriáciás e ovalares; fls esbranquiçadas, aromáticas, em pequenos cachos axilares; fr capsular, com sementes aladas e encarnadas. Cau depurativo; ra purgativa.

CIPOTÁ — Fruto amargoso.

CIPÓ TIMBÓ — Designação de inúmeras sps de Sapindáceas dos Gés *Paulinlia* e *Serjania*, constituindo os Timbós ou Tinguis sarmentosos, geralmente tóxicos, em condições de tinguizar animais de sangue frio, como os peixes, graças a certo alcaloide — a "rotenona". O Cipó cururd e o Cipó d'água são repre-

sentantes das mesmas, que guardam entre si estreita semelhança. Pelo menos, consta ainda existir na Bahia as seguintes sps: *Paulinlia elegans* Cham., *Serjania fuscofusca* Radl, *S. lethalis* SH, *S. paradox* Radl e *S. pectoralis* Radl. Vid Tingui.

TRES QUINAS — Cipó de rego.

TRINDADE — Cipó cravo e Cipó suma.

TRIPA DE GALINHA — *Dalechampia tiliaceifolia* Lam. Euforbiácia erbácia, sarmentosa e urente. Fós lobadas; fls em cachos, precedidas de vistosas bracteas alvadas; fr capsular.

UNHA DE BOI — Cipó escada e Unha de boi.

UNHA DE GATO — Cipó escada.

URTIGUINHA — Urtiguinha de cipó.

VERMELHO — *Tetracera breyniana* Schl. Dileniácia escandente e tanífera. Cau escabroso; fós elípticas; f's em cachos e fr capsular.

VIOLETA — *Dalbergia variabilis* Vog. Leguminosa arboreta e escandente. Fós compostas e imparipinhaladas; fls em cachos abundantes, amarelas; fr vagem longa. Lenho alvo, para carpintaria.

CIPRESTE — Várias sps de Coníferas, dos Gés *Cedrus*, *Cupressus* e *Tuya*. Servem de exemplos o Cedrinho, o *Cupressus sempervirens* L., de longo cau, de copa piramidal, vestido de escamas folíacias. Fls unisexuadas, fr composto — galbula. Madeira de lei e ornamento. Vid Cedrinho.

COMUM — Cipreste (*C. sempervirens*).

ITALIANO — Ciprete (*C. sempervirens*).

PIRAMIDAL — Cipreste (*C. sempervirens*).

CRÍO DE NOSSA SENHORA — Árvore da pureza.

CIRISÃO — Ervilhaca.

CIRIURA — Mangue branco.

CIMUES — Beijo de frade.

DE VELHA ou DE VELHO — *Zinnia elegans* L. Composta subarbustiva, muito ornamental e encontração. Fós simples e opostas, fls em belos capítulos eretos, cambiando de tamanho e coloração, de acordo com as vars.

CLARAIBA — *Cordia glabra* DC. Borraginácea arbórea. Fós largo

ovalares e luzidias; fls albas, hipocraterimorfas; fr drupácia comível. Maieira de lei.

CLEMATITE — Mimo do céu. Improprio, pois cabe melhor a determinadas Ranunculáceas.

CLETA — Cedron.

COAGERUCU — Pegerecú.

COAJINGUBA, COAJINGUAVA — Gameleira, especialmente a Lombrigueira.

COAJUNGUBA — Gameleira, especialmente a lombrigueira.

COAMBU — Carrapicho de agulha.

COANDU — Andu.

COAPIBA — Copaiba (Indistintamente).

COAPINGUBA, COAPINGUAVA — Gameleira, especialmente a Lombrigueira.

COA PIRANGA — Carajurú.

PUNGA — Coerana (Indistintamente).

COARA BRAVO — Tagetes minuta L. Composta erbácia, inculta e praga dos terrenos cultivados. Fos compostas pinadas, com folíolos longo lanciolados; fls em delgados capítulos, em cachos erectos. Sp aromática, diurética, eupéptica e tanígera.

COARANA — Coerana (Indistintamente).

COART BRAVO — Coará bravo.

COARO BRAVO — Coará bravo.

COATINDIBA — Corindiba e Crin-deuva.

COAXINGUBA — Gameleira, especialmente a Lombriguelra.

COAXIXA — Chichá.

COBEA — Estefânia.

COCA — Abóbora (Indistintamente).

COCA-COÇA — Paimeira africana.

COCADA — Vid Macaçá.

COCA DO PARAGUAI — Cabelo de negro.

COCÃO — Fruta de pomba e Arco de pipa.

COCLEARIA DOS JARDINS — Chagas.

CÓCÓ — *Xanthosema sagittaefolium* Sckot (var.). Arácia rizomatosa, robusta e prolífica, de maior porte que a Taioba, com a qual guarda estreita semelhança. Suas grandes tuberas são comíveis e apreciadas.

COCO AMARGOSO — Bartosa pseudococcus Cec. Palmácia de médio porte e ornamental. Fos do tipo penado; fls em espádice, abundantes; fr — drupa ou nôz — ovóide

não comível. Dá palmito amargo, porém édulo.

BABAÇU — Babaçu.

BARÃO — Baba de boi e Côco de quaresma.

BREJAUVA — Brejauva.

CAPIM — Capim dandá e Dandá.

CATOLÉ — Catolé.

CURIRI — Gachandô.

DA BAHIA — *Cocos nucifera* L. Palmácia elegante e longeva, sendo a sp mais importante da Fa. — "Coqueiro rei". Estípite flexível, alto e resistente; longas fos verticiladas; fr — drupa seca, considerada como nôz — de albumem sólido e líquido. O sólido dá a "copra" e o líquido — "a agua de côco" — saboroso, refrigerante e nutritivo. O mesocarpo fibroso — o "cairo" — é de grande valor industrial; o endocarpo, duríssimo, também apresenta muitas utilidades. Dêsse coqueiro, tudo se aproveita. Além da var anã — Coqueiro anão — Bondar estabeleceu as seguintes: verdadeiro ou da Índia, vermelho, caboclo e branco.

DE AIRI — Brejauva.

DE AIRI VERDE — Brejauva.

DE BOI — Baba de boi.

DE CABOCLO — Borasso.

DE CACHORRO — Baba de boi.

DE CATARRO — Macauba.

DE ESPINHO — Macauba.

DE GENTIO — Andá-açu.

DE IRI — Brejauva.

DE MACACO — Babaçu.

DE NATAL — Tucum (*B. setosa*).

DE NAZARÉ — Cacô.

DE PINDOBÁ — Pindoba e Catolé.

COCO DE PORTUGUÊS — Folha de fogo.

COCO DE PURGA — Andá-açu. Seus frs assemelham-se aos das Palmelras.

DE QUARESMA — *Syagrus picrophylla* B. Rodr. Palmácia pequena com fos compostas penadas, fls em espádice e frs — drupas — édulos. As fos servem de forragem.

DE ROSÁRIO — Babacu. Nicuri. Cabivel à 2.^a sp, pois suas amêndoas são vendidas enfiadas, como as contas de rosário.

DE SAPO — Baba de boi.

DE TUCUM — Tucum (Indistintamente).

DE VAQUEIRO, *Coccyzus campestris* M. Palmácia pequena, em touças;

- dos agrestes. Fos compostas penadas; fls lenhosas, em espádices; fr drupa oleaginosa. Ornamental, segundo Bondar.
- DO PARÁ — Borasso.
- INAJÁ — Babaçu.
- LEAL — Chagas.
- COCOMBRO** — Cabaça e ainda mais impropriamente o Pepino.
- COCOROBÓ** — Capim cebola.
- COCO VERDE** — Côco amargoso. Impróprio, qualquer côco imaturo merece esse apelido.
- COCURA** — Tararanga (Indistintamente).
- CODAGEM** — Caiuruçú.
- COENDRO** — Coentro.
- COENDU** — Andu.
- COENTRILHO** — Espinho de vintem.
- COENTRO** — *Coriandrum sativum* L. Umbelífera sub arbustiva, aromática e cultivada. Um dos elementos das 4 sps carminativas. Fos recortadas e compostas — multifidias; fls albas, em umbelas compostas; fr diaquênio. As fos — Cheiro — são empregadas na culinária.
- BRAVO** — *Eryngium foetidum* L. Umbelífera rasteira, de haste bifurcada. Fos espatuladas e denteadas, muito aromáticas; fls em curtas e espessas espiguetas; fr diaquênio. Condimento, afrodisíaco, anti espasmódico e anti pirético.
- DA COLÔNIA** — Coentro bravo.
- DA COLÚMBIA** — Coentro bravo.
- DA INDIA** — Coentro bravo.
- DAS HORTAS** — Coentro.
- DE BOI** — Coentro bravo.
- DE CABOCLO** — Coentro bravo.
- DO MARANHÃO** — Coentro bravo.
- DO SERTÃO** — Coentro bravo.
- GROSSO** — Coentro bravo.
- COERANA** — *Cestrum laevigatum* Sch. Solanácea arbustiva, ramosa, folhuda e de cau quebradiço. Fos lancioladas; fls alvacentas, em umbelas; fr baga pequena e globosa. As fos são inseticidas; as fls muito odorantes, mormente durante a noite, donde conhecidas por "Jasmim da noite". Sps mais comuns: *Cestrum clamatum* Dum.; *C. corymbosum* Sch.; *C. elegans* Sch.; *C. euianthes* Sch.; *C. martii* Sen.; *C. nocturnum* e o *C. pauciflorum* Nees. dentre outras.
- AMARELA** — Coerana, mormente o *C. corymbosum*.
- BRANCA** — Coerana (*C. laevigatum*).

- DA BAHIA** — Coerana (*C. laevigatum*).
- DE CARAVELAS** — Coerana (*C. pauciflorum*).
- DE SÃO PAULO** — Coerana (*C. laevigatum*).
- DO BREJO** — Coerana, especialmente o *C. corymbosum*.
- VERMELHA** — Coerana, especialmente o *C. elegans*.
- COFO, COFO DO DIABO** — Milhomens, especialmente a *A. cymbifera*.
- COIARUÇÚ** — Caiuruçú.
- COIFA DO DIABO** — Milhomens, especialmente a *A. cymbifera*.
- COIRAMA** — Folha da Costa e especialmente a Coerana.
- COIRANA** — Coerana (Indistintamente).
- COITÉ, COITEZEIRA** — *Crescentia cujete* L. Bignoníacea arbórea, ramosa e tortuosa. Fos largas, luzidas e espatuladas; fls caulinares, campanuladas; fr baga — anfisarcá — esferóide ou piróide, de polpa, que fornece matéria corante negra, e de pericarpo lenhoso, delgado, leve, flexível e resistente, servindo para cílias e recipientes. Madeira de segunda.
- COLA** — Noz de cola.
- AFRICANA** — Noz de cola.
- BELAII** — Noz de cola.
- DE SAPATEIRO** — *Catasetum fimbriatum* Lind. Orquídacia muito conhecida. O Sumaré tem o mesmo apelido.
- DE ZORRO** — Capim rabo de burro.
- COLAEIRA, COLEIRA, COLATEIRA, COLATEIRO** — Noz de cola.
- COLA MEDICINAL** — Noz de cola.
- VERA** — Noz de cola.
- COLEOS, COLEUS** — Inúmeras sps, vars e híbridos de Labiadás do Gé Coleus, apreciados pela beleza de suas fos. São de porte erbáceo ou subarbustivo. Cau quadrangular, fos elípticas, acuminadas, apresentando várias pigmentações; fls em espigas longas. Todas as vars conhecidas parecem derivadas das seguintes: *C. blumei* Bth de fos amarelas com manchas roxas; *C. scutellarioides* Bth. de fos purpúreas e bordas verdes; *C. verschaffeltii* Lem. de fos amplas e cordiformes.
- DE JAVA** — Coleos (*C. blumei*).
- COLHER DE PAU** — Pau de colher (*N. cocleatum*).

— DE VAQUEIRO — *Sauvertia convalariaeodora* SH. Voquisíacia arbórea, ornamental e resinifera. Fos coriáceas, espatuladas; fls aromáticas, de esporão, em belos cachos terminais; fr capsular.

COLONB — Cabaça.

COLONDRO — Abóbora d'água e Cabaça.

COMADRE DE AZEITE — Caiati.

COMANDA — Leguminosas sarmenosas, anuais ou vivazes e forrageiras, porém, com frs suspeitos. Pertencem ao Ge *Lathyrus*: *L. acutifolius* Vog; *L. sericeus* Lam.; *L. stipularis* Presl.

COMANDAÇU — Acapurana.

COMANDA DO BREJO — *Lathyrus palustris* L. Leguminosa trepadeira e erbácia. Cau alado; fos paripinuladas e gavinhasas; fls em pequenos cachos azuis ou arroxeadas; fr vagem achatada.

COMANDAIBA — Batatarana e especialmente o Feijão da praia.

COMANDATUBA — *Hirtella martiana* Hk. Rosácea arbórea, esgaihada e tunígera. Fos ovalares, coriáceas; fls róseas, em elegantes espigas; fr. drupa piróide e comível.

COMANDAU-AÇU, **COMANDAU-AÇU**

— Andá-açu.

COMARI, **COMARIM** — Pimenta comari.

COMER DE ARARA — Jatobá (Indistintamente).

COMICHÁ — Grumichama.

COMINHO — *Cuminum cyminum* L. Umbellifera erbácia e aromática. Fos multifidias; fl em umbelias; fr diaquênio piloso, de aspecto capsular. As sementes, além de aplicações industriais, são carminativas, emenagogas e constituem conhecido "tempero" em culinária.

— **ARMÉNIO** — Alcarávia.

— **DOS PRADOS** — Alcaravia.

— **ROMANO** — Alcaravia.

COMONA — Sapucainha.

CONABI, **CONAMBI** — *Phyllanthus acuminatus* Vahl. ou *P. brasiliensis* M. Arg. Euforbiácia arbórea, tida como das mais acreditadas Tinguis, dentro da Bahia. Fos ovalares e acuminadas; fls nas axilas das fos; fr capsular. Diurética, eupéptica, tônica e purgativa.

— **PARÁ** — Conabi.

CONAMI, **CONANI CONANU**, **CONAVI** — Conabi.

CONDESSA — Fruta de conde.

CONDURI — Apé.

CONDUKÚ — *Brosimum conduru* Schott ou F. Alc. segundo P. Cor., que sendo "sp duvidosa de Morácia" julga possível ser o Condurú de sangue — *B. paraensis* Aub. Moracia de grande desenvolvimento, fornecendo lenho de coloração encarnada, para obras de luxo.

— **DE SANGUE** — Condurú (*B. paraensis*, que não consta existir na Bahia).

— **DO PARÁ** — Condurú (*B. paraensis*).

— **VERMELHO** — Condurú.

CONFETE — *Nephrolepus diffili*. Polipodiácia ornamental, erbácia e dicotómica. Longa fronde com pequenos foliolos, com o feitio de confetes.

CONGONHA — Denominação geralmente conferida a certas Aquifoliáceas do Ge *Ilex*, cujas fos prestam-se para beberagens, contribuindo até à falsificação do Mate. Há, todavia, sps com o mesmo apelido, acrecido de sobrenomes vulgares, correspondentes a Fas diferentes: Cejastrácia, Leguminosa, Ocnácia, Proteácia, Rubiácia, Solanácia e Voquisíacia. Registe-se ainda a seguinte Simplicácia, tão só conhecida por Congonha: *Symplocos rhamnifolia* DC. Arbusto tortuoso, segundo P. Cor., existente na Bahia. Fos coriáceas ovalares; fls axilares, albas, em pequenos cachos; fr capsular. Sucedânea do Mate.

— **BRAVA** — Carne de anta.

— **BRAVA DA FOLHA MIUDA** — Carne de anta.

— **CACHIMBO** — Pau de tucano.

— **DA BAHIA** — *Ilex apollonis* Reis. Aquifoliácia arbórea, sucedânea do Mate. Fos lancioladas e coriáceas, fls axilares e fr bacácio.

— **DE GOIÁZ** — *Ilex affinis* Gardn. Aquifoliácia arboreta e hidrófila.

Fos largo elípticas e vernicosas; fls albas, em cachos; fr drupáceo. Dentre suas vars a genuina lembra o Mate verdadeiro.

— **DO BREJO** — Chá de campanha.

— **DO CAMPO** — Pau de tucano e, propriamente, a Congonha de Goiáz.

— **DO GENTIO** — Chá de bugre.

— **DO MATO** — Congonha do Rio.

— **DO RIO** — *Ilex theezans* M. Aquifoliácia alta, de fos coriáceas e elípticas, fls pentámeras axilares e frs drupáceos. Além de sucedânea

do Mate, as fos são diuréticas e eupépticas.

— DOS CAMPOS — *Ilex conocarpa* Reis. Aquifoliácia arbórea e melifera. Fos largo elípticas, coriáceas e serrilhadas; fos aromáticas, esbranquiçadas e axilares; fr drupáceo. Tida por uma das Catuabás, talvez por ser tônica. Tem o mesmo apelido a "Maria preta" (V. polykama).

— VERMELHA — *Roupaia lucens* Meis. Proteácia arbustiva com fos coriáceas, luzidias e elípticas, fos amareadas em cachos e fr foliáceo.

CONGONHEIRO — Canela santa. Apelido que cabe, justamente, a todas as Congonhas.

CONGORÇA, CONGORSA — Boa noite (Vinea) e impropriamente ao Maiteiro.

CONGUERECOU — Pegerecu.

CONTAS DE COBRA — Contra erva.

— DE LEITE — Lágrimas de Nossa Senhora.

— DE SANTA MARIA — Lágrimas de Nossa Senhora.

CONTRA COBRAS — *Aegiphila sanitaria* HBK. Verbenácia arbustiva, fétida, tida por anti ofídica. Fos pilosas e elípticas, fls esverdeadas, infundibulares e em cachos.

CONTRA ERVA — *Dorstenia brasiliensis* Lam. Morácia erbácea, vívaz, rizomatosa e aromática. Fos escabrosas, pilosas e fendas; fls unisexuadas, sobre amplo receptáculo carnoso; fr aquênio. Tuberas diuréticas, febrífugas, eméticas e purgativas. *Dorstenia bahiensis* Kl. Erbácia rizomatosa, com amplas fos oblongas e fls unisexuadas, sobre receptáculo. *Dorstenia multiflora* Miq. Erbácia rizomatosa, de amplas fos sagitadas ou polimorfas e com fls nas mesmas condições das sps precedentes. Em virtude dos animais mordidos por serpentes se valerem de suas tuberas, tais sps ficaram conhecidas por Contra erva.

— ERVA BASTARDA — Milhomens, mormente a A. trilobata.

— ERVA DAS FARMÁCIAS — Contra erva (D. brasiliensis).

— ERVA DO BRASIL — Contra erva (D. brasiliensis).

— ERVA OFICIAL — Contra erva (D. brasiliensis).

CONTRAIERVA — Contra erva (Indistintamente).

CONTRA VENENO — Cipó cruz. Apelido impreciso porque se ajusta a outras sps.

COOPEVA — Parreira brava.

COPAIA — Caroba (Indistintamente).

COPAIBA, COPAIBEIRA — *Copaifera officinalis* L. Leguminosa alta e oleifera. Fos impuripinuladas; fls em cachos compactos e eretos; fr vagem mono seminifera. O óleo, retirado do córtex e também do lenho, fora tido como específico da blenorragia. É cicatrizante e tem maior industrial. Pelo mesmo apelido, ainda se identificam outras sps do mesmo Ge.

— **ANGELIM** — Cana fistula (C. multijuga).

— DA VARZEA — *Copaiba vermeňha*.

— VERDADEIRA — *Copaiba* (C. officinalis).

— **VERMELHA** — *Copaifera langsdorffii* Desf. Leguminosa de grande envergadura e do mesmo tipo da Copaiba. Folhos lanciolados; lenho encarnado. Fornece "bálsamo" ou "óleo de Copaiba" de excelente qualidade. Sp decorativa.

COPAL — Jatai.

— AMERICANO — Jatai.

— DO BRASIL — Jatai.

COPAU — *Copaiba* (Indistintamente).

ACU — Gameleira (F. doliaria).

COPAUBA, COPAUVA, COPIUVA — *Copaiba* (Indistintamente).

COPINHO — Pacari.

COPO D'AGUA — Quina de raiz.

COQUEIRINHO DE PETRÓPOLIS — Palmeirinha de Petrópolis.

— DE VÉNUS — Coqueiro de Vénus.

COQUEIRO AMARGOSO (COCO) — *Syagrus oleracea* Becc. Palmácia elegante, de longo, delgado e flexível estípite. Fos verticiladas, compostas do tipo pinado; fls em espádice; frs drupas oleosas. Palmito amargo.

— ANAO — Var preciosa do Côco da Bahia, conhecida também por nlyur gading. Frutifica precocemente. Foi introduzida por Artur Neiva.

— BURITI — Buriti.

— CABEÇUDO — Nicuri.

— CATOLÉ — *Syagrus coronosa* M. Palmácia pequena, com fos compostas pinadas, fls em espádices; fr drupa, de albumem oleosa e amargo. Palmito amargo. A sp vive em aglomerados e difere do Catolé.

— CURIRI — Cachandó.

- DA BAHIA — Côco da Bahia.
 — DA FRAJA — Cachandó e designação imprópria que vem tomando o Côco da Bahia.
 — DE PIAÇABA OU PIASSAVA — Piçaba.
 — DE PINDOBA — Pindoba.
 — DE VENUS — *Cordyline terminalis* Kunt ou *Oracaeena brasiliensis* Hort. Liliácia arbustiva ereta e ornamental pelas fls — verticiladas, longo elípticas, roséas, roxas ou bronzeadas. Fls em espigas.
 — GUABIROBA ou GUARIROBA — Coqueiro amargo.
 — MATA-FOME — *Coccus mata-fome* Bondar. Palmeira rústica, ereta, com fls pinadas e de pequeno porte. Sp xerófita de frs édulas.
 — MENINO — Coqueiro anão.
 — REI — Côco da Bahia.
- COQUILHO** — *Canna glauca* L. Cannácea erbácia, ornamental. Fls amplas, lanceloladas e invaginantes; fls em cachos terminais; fr cápsula. Rizoma feculento; fibras têxteis.
- COQUIM AMARGOSO** — Côco amargoso.
- COQUINHO** — Alho do mato.
- CORAÇÃO DA ÍNDIA** — *Cardiospermum halicacabum* L. Sapindácia sarmentosa hidrófila e ornamental. Fls gavinhas; fls alvas, em cachos; fr cápsula vesiculosa e trilocular. Todas as suas partes têm emprego terapêutico os mais dispares.
- DE BOI — Fruta de conde.
 — DE BUGRE — Aroeira (Indistintamente).
 — DE ESTUDANTE — Inúmeras sps, vars e híbridos de Begoniáceas do gê. *Begonia*, geralmente cultivadas e ornamentais, pela beleza das fls e mesmo das fls. *Begonia neeleata* DC; *B. rex* Putz; *B. sanguinea* Radd; *B. schlumbergeriana* Lem; a conhecida por Azedinha da Bahia e outras.
- DE JESUS — *Mikania officinalis* M. Composta sub arbustiva, ramosa e decorativa. Fls denteadas ou fendas; fls em capítulos, dispostos em espigas; fr aquênio. A sp, também conhecida por Guaco, passa por eupéptica, febrífuga e tônica. Tem o mesmo apelido o Chapeu de Napoleão.
- DE MARIA — Coração magoado.
 — DE NEGRO — Barauna, Brauna, Sapatinho do diabo e outras sps, donde a imprecisão do apelido.
- DE RAINHA — Graveola.
 — MAGOADO — *Iresine herbstii* Hoot. Amarantácea sub arbustiva. Sp muito ornamental, devida a suas fls roxas, abcordiformes e com nervuras muito salientes. Cau carnoso; fls alvas.
- NEGRO — Gingreira.
- CORAL** — *Rusellia equisetiformis* Cham. ou ainda *R. juncea* Zucc. Escrofulariácea arbustiva e muito ornamental. Fls pequenas e lineares, sobre ampla ramificação verdosa e estrinada; fls encarnadas, de corolas tubulosas. *Siphocampylus cocclneus* Hk. Campanulada sub arbustiva, lactífera e ornamental. Fls ovalares e denteadas; fls de longa corola encarnada e labiada. Tem, ainda, o mesmo nome o Mimo do ceu.
- CORALEIRA CRISTADA** — Mulungá (*E. crista-galli*).
- CORÁLIA** — Mimo do ceu.
- CORAL VERDE** — Aveláz.
- CORANA** — *Coerana* (Indistintamente).
- CORBELHÃ** — Capela de viúva.
- CORDÃO DE FRADE** — *Leucas martinicensis* R. Br., ou *Stachys fluminensis*. Labiada sub arbustiva, de cau sulcado e quadrangular; fls longo ovalares, serrilhadas e pilosas; fls alvas, com brácteas espinhosas, em capítulos glomerulares, em torno do cau; fr aquênio. Sp tônica e aromática. *Leonotis nepetaefolia* R. Br. Labiada arbustinho. Fls ovalares e crenadas; fls bilabiadas encarnadas ou amarejadas, em capítulos. Diurético, antiespasmódico e febrífugo.
- DE OURO — *Solidago microglossa* DC. Composta erbácia, ereta e ornamental. Fls lineares, estreitas e alternas; fls áureas, em pequenos capítulos, dispostos em espigas escorpídeas. É bem conhecida a var — *S. bonariensis* Don. Ainda com o mesmo nome vulgar o Ranunculo brasileiro e o *Ranunculus bonariensis* Poir. Ranunculácia erbácia, com fls lanceloladas e fls axilares, amareladas, de longo pedúnculo; fr aquênio. Sp hidrófila, tida por narcótica.
- DE SÃO FRANCISCO — Cordão de fraude.
- DE SÃO FRANCISCO DO GRANDE — Cordão de fraude.
- DE SÃO FRANCISCO DO PEQUENO — Erva Macaé.

- DE SÃO FRANCISCO DO ROXO—
Erva Macné.
CORDOBAN — Trapoeiraba açú.
CORENDIVA — Corindiba.
COREOPSIS — Cosmos.
CORETE — Carurú da Bahia.
CORIANDRO — Coentro.
CORIANGO — Ananáz pelado.
CORILOPES, CORILOPES DO JAPÃO — Cosmos (Corrulela de Cereopsis, Ge afim do Cosmos).
CORINDIBA — *Celtis brasiliensis* Plan. Ulmácia arbustiva, sarmamentosa e armada. Fos elípticas acuminadas; fls esverdeadas e axilares; fr drupa pilosa. Córtez fibroso e adstringente; lenho alvo e leve.
CORINDIUBA, CORINDIUDA — Corindiba.
CORIOPSE — Cosmos (Vid. Corlopes).
CORNEIBA — Aroeira (Indistintamente).
CORA — Caroá e, especialmente, o Melão caboclo.
CORA DE BISPO — Lustre.
—DE CRISTO — *Palinurus australis* Gaert. Ramnácia arbustiva, armadissima e ornamental. Fos ovalares e disticas; fls amarelas, em cachos axilares; fr sâmara. Adstringente. O Aveloz tem o mesmo apelido.
—DE FRADE — Mucunã.
—DE MOÇAMBIQUE — *Haemanthus coccineus* L. Amarilidácia erbácia, bulbosa e ornamental. Fos radicantes; fls coccínias, dispostas em esfera, no ápice de longa fuste carno.
—SR.
—DE NOSSA SENHORA — Dois amigos.
—DE NOSSO SENHOR — Dois amigos.
—DE VIUVA — Capela de viuva.
—DO REI DE MOÇAMBIQUE — Coroa de Moçambique.
—IMPERIAL — Coroa de Moçambique.
COROA-NHA — Corona.
CORTOATÁ — Gravatá e Piteira.
CORTOIBA — Bálsmo de tolú.
COROMILHO DO CAMPO — Maiteiro.
CORONA-CRIS — Esponjeira.
CORONHA — Café dos navegantes e Esponjeira.
CORRE-CORRE — Pega rapaz.
CORREDEIRA — Curraleira.
CORRENTE — Periquito.
CORTEZIA — Capim mourão.

- CORTIÇA — *Araticum cortiça*, Mu-lungú, Sobreiro e outras sps, donde a imprecisão do apelido.
—DO CAMPO — Corticeira do campo (*A. sensitiva*).
CORTICEIRA — Vid Cortiça.
—DO CAMPO — *Aeschynomene filosa* M. Leguminosa sub arbustiva, com fos compostas multijugadas; fls em pequenos cachos e bracteadas; fr vagem, articulada e estreita. *A. sensitiva* Sw. Arbustinho ramoso e hidrófilo, com o cau e ras fornecendo boa cortiça. Fos compostas com os movimentos da Sensitiva; fls em pequenos cachos amarelas; fr vagem escura e recurva. Boa forragem.
CORTIÇO — Vid Cortiça.
CORTINA — Cortina dos pobres.
—DE OXALÁ — Cortina dos pobres.
—DOS POBRES — *Cissus cicyoides* L. ou *C. rutilus*. Vitácia sarmamentosa, gavinosa e ornamental. Fos cordiformes; fls amarelo esverdeadas; fr drupa, com matéria corante azul. Do cau descem inúmeras ras aéreas e longas, dispondo-se a maneira de cortina.
—JAPONESA — Cortina dos pobres.
CORUBÁ — Corindiba.
CORUMBETARU — Espinho de vintem.
CÓSMEA — Cosmos.
COSMOS — *Cosmos sulfureus* Cay. Composta sub arbustiva, pilosa e ornamental. Fos inteiras e opositas; fls amarelas ou sulfúreas, em capítulos singelos; fr aquênio, encimado com 2 picantes. *C. caudatus* HBK. Composta do mesmo tipo, com fls róscas, em capítulos dispostos em corimbos. Tem o mesmo apelido o Carrapicho de agulha.
COSTA BRANCA — *Chaptalia nutans* Hemsley. Composta erbácia e não ramosa. Fos radicantes, espatuladas com estípulas que se continuam com o limbo; fls em capítulos solitários; fr aquênio. As fos, radicantes, apresentam a face dorsal branca. A sp tambem é conhecida por Lingua de vaca e atualmente pertence a outro Ge. O Chá de bugre tem igualmente o mesmo apelido.
COSTELA DE VACA — *Coccoloba ochreolata* Wed. Poligonácia arbórea e floratal. Cau tortuoso; fos amplas, coriáceas, orbiculares e acu-

minadas; fls em espigas; fr drupa comivel. Lenho de segunda.

COTA — Taiuiá.

COTIEIRA — Andá-açu.

COTINDIBA — Corindiba.

COTO — Chá de bugre.

—**COTÓ** — Chá de bugre.

COURAMA — Folha da Costa.

COURANA — Coerana.

COUVE — *Brassica oleracea* L. Crucífera hortense, sub arbustiva ou erbácia, muito utilizada da alimentação humana. Cau carnoso; fos amplas, carnosas e com a superfície gordurosas; fls alvas ou amarelas, de corola cruciforme; fr siliqua. Da sp são conhecidas inúmeras var, consoante o porte, condições particularíssimas das fos e das fls. Geralmente são admitidas por esse nome vulgar as sps *acephalias*, ou sem cabeças, diferentes dos repolhos e da Couve-flor.

—**CACHEIRA** — Couve nabo.

—**CARAIBA** — Taioba.

—**CÓCO** — Repolho.

—**COQUEIRO** — Couve de todo ano.

—**CRAVINHO** — *Porophyllum ruderale* Cas. Composta erbácia, ramosa e de mau cheiro. Fos oblongas e acuminadas; fls brônzeas em capítulos; fr aquênio. Calmante e diarreética.

—**CRESPA** — *Brassica oleracea* L. var *crispa*. Crucífera hortense, que apenas difere da Couve pela configuração irregular das fos.

—**D'AGUA** — *Mourera aspera* Tul. Podostemácia erbácia e ornamental. Fos radicantes e longo elípticas; fls rosas, em espigas; fr capsular. Hidrófila.

—**DAS HORTAS** — Couve.

—**DE BRUXELAS** — *Brassica oleracea* L. var *gemmaifera* DC. Crucífera sub arbustiva. De notável, apresenta brotos laterais comíveis, com o feitio de pequenos repolhos.

—**DE CABRA** — Couve.

—**DE MILÃO ORDINÁRIA** — Couve lombarda.

—**DE SABÓIA** — Couve lombarda.

—**DE SABÓIA VERDE** — Couve lombarda.

—**DE SIAO** — Couve rábano e Rábano.

—**DE TODO ANO** — *Brassica oleracea* L. var arbustiva. Difere da Couve pelo desenvolvimento em altura, até 4 metros.

—**FLOR** — *Brassica oleracea* L. var *botrytis*. Crucífera sub arbustiva e a mais importante do Ge Brassicá. Além das fos, comíveis, como as da Couve, se recomenda pelas grandes inflorescências, reduzidas apenas aos pedunculos florais. Muitas vars. Exige clima frio.

—**FOLIACEA** — Couve.

—**GALEGA** — Couve de todo ano.

—**LOMBARDA** — *Brassica oleracea* L. var *violacea*. Tem os caracteres da Couve, porém com fos rugosas e violáceas.

—**MINEIRA** — Couve de todo ano.

—**NABEIRA** — Couve nabo e Nabo.

—**NABO** — *Brassica oleracea* L. var *napo-brassica* DC. Var de Couve, em que além das fos, é comível o cau dilatado, como tuberas globoides, do róscio ao roxo, e subterrâneo. Algumas sub vara.

—**NEGRA** — Mostarda.

—**PALMEIRA** — Couve de todo ano.

—**PENCA DE CHAVES** — Couve tronchuda.

—**RÁBANO** ou **RABAM** — *Brassica oleracea* L. var *gongyloides* DC. Var de Couve, apresentando dilatação do cau, globóide ou fusiforme, com cicatrizes das fos, de excelente sabor e que se formam acima do solo. As vars branca e roxa são das mais cultivadas.

—**RABAO** — Couve rábano.

—**REPOLHO** — Couve repolhuda.

—**REPOLHUDA** — *Brassica oleracea* L. var *sub-captata*. Crucífera meio termo entre a Couve e o Repolho.

—**REPOLHUDA ROCHA** — Couve lombarda..

—**SERGIPANA** — Couve de todo ano.

—**COUVETINGA** — *Solanum auriculatum* Ait. Solanácia arboreta, pilosa e forrageira. Fos ovalares e airculadas; fls em corimbos, violáceas; fr baga pulverulenta, tida por calmante e diurética. Lenho alvo e leve. Tem o mesmo nome a Calcaria, sp muito afim.

—**COUVE TRONCHUDA** — Couve. Var apresentando fos espessas e aglomeradas, formando sp de cabeça.

—**VERDE SINGELA** — Couve.

—**VERMELHA CABEÇA DE NEGRO** — Couve lombarda.

—**COUVINHA** — Couve cravinho e C. lombarda.

—**COXA DE FRANGO** — Farinha seca e Pau de tucano (Impreciso).

—**COXI CAEM**, **CAXI CAEM** — Pau concha.

- CRACOANTAM** — Bilreiro.
CRAGOATÁ, GRAGOATAN — Bilreiro, Camboatá e especialmente o Gravatá.
CRAIBA — Caraiba.
CRAUNA — Barauna ou Brauna.
CRAVATÁ — Gravatá.
CRAVINA — *Dianthus plumarius* L. Cariofilácia do mesmo tipo do Cravo, sendo porém, menor e com mais reduzido número de pétalos. Muitas vars.
—BRANCA — *Dianthus plumarius* L. var. *albiflora*. É uma Cravina de floração alba.
—DA CHINA — *Dianthus chinensis* L. Cariofilácia erbácia, ramosa e erecta. Flos longo lancioladas; fls de 5 pétalos, denteados. Apresenta muitas vars, inclusive as de corola dobrada.
—D'AGUA — *Jussiaea linifolia* Vahl. Enoterácia erbácia e hidrófila. Flos longo lancioladas; fls amarelo esbranquiçadas e sésseis; fr cápsula cilíndrica.
—DE LAGARTIXA — Cravina d'água.
—DE TODO ANO — *Dianthus plumarius* L., var *semper-florens*. Sp de floração contínua.
—DE TÚNIS — Cravo de defunto (*T. patula*).
—DE PAU — Cravo de pau.
—FRANJADA — Cravina branca. Impróprio.
CRAVINHO DA ÍNDIA — Cravo de defunto (*T. patula*).
—DO MATO — Mastruço.
CRAVO (dos jardins), **CRAVEIRO** — *Dianthus caryophyllus* L. Cariofilácia universalmente cultivada, pela beleza e perfume de suas fls, que, nas sps primitivas, apenas possuam 5 pétalos, se apresentam dobradas, de vários coloridos e tamanhos, consoante as inúmeras vars.
—BORDADO — Cravina (Impróprio)
—BRAVO — Coará bravo.
—CHEIROSO — Cravo dos jardins.
—DA ÍNDIA — *Caryophyllus aromaticus* L. Mirtácia elegante e alta. Flos elípticas e luzidias; fls aromáticas, encarnadas, em corimbos; fr drupa. O cálice e o ovário, colhidos antes do desabrochar da fl, constituem o Cravo da Índia, usado em culinária e na perfumaria. Excelente madeira.
—DA ROÇA — *Ambrosia americana*.
—DAS MOLUCAS — Cravo da Índia.
- DE CABECINHA** — Cravo da Índia.
—DE DEFUNTO — *Tagetes patula* L. Composta ramosa, anual e decorativa. Flos multi fendidas; fls em capítulos, amareladas; fr aquênio. *Tagetes erecta* L. Composta do mesmo tipo da precedente, com inflorescências maiores, mais vistosas e hemisféricas. Sp sub arbustiva. As inflorescências dessas sps lembram o Cravo dos jardins, sendo este aliás de fl isolada. Ambas apresentam algumas vars.
—DE DEFUNTO DOBRADO — Cravo de defunto (*T. Erecta*). . . .
—DE DEFUNTO DO GRANDE — Cravo de defunto (*T. Erecta*).
—DE DEFUNTO DO MIUDO — Cravo de defunto (*T. patula*).
—DO PEQUENINO — Cravo de defunto (*T. patula*).
—DE DEFUNTO SINGELO — Cravo de defunto (*T. patula*).
—DE ESTUDANTE — Ciúmes de velha.
—DE PAU — *Tillandsia pulchella* Hoot. Bromeliácia ornamental, epífita e longa. Flos lineares; fls em espigas; fr capsular.
—DE TEMPERO — Cravo da Índia.
—DE URUBÚ — Couve cravinho e Borragem brava.
—DO CAMPO — *Wulffia stenoglossa* DC. Composta sarmentosa. Fos ásperas e ovalares; fls amarelas, em capítulos; frs agrupados — inflorescência globóide: polídrupa. Diurético. Verbesina glabrata Hk. Composta arbustiva, com fós lancioladas e denteadas, fls em capítulos, dispostos em corimbos e fr alado — aquênio.
—DO MATO — Congonha do rio e Coará bravo.
—DOS JARDINS — Cravo.
—DOS FLORISTAS — Cravo.
—FÉTIDO — Cravo da Índia e C. de defunto.
—GIROFLE — Cravo da Índia.
—JAPONÊS — Cravo de defunto (Indistintamente).
—MADRE — Quitoco.
—ODORIFERO — Cravo.
CRAVORANA — *Ambrosia americana*.
CRAVO TAGETES — Cravo de defunto (Indistintamente).
—TÚNICO — Cravo de defunto (Indistintamente).
CRECIUMA — *Vid Crissium*.

CREME VEGETAL — Abacate.
CREOLI, CREOLIM — Cruiil.

CREOULA — Cruiil.

CRESCIUMA — Vid Crissiuma.

CRINA VEGETAL — Barba de velho.

CRINDEUVA, CRINDIUVA — Trema micrantha Blum. Ulmácia arbórea, com os ramos pilosos. Fos ovalares e acuminadas; fls albas, esverdeadas e em cimeiras; fr drupa, aceita pelos animais. Córtez fibroso e adstringente; fos forrageiras. Sp. melifera.

CRISANDALIA — Produto do cruzamento dos Crisântemos e Dálias, notável pela beleza e proporções de suas inflorescências, bem como pelas muitas vars e híbridos assim obtidos.

CRISANTEMO — Chrysanthemum sinensis Sab e C. indicum L. Compostas sub arbustivas, apenas representativas das inúmeras variedades e híbridos, contaveis por milhares. São Ves. muito ornamentais, mormente pelas suas inflorescências, em belíssimos capítulos, que cambiam de tamanho, coloração e feitio.

— DA INDIA — Crisantemo (C. indicum).

CRISIUMA — Várias sps de Gramíneas dos Gés Arundinaria, Chusquea e Olyra, de colmo lenhosa, erectas ou sarmentosas, do tipo das Tiquaras e Taquarias.

CRISTA DE GALO — Celosia cristata L. Amarantácia ornamental, ereta e sub arbustiva, facilmente caracterizada pelas vistosas inflorescências, em espigas espalmadas, que, geralmente encardadas, usam apresentar outras cores. Amaranthus gangelicus L. Do mesmo porte e Fa da sp precedente, com fos largas elípticas e comíveis e fls em longas espigas. Algumas de suas vars, como a melanolicus, são ornamentais. Heliotropium foetidum DC. Borráginácia ruderal e sub arbustiva, com fos oblongas e escabrosas, fls em espigas escorpióides e fr drupáceo insignificante. Anti reumatismal. Tem ainda o mesmo apelido o H. curassavicum L. do mesmo tipo da sp precedente.

— DE GALO CHORONA — Veludo vermelho.

— DE GALO FEDORENTA — Fedegoso e mais cabível à Crista de gallo (H. foetidum).

— DE GALO DO PERU — Acalifa e Rabo de macaco.

CRIVIRI, CRIVIRI — Curirí.

CRIXIUMA — Vid Crissiuma.

CROA — Gravatá e especialmente o Melão caboclo.

CROATA — Gravatá (Indistintamente).

CRONHA-CRIS — Esponjeira.

CROTALÁRIA — Cascavelreira.

— MARACÁ — Cascavelcira.

CROTON — Croton variegatum L. Sub arbustos, arbustos ou arboretas ornamentais, são conhecidas por esse apelido e bem assim outras sps campestris, como o Marmelo, o Vellame, da mesma Fa. As ornamentais, muito cultivadas, singularizam-se pelo colorido variado das fos. São Euforbiáceas.

— DAS MOLUCAS — Nogueira.

— DOS JARDINS — Croton (C. variegatum).

CRUÁ — Melão caboclo.

CRUAPÉ VERMELHO — Cipó cururu.

CRUATINA — Melão caboclo.

CRUILÍ — Mouriria guianensis Aubl. Melastomácia arbórea, com fos ovalares e coriáceas, fls amarelas e fr bacáceo édula, lembrando o Café. Madeira de lei; tanígera.

CRUZ DE MALTA — Jussiaea pilosa HBK. Enoterácia erbácia, ercta e pilosa. Fos longo lancioladas; fls axilares, de 5 a 6 pétalos; fr capsular coroado. Matéria corante; adstringente. J. repens L. Sp hidrófila, munida de pseudo flutuadores esponjosos. Fos ovalares ou espalhadas; fls amarelas e solitárias; fr capsular. J. suffruticosa L. Outra sp do mesmo Gé, arbustiva, de longas e estreitas fos, com fls solitárias, de 4 pétalos amarelos e fr cápsula, marcado de costelas.

CRUZEIRINHA — Cipó cruz.

CRUZEIRO — Chapeu de Napoleão.

CUAMBRI — Carrapicho de agulha.

CUAMBU — Carrapicho de agulha.

CUARANA — Coerana (Indistintamente).

CUAXINGUBA — Gameleira (Lombrigueira).

CUCA — Nôz de colá.

CUCURA — Tararanga preta.

CU DE CACHORRO — Amarelinha.

CUGUAÇU MIRIM — Alpim.

CUIA, CUIEIRA — Coité.

— DE MACACO — Couroupita ientula Mier. Lecitidácia arbórea, do

mesmo tipo da Sapucáia. O apelido cabe a todas as Sapucáias e, segundo C. Tor., ao Chapeu de frade.

— DO BREJO — *Styrax camporum* Pohl. Estiracácia arbórea, ornamental e aromática. Fos lanceoladas e coriáceas; fls campanuladas, em cachos axilares; fr drupa. Segregava resina, sucedânia do Incenso.

CUIARANA — Pau pereira.

CUIA VERDE — Coité.

CUIETÉ — Coité.

— ACU — Cardamomo (*R. occidentalis*).

CUIPEUNA — Quaresmeira.

CUIRANA — Coerana.

CUJAMARIOBA — Fedegoso.

CUMACURANA — Angelim e ssp. afins.

CUMANÁ — Sapucainha.

CUMANÁ, CUMANAN — Cumaná.

CUMANDATIA — Mangalá.

CUMARE — Imburana de cheiro.

CUMARI — *Astrocaryum vulgare* M. Palmácia esbelta, de espique alto, anelado e armado. Fos compostas, penadas e espinhosas; fls em espigas, cobertas de única espata, que dá vinho; fr drupa oleosa; as fos, bôas fibras. Tem o mesmo apelido a Pimenta cumari.

CUMARU — Imburana de cheiro. Os genuinos Cumarus são Leguminosas, do Ge Cumaruna e são encontradas na Amazônia.

— DA BAHIA — Imburana de cheiro.

— DAS CATINGAS — Imburana de cheiro.

— DO CEARÁ — Imburana de cheiro.

— DO NORDESTE — Imburana de cheiro.

CUMBARU — Cumaru (Indistintamente).

CUMBEBA — Mandacaru (Indistintamente).

CUMBERA — Mandacaru (Indistintamente).

CUMBUCA — Sapucáia.

— DE MACACO — Sapucáia.

CUNABI, CUNAMBI — *Ichthyothere conabi* M. Composta erbácia, aromática e tóxica, para pequenos animais. Fos ovalares, acuminadas e serrilhadas; fls em capítulos globoídes; fr. aquênio. Resinífero. Tem igual nome o Conambi.

CUNANA, CUNANAN — *Euphorbia phosphorea* M. Euforbiácia xerófila, arbustiva, cactiniforme e áfila. Ramos abundantes, eretcos e clorofílicos. Fosforescente pelo atrito dos ramos; lactífera.

CUNANANSINHO — Var de Cunana de tamanho menor e com os ramos mais delgados.

CUNDURANGO — *Mikania myriocaphala* DC. Composta sarmentosa, de ramos canelados e pilosos. Fos ovalares e acuminadas; fls em capítulos, de papus encarnado, dispostas em paniculas; fr aquênio. Algumas ssp. congêneres são conhecidas pelo mesmo apelido, como a *M. laevis* DC., muito afim.

CUNDURÚ — Condurú.

CUPAI — Copaiba.

CUPANA — Guaraná.

CUPIEIRA — Caruru bravo.

CUPIUBA — Copaiba.

CUPUAÇU — *Theobroma ovatifolia* DC. ou *T. bicolor* H e Bonpl. Esterculiácia arbórea e sucedânia do Cacau. Fos amplas, alternadas e luzidias na face dorsal; fls encarnadas e em cachos; fr capsular, como o Cacau. *T. grandiflorum* Schum. Sp. congênero, do mesmo tipo, porém mais alta e elegante.

CURATÁ — *Coccoloba cordifolia* Meis. Poligonácia arbustiva, ramosa, de fos largas, arredondadas e abundantes, fls em cachos e fr báculo. Tem esse nome o Gravatá.

CURA TOMBO — Cipó suma.

CURAUÁ — Ananáz do mato.

CURCUMA — *Cucurma longa* L. Gengiberácia erbácia. Fos amplas e longo elípticas; fls em espigas de longa raque; fr cápsula. Seu rizoma principal é alongado e, com os demais, fornece amido, essência e matéria corante.

CURÍ — Pinho do Paraná.

CURIA — Mentrasto.

CURINDIBA — Crindeuva.

CURIURÍ — *Mourilia caulinflora* DC. Melastomácia alta, com fls longo ovalares e acuminadas, fls albas e caulinares e fr baga.

CURRÍ — Pitombo.

CURRALEIRA — *Euphorbia pilulifera* L. Euforbiácia erbácia e ruderal. Fos elípticas e opostas; fls em glomérulos axilares; fr cápsula. Sp. lactífera, anti venéria e anti sifilítica. *Croton antisyphiliticus* Mu. e Arg. e o *C. landianus* M. e Arg. com muitas vars. entre

as quais a bahiensis. São esp. da mesma Fa da descrita, com a qual têm alguma afinidade.

CURUÁ — Melão caboclo.

CURUANHA — Curunha.

CURUBA — Cipó imbé e Corindiba.

CURURÁ — Melão caboclo.

CURUIRÍ — Pitombo.

CURUNDEUVA — Aroeira do campo.

CURUNHA — *Dioclea edulis* Kuhlm.
Leguminosa, sp nova, barmentosa,
trifoliada, corola papilionácia. A
polpa de suas vagens — 2 cent de
longa — esverdiada, é comível.

CURUPAI, CURUPAIBA, CURUPARI — Angico do campo.

CURUPAIRÉ — Angico.

CURURÚ, CURURÚ-APÉ — Cipó
cururú (*P. pinnata*).

CUSCUTA — Cipó chumbo.

CUTIA — Jaborandi.

CUTIUBA — Sucupira.

CUTUAJÉ — Pau concha.

CUTUBEA — Fel da terra.

CUTUCAEM, CUTUCANHEM — Pau
concha.

CUURAQUAM — Pau Brasil.

CUVATAN — Cambatã.

CUVITINGA — Couvetinga.

D

DÁLIA — *Dahlia variabilis* Desf. Composta sub arbustiva ou erbácia, universalmente cultivada pelo grande valor decorativo. Ras tuberosas: cau erecto; fos partidas, recortadas ou denteadas; fls em capítulos, cambiando de tamanho, forma e coloração de seus elementos — alvos, corados ou multicolores — consoante as vars, que orçam por milhares.

—**CACTO** — Crisandália.

—**CRISANTEMO** — Crisandália.

—**DOS JARDINS** — Dália.

DAMA DA NOITE — Coerana.

—**DO LAGO** — Baroneza (*E. azurea*).

DAMBRE — Cipó cruz verdadeiro.

DAMIANA — *Turnera diffusa* Willd. Turnerácia arbustiva, pilosa e aromática. Fos pequenas, ovalares e denteadas; fls amarelas; fr cápsula. Adstringente, diurética, estimulante, expectorante e laxativa.

DANDÁ — *Cyperus longus* L. ou *C. rotundus* L. (?) Ciperácia sub arbustiva, prolífica e hidrófila. Haste cilíndrica, fistulosa e sem nós; fos atrofiadas, no extremo da haste, formando com as espigas único verticilo. Suas tuberas aromáticas servem para perfumar a roupa.

—**ACU** — Dandá. O qualificativo serve para diferenciar do Capim dandá, de menor porte.

—**AFRICANO** — Dandá.

—**CHEIROSO** — Dandá.

—**DO BRASIL** — Dandá.

DARTRIAL — Mata pastão.

DATILERA — Tâmara.

DEDAL — Pacari.

—**DE DAMA** — Quatro patacas e outras Alamanandas. Vid Fl de São João.

—**DO MATO** — Pacari.

DEDALEIRA — Pacari.

—**AMARELA** — Pacari.

—**PRETA** — Pau terra.

DEDALEIRO PRETO — Pau terra.

DÉDÉ — Dendê.

DEDO DO DIABO — Aveláz.

DENDÊ, DENDEZEIRO — *Elaeis guineensis* L. Palmeira robusta, per-

pendicular, alta, sub espontânea e pouco exigente. Fos compostas pinadas; fls em espessas e volumosas espigas; drupas amarelas, roxas, verdes e vermelhas, de albumen oleoso. O pericarpo dá o "azeite de Dendê", também chamado "de cheiro" ou "de palma". As sementes, além do óleo, são forrageiras.

—**BRASILEIRO** — Dendê. Impróprio, pois a sp é africana.

—**DA COSTA** — Dendê e impropriamente o Borasso.

—**DE PAPAGAIO** — Dendê.

—**DO PARA** — Dendê. Var conhecida por *Elaeis melanococcus* Gaert.

—**PERIQUITO** — Dendê.

—**SOMBRA** ou **DE SOMBRA** — Dendê.

DENTE DE LEÃO — *Taraxacum officinale* Web. Composta erbácia, rizomatosa, lactifera, forrageira e adaptável a todos os climas. Fos radicantes, longas e incisas; fls em belos capítulos, sobre longa fuste. Fos anti escorbúticas, depurativas, febrifugas e tónicas

—**DE CAO** — Aveláz.

DENTELÁRIA, DENTILÁRIA — Emilia.

—**DO CABO** — Emilia.

DIARINHO — Folha da Costa.

DIADEMA — Coroa de Moçambique.

—**REAL** — Coroa de Moçambique.

DIAMANTINA — Sempre viva dos gerais.

DIAMBA — *Cannabis sativa* L. Moxicácia sub arbustiva ereta e cosmopolita. Fos palmatinérviadas e pilosas; fls dióicas; fr aquênio oleoso. Fibras texteis, para corduaria. Todas as suas partes são tóxicas e narcóticas.

DICORI, DICURF — Nicurá.

DIDI DE PORTEIRA — Erva mijona.

DILENIA — Flor de abril.

DINHEIRO EM PENCA — Pega rapaz.

DIRIJO — Diamba.

DISCIPLINA — Purga de carijó (*C. espinosa*).

- DE FREIRA — Cauda de raposa (*A. caudatus*).
 —DE RELIGIOSA — Cauda de raposa (*A. caudatus*).
DITEQUE — Açafrão.
DOCE-AMARGA — Maria preta (*S. dulcamara*).
 —LIMA — Cedron.
DOIS AMIGOS — *Euphorbia splendens* Bog. Euforbiácia sub arbustiva, espinhosa e esgalhada. Fos espatuladas e pequenas; fls com dois pétalos encarnados e soldados. Ornamento.
 —AMORES — Dois amigos e Sapatinho judeu.
 —IRMAOS — Dois amigos.
DOMBÉA — Astrápea.
DOM BERNARDES — Douradinha do campo.
DOMINGUINHA — Coerana.
DONA JOANA — Cega olho.
DORME MARIA — Sensitiva.
 —DORME — Sensitiva.
DORMIDEIRA — Sensitiva e especialmente a Papoula.
DOURADA — Douradinha e Gritadeira.
DOURADÃO — Gritadeira.
DOURADINHA — *Lindernia diffusa* Wett. Escrofulácia erbácia, prostrada e invasora. Fos ováloares fls solitárias e fr capsular. Anti febril, amarga e diurética. *Asplenium radicans* L. Polipodiácia rizomatosa, de longas fos sagitadas, que podem se enraizar. Possivel-

mente outras sps do mesmo Ge de Polipodiáciias: *A. abscissum* Willd e *A. auritum* Sw., ambas rizomatosas e semi erectas. Ainda com o mesmo apelido algumas Gritadeiras e Samambaias.

- DO CAMPO — *Lindernia crustacea* Bth. Escrofulácia erbácia e ramosa. Fos cordiformes; fls axilares e solitárias; fr capsular, com muitas sementes. Diurética, emética e laxativa. Ainda, da mesma Fa, a *Waltheria communis* S. R. Sp arbustiva, ornamental, com o aspecto de Malvácia. Fos oblongas e pilosas; fls abundantes e axilares; fr capsular. Diurética por excelência, peitoral e sudorífica.
 —DO PARA — Douradinha do campo (*L. crustacea*).
 —GRANDE — Gritadeira.
 —FALSA — Muricí guaçu.
DOUTOR — Cipó almêcega.
DRAGAO FEDORENTO — Timbó manso.
DRAGOEIRO — Árvore do dragão.
DRAGONA — *Marcgravia polyantha* Delp. Marcgraviácia sarmentosa, com fos longo elípticas, fls abundantes, em cachos, e fr capsular coroado.
DRAGONEIRO — Árvore do dragão.
DUAS AMIGAS — Dois amigos.
DULCAMARA — Maria preta (*S. dulcamara*).
DULCINIA — Dandá.
DURIGO — Diamba.

E

ÉBANO VERDE — Ipé amarelo.

ÉGRIO — Agrião de lagoa.

EGUARÁ — Cana frecha.

ELEMI, ELEMIEIRA — Almêcega (Indistintamente).

—DO BRASIL — Almêcega (P. leicaria).

ELOENDRO — Espirradeira.

EMA — Canela de ema.

EMBAUBA, EMBAUVA — Umbau-
ba.

EMBERIBA, EMBIRIBA — Biriba,
Beribá.

EMBIRA — Designação de várias
espécies pertencentes a Fas diferentes:
Malváceas, Esterculiáceas, Timeliá-
cias e, especialmente, Anonáceas e
Leciditáceas, todas fornecendo, do
cortex, fibras têxteis, mormente
para corduaria. Servem de tipo a
Xylopia brasiliensis Spreng e a X.
sericea, com as características da
Pindaiba.

—**BARRIGUDA DO SERTÃO** —
Pindaiba.

—**BRANCA** — Imbiruçu. Impreciso
por ser conferido ao Pau de jangada,
à Mamorana e à *Daphnopsis brasiliensis* Taub., que é uma Timeliácia arbórea, com fibras têx-
teis.

—**DE ARATICUM** — *Rollinia sylva-
tica* M. Anonácea arbórea, com
flos agudas e tomentosas, na pagina
dorsal, fls carnosas e fr drupáceo.
Lenho alvo e mole; febrífugo e
peitoral. Provavelmente outros Ara-
ticuns estão no mesmo caso, no to-
cante suas fibras para corduaria.

—**DE CAÇADOR** — Pindaiba.

—**DE JEZUITIBÁ** — Jequitibá.

—**DE MALVA** — Guaxima.

—**DE PINDAIBA** — Pindaiba.

—**DE SAPUCAIA** — Sapucáia.

EMBIRATANHA — Barriguda, Ma-
morana e Pindaiba. (Impreciso).

EMBIRA VERMELHA — Embira (X.
sericea).

EMBIREMA — Embira (X. sericea).

—**BRANCA** — Embira (X. brasilien-
sis).

EMBIRITI — Munguba (B. mun-
guba).

EMBIRÚ — Mutamba.

EMBIRUCÚ — Imbiruçu e Mamora-
na (Impreciso).

EMRUIA — Denominação de espes das
Ges Nectandra e Ocotea da Fa das
Lauráceas, também conhecidas por
Canelas, e as Anonáceas das Ges:
Guatteria, Rollinia e Xylopia. Ser-
ve de exemplo a *Nectandra nitida*
Nees; arboréta ornamental,
com flos elípticas, fls aromáticas e
fr baga. Córtez aromático; madei-
ra de lei.

—**AMARELA** — Embúia (N. nitida).

EMBURANA, EMBU-RANA — Im-
burana. Emburana talvês melhor
grafia.

EMBIREMBO — Tipi.

EMILIA — *Plumbago capensis* Thog.
Plumbaginácea arbustiva, ramosa e
ornamental. Flos oblongas; fls azul
claro, em abundantes espigas. Or-
namental.

EMPATA CARREIRA — Juiz de paz.
ENDRO — Cominho.

ENGÁ — Ingá.

ENJUÁ — Juá, Juazeiro.

ENQUIRÍ — Maçaranduba.

ENSACADINHA — Chumbinho.

ENTRADA DE BAILE — Mimo do
céu.

ENVIRA — Embira.

ENVIREIRA DO CAMPO — Mu-
tambo.

ENXERTO DE PASSARINHO — Er-
va de passarinho.

ENXOTA — Ivitinga. !

ENXUGA — Erva poca.

EPIDENDRO — Boca de leão (Ape-
lido injustificável).

EQUINOCISTES — *Echinocystis mu-
ricata* Gogn. Cucurbitácia gavinho-
sa, com flos lobadas, fls unisexua-
das e hagas. Ornamental.

ERAÍ — Castanha do Pará.

ERIRIBÁ — Potomuú.

ERITROCHITON — *Erythrociton
brasiliensis* Nees. Rutácia arbórea
sempre flores e ornamental. Flos
lançoladas e fls encarnadas.

ERVA AMBROSIA — Mastruço (C.
ambrosioides).

- ANDORINHA ou DE ANDORINHA — Curraleira.
- ANIL — Anil (Impróprio por ser sub arbusto).
- AZEBRA — Babosa.
- AZEDA — Begonia scida V. Begoniácia erbácia, de folhas ovalares e palminérvias, fls róseas e fr capsular.
- BABOSA — Babosa.
- BALIEIRA — Maria preta (*C. curassavica*).
- BOTAO — Eclipta alba Hass. Composta erecta e ruderal. Flos simples; fls em pequenos capítulos eretos; fr aquênio, cicatrizante. A seiva tinge os cabelos.
- BUGRE — Chá de bugre.
- CANCROSA — Maiteiro.
- CAPAROSA — Caparosa.
- CAPITAO — *Hydrocotyle umbellata* L. Umbeifera semi erecta e estiolhosa. Flos palmatinérvias e creneladas; fls em umbelas, longo pendiculadas; fr diaquênio. Diurética e anti reumatismal. Com o mesmo nome, e quase os mesmos caracteres, a *H. pusilla* Rich.
- CAPITAO DA MIUDA — *Hydrocotyle leucocephala* Cham. Do mesmo tipo da Erva capitão.
- CIDREIRA — *Melissa officinalis* L. Labiada sub arbustiva; em touceiras. Flos simples e aromáticas, entrando na confecção da "Água de melissa"; fls em cimeiras. Estomáquica e calmante. O apelido tornou-se extensivo a certas Verbenáceas.
- CIDREIRA DO MATO — Cidra, Cidreira do mato.
- CIDREIRA DOS CAMPOS — Cidra, Cidreira do mato.
- COENTRINHA — Cenoura.
- COLEGIO ou DE COLEGIO — Fumo bravo (*E. scaber*).
- CONTEIRA — Bananeirinha de jardim.
- CONTRA COBRAS — Erva botão.
- CONTRA VERMES — Catinga de mulata (*T. vulgaris*).
- COUVINHA — Couve eravinho.
- CRUZ — Lombrigueira.
- CURRALEIRA — Curraleira.
- DA AMÉRICA — Tintureira (*P. decandra*).
- DA COSTA — Angélica de rama e especialmente a Folha da Costa.
- DA FORTUNA — Folha da Costa.
- DA GUINÉ — Tipí e, impropriamente, o Capim Guiné, que não é erbácia.
- DA MORTE — Diamba.
- DA PÁSCOA — Azedinha.
- DA PONTADA — São Gonçalinho, Impróprio pois não é erbácia.
- DA RAINHA — Fumo.
- DA TOUPEIRA — Trombeta roxa.
- DA TRINDADE — Amor perfeito.
- DAS BERMUDAS — Mate-me embora.
- DAS COBRAS — Erva de Santa Luzia e Mastruço (*C. ambrosioides*).
- DAS CRIANÇAS — Agrião do Brasil.
- DAS FERIDAS — Emilia.
- DAS LAVADEIRAS — Erva Macaé.
- DAS LOMBRIGAS — Mastruço (*C. ambrosioides*).
- DAS SERPENTES — Guaco.
- DE ALHO — Tipí.
- DE AMOR — Resedá e especialmente o Trevo (*T. polimorphum*).
- DE ANIL — Vid Erva anil.
- DE ARRUDA — Arruda. Impróprio, pois é sub arbusto.
- DE AZEDRA ou DE AZEBRE — Babosa.
- DE BICHO — Capicoba (*P. acre*). Mastruço e outras sps em condições de inseticidas.
- DE BOI — Azedinha.
- DE BUGRE — Chá de bugre e São Gonçalinho (Impróprio).
- DE CABRITA — Amarelinha (*T. alata*).
- DE CARDO — Cardo santo.
- DE CARDO AMARELO — Cardo santo.
- DE CASCABEL — Cascavel.
- DE CHUMBO — Cipó chumbo.
- DE CORRA — *Euphorbia serpens* HBK. Euforbiácia reptante e inculta. Flos elípticas, fls em cimeiras axilares e fr capsular. Passa por diurética e cicatrizante. Com o mesmo apelido: a Curraleira e a Rabugem de cachorro.
- DEDAL — Dedaleira (Pacari).
- DE EMPIGEM — Botão de ouro (*X. laxifolia*).
- DE ESTEIRA — Tabua. Impreciso, porque a sp é sub arbustiva.
- DE JABOTI — Aperta ruído.
- DE JOÃO VENÂNCIO — Estramônio ou Trombeta, que deixam de ser erbáciros.
- DE LACA — Tintureira (*P. decandra*).
- DE LAGARTO — Erva silvária e impropriamente o São gonçalinho.

- DE LAVADEIRA — Melão de S. Caetano, impropriamente à Erva Macaé ou Cordão de São Francisco.
- DE LEITE — Arrebenta cavalo.
- DE LOUCO — Erva do diabo.
- DE MACAÉ — Erva Macaé.
- DE MALAGA — Agrião do Brasil.
- DE NOIVA — Camapu.
- DE NOSSA SENHORA — Parreira brava.
- DE PAINA — Cega olho.
- DE PANTANO — Chapéu de couro (*E. macrophyllum*).
- DE PASSARINHO — *Struthanthus vulgaris*, *S. brasiliensis* Lamk. Lorantáceas epífitas e semi-parasitos. Ras longas, munidas de sugadores da seiva bruta de certas plantas; fos espessas; fls em cachos; fr drupa, apreciada pelos pássaros, contendo visgo. Além de outras sps dêsse e de outros Ges da mesma Fa, merece citado as do Gc *Paltacanthus* como o *P. dichrous* M. Erecto, com fos coriáceas e belas fls axilares, em pseudo cimeiras — encarnadas, coccineas, carmesins ou rubras, consoante as vars.
- DE PIPÍ — Tipí.
- DE PORTUGAL — Fumo.
- DE RATO — *Palicourea longepedunculata* Muel. Rubiácea sub arbustiva e inculta. Fos longo elípticas e opostas; fls encarnadas, em panículas; baga ovóide. Poderoso tóxico para o gado, devido à saponina. Tem o mesmo apelido o Capitão e o Pau de rato.
- DE RATO CASEIRA — Cega olho.
- DE RATO GRANDE — Erva de rato e algumas sps congêneres.
- DE RATO VERDADEIRA — Erva de rato.
- DE RINHO — *Hyptis* sp. Labiada.
- DE SANGUE — Lingua de vaca.
- DE SANTA CATARINA — Bonina.
- DE SANTA CRUZ — Fumo.
- DE SANTA LUZIA — Curraleira e Lentilha d'água.
- DE SANTA MARIA — Mastruço (*C. ambrosioides*).
- DE SANTA TEREZA — Erva silvinia.
- DE SÃO CAETANO — Melão de São Caetano.
- DE SÃO DOMINGOS — Cipó de gato.
- DE SÃO FRANCISCO — Erva Macaé.

- DE SÃO JOÃO — Mentrasto.
- DE SÃO MARTINHO — Sauvageria erecta L. Ocnácia de pequeno porte. Fos alternas, de bordos serrilhados, sobre cau encarnado; fls róseas axilares; fr drupa. Diurética.
- DE SÃO MIGUEL — Casadinha.
- DE SAPO — *Cordia verbenacea* DC. Verbenácia de fos longo elípticas, acuminadas e fls em espigas terminais. Ainda, com tal apelido, algumas Begoniáceas, como a Azeada do Ilhéus.
- DE SAPO VERMELHA — Begónia sanguinea.
- DE SARACURA — Erva azeda.
- DE SOLDADO — Jaborandi (*P. jaborandi*).
- DE TITÓ — São Gonçalinho. Impróprio pois a sp é arboreta.
- DE TOSTAO — Erva tostão.
- DE URUBÚ — Milhomem (Indistintamente). Impróprio, pois trata-se de trepadeiras muito desenvolvidas.
- DE VEADO — Fumo bravo.
- DO AMOR — Trevo (*T. poimorphum*). Denominação também da Erva do diabo.
- DO BICHO — Feijão da terra.
- DO BREJO — Chá de campanha e Chapéu de couro. Apelido que deve ser despresado, pois se ajusta a inúmeras sps.
- DO CANADÁ — Tintureira (*P. scandra*).
- DO CARDO AMARELO — Cardo santo.
- DOCE — *Pimpinella anisum* L. Umbelífera cultivada. Fos fendilhadas; fls albas, em amplas umbelas; frs acre-doces e aromáticos, usados em culinária. Carminativa.
- DO CHA — Vassoura de religião.
- DO DIABO — *Plumbago scandens* L. Plumbaginácia sarmentosa. Fos ovalares e alternas; fls em espigas; fr cápsula. Ra cáustica e tóxica. O Estramônio tem o mesmo apelido.
- DO FIGADO — Serralha.
- DO GENTIO — Gravatá (Indistintamente).
- DO GRÃO PRIOR — Fumo.
- DO MEIO DIA — Vassoura de religião.
- DO MÉXICO — Mastruço (*C. ambrosioides*).
- DO PANTANO — Chapéu de couro.
- DO PARÁ — Capim do Pará.

- DO PEKÉ — Camapú.
 —DO SERTÃO — Pimenta de galinha.
 —DO SONHO — Diamba.
 —DO TABACO — Fumo.
 —DOS BARDONOS — Barba de velho.
 —DOS CACHOS — Tintureira (*P. decandra*).
 —DOS CACHOS DA INDIA — Tintureira (*P. decandra*).
 —DOS CANCROS — Tintureira (*P. decandra*).
 —DOS CARPINTEROS — Rivina humilis L. Fitolacácia arbórea, com fós simples, fr. cápsula, fornecendo tátaria corante para culinária e industrial. Há outras esp., com o mesmo nome.
 —DOS FLITICEIROS — Estramônio.
 —DOS FERUDOS — Albará e Coquinho.
 —DOS MÁGICOS — Estramônio.
 —DOS MOUROS — Resedá. Impróprio, pois a sp é arboreta.
 —DOS PAMPAS — Capim dos pampas.
 —DOS PEGAMAÇOS — Carrapicho de carneiro.
 —DOS ROSARIOS — Lágrimas de Nossa Senhora.
 —DOS SANTOS FILHO — Cordão de fraude.
 —DOS SUMIDOUREOS — Gervão.
 —DOS TINHOSOS — Bardana.
 —DOS VERMES — Losna.
 —DOS ZANGÕES — Erva Macaé.
 —DUTRA — Cipó cabeludo (*M. hirsutissima*).
 —ELEFANTE — Capim elefante.
 —FEDEGOSA — Fedegoso.
 —FEDORENTA — Coará bravo. Fedegoso, dentre outras esp., donde a imprecisão do apelido.
 —FETICEIRA — Almêcega (Indistintamente).
 —FELPUDA — Cipó chumbo.
 —FERRO — Aguaraquinhá e Bucha (*L. cylindrica*).
 —FORMIGUEIRA — Mastroço (*C. ambrosioides*).
 —GERVÃO — Gervão.
 —GORDA — Brilhantina (*P. microphilla*).
 —GIROSSA — Fumo bravo.
 —GUINE — Tipi.
 —HELOISA — Cedron.
 —IMPACIENTE — Beijo de fraude.
 —LAGARTIXA — Erva silvínia.
 —LANCETA — Botão de ouro e Erva botão.
- LOMBRIGUEIRA — Lombrigueira e Mastroço (*C. ambrosioides*).
 —LUIZA — Cedron.
 —MACAÉ — *Leonurus sibiricus* L. Labiada de caule quadrangular, fós opostas, fls de corola labiada, cheirando a "óleo de fígado de bacalhau". Amargo-tônica, aromática e anti febril.
 —MENINA — Marianinha.
 —MIJONA — *Commelinia pohliana* Seub. Commelinácia erecta, ramosa, às vezes epífita. Fós longo lancioladas e invaginantes; fls azuis e espatuladas; fr capsular. Ornamento — orla de canteiros e hortões. Cicatrizante.
 —MILAGROSA — Gericó roxo.
 —MOCÓ — Pimenta de galinha.
 —MOURA ou MOIRA — Pimenta de galinha.
 —MOURA DO SERTÃO — *Cinnamomum axillare* Endl. Canelácia arbustiva. Fós espatuladas; fls axilares, em cachos; fr baga. Amargo-tônica, aromática, eupéptica e febrifuga.
 —MOURA TUBEROSA — Batata doce.
 —MULAR — Curraleira.
 —NÃO ME TOQUES — Bonina.
 —ERVANÇO — Velame do campo. Imprecoiso porque é conferida a outras esp.
 ERVA NOIVA — Camapú.
 —NOIVA DO PERU — Camapú.
 —PARA TODAS AS MOLESTIAS — Fumo.
 —PASSARINHA ou PASSARINHEIRA — Erva de passarinho.
 —PEPI — Tipi.
 —PICÃO — Carrapicho de agulha e outras esp., inclusive o Picão da praia.
 —POCA — *Vernonia scorpioides* Pers. Composta semi sarmentosa e inculta. Fós ovalares, acuminadas e alternas; fls em pequenos capítulos sobre raques escorpioides, agrupando-se estas em cachos; fr aquenio. Apresenta vars.
 —POMBINHA — Quebra pedra (*P. nigruri*).
 —POR EXCELENCIA — Diamba.
 —PREA — *Blanchetia heterotricha* DC. Composta asterácia, tida como excitante e também conhecida por Maria preta. A Erva poca tem idêntico apelido.
 —QUINA — Quina de raiz.
 —REAL — Alfavaca cheirosa.

- SAGRADA — Cambará — algumas sps — e particularmente o Fumo.
- SANTA — Dipladenja sancta DC. Apocinácia. Entre outras sps com o mesmo apelido, figuram o Fumo e o Mastroço (*C. ambrosioides*).
- SANTOS FILHO — Cordão de frade.
- SARACURA — Erva azeda.
- SILOINA — Erva silvinia.
- SILVEIRA — Erva silvinia.
- SILVINIA ou SILVINA — *Polypodium vaccinifolium* Lang. Polipodiácia que serpeia sobre o tronco das árvores. Talo piloso em forma de cordão achatado, onde se inserem, lateralmente, as pseudo folhas — frondes — longo elípticas.
- SILVÍNIA DA FOLHA GROSSA — *Polypodium percussum* Cav. Polipodiácia do mesmo tipo da sp precedente, apresentando fos mais espessas, verde escuras e luzidias, com 25 cent. Anti helmintica.
- TAPETE — Capim grama.
- TEREZA — Erva silvinia.
- TOSTAO — *Boerhavia hirsuta* Willd. Nictaginácia rasteira. Caudadoso; fos ovalares e assimétricas; fls em cachos difusos. Passa por diurética e contra os males do fígado. Tem o mesmo apelido o Barrigudinho.
- TROMBETA — Trombeta (Indistintamente). Impreciso; as Trombetas são arbustos ou subarbustos.
- TURQUEZA — Mondo.
- VENENOSA — *Dipladenia illustris* Muel. Apocinácia sarmentosa e especialmente tóxica para o gado.
- VINTEM — Pega pinto do miúdo.
- VIVA — Sensitiva.
- VOMIQUEIRA — Mastroço (*C. ambrosioides*).

ERVILHA — *Pisum sativum* L. Leguminosa sub arbustiva, trepadeira por gavinhas. Fos paripinuladas, cuja raque apresenta larga estípula na base e se transforma em gavinha na extremidade livre; fls de corola papilionácia; fr vagem. São conhecidas inúmeras var., adstritas à coloração das fls, dimensões, grau de ramificação da haste e, especialmente aos caracteres dos frs, muito saborosos e nutritivos.

ERVILHACA — *Dolichos labad* var. *albiflorus* (?). Leguminosa sarmentosa, ramosa, pouco exigente e muito produtiva. Trifólios; fls. albas em cachos erectos; fr vagem

achatada, com o feitio de Ervilhas tortas, comivel também em estado imaturo. Tem o mesmo apelido a *Vicia sativa* e outras sps.

- ERVILHA COME-SE TUDO** — Ervilha torta. O apelido serve para diferenciar esta var, em que toda a vagem pode ser comida quando imatura, das outras — "de descascar", nas quais só a semente se aproveita.
- COMUM — Ervilha.
- DA AMÉRICA — Jequiriti.
- DA ÍNDIA — Andu.
- DE ANGOLA — Andu.
- DE ÁRVORE — Andu.
- DE CHEIRO — *Lathyrus odoratus* L. Leguminosa erbácia e ornamental. Fos compostas; fls papilionárias, sobre longa raque, cambiando de coloração, de acordo com as vars. Pouco cultivada na Bahia.
- DE DESCASCAR — Todas as sps em que apenas se aproveitam as sementes.
- DE PATER NOSTER — Jequiriti.
- DE SETE ANOS — Andu.
- DO CONGO — Andu.
- GALEGA — Ervilha.
- TORTA — *Pisum sativum* L. var. *platicarpum* Ser. Do mesmo tipo da Ervilha, porém com vagens achatadas e comíveis integralmente ainda imaturas — "Ervilha come-se tudo".
- ESCARIBIOSA** — Saudades.
- DOS JARDINS — Saudades.
- MÁRITIMA — Saudades.
- VIUVA — Saudades.
- ESCADÁ DE JABOTI** — Cipó escada e outras Leguminosas do Ge *Bauhinia* como a *B. rubiginosa* Bong. Árvore ornamental, com fos simples e lobadas, fls albas, abundantes e em cachos e frs — vagens coriáceas.
- DE MACACO — Cipó eseada (*B. langsdorffiana*).
- DO CÉU — *Blechum brasiliensis* Desv. Polipodiácia arborescente, com longas frondes pinadas, do topo das fos de Palmeiras.
- ESCALDAMÃO** — Lírio do brejo.
- ESCAMÔNEA DA AMÉRICA** — Batata de purga.
- ESCAROLA** — Vld Chicória.
- ESCORREGA** — Sete sangrias.
- ESCOVA DE MACACO** — Pau de jangada. Cabe melhor ao Pente de macaco.
- ESCOVINHA** — Quina de raiz.
- ESCRUMILHA** — Norma.

ESFREGÃO — Bucha (*L. cylindrica*).

ESPADA DE OGUM — Sansevieria zeylanicae Weil. Liliácia rizomatosa, perene, robusta, reconhecível pelas longas fos — metro — radicantes, espessas, com estriações transversas e fibrosas — fibras fortes e elásticas, embora duras, e alvas. Fls em longas espigas. As vars *guineensis* e *longiflora*, têm fos largas e enroladas, a *cylindrica*, fos cilíndricas. Além das fibras, todas são ornamentais, especialmente a *S. laurentii*, de fos orladas de amarelo.

—**DE SÃO JORGE** — Espada de ogum.

ESPADANA — Palma de Santa Rita.
—**DOS MONTES** — Palma de Santa Rita.

ESPARGO DE JARDIM — Bambu chinês.

—**FLUMOSO** — Bambu chinês.

ESPARTILHO — Capim rabo de raposa (*S. geniculata*).

ESPARTO DA TERRA — Capim bambu.

—**PEQUENO** — Capim rabo de raposa (*S. geniculata*).

ESPATÓDIA — *Spathodias campanulata* Beau. Bignonácia arbórea, copuda e muito ornamental, pelas suas fls de grandes coroas encarnadas; fos compostas. Para jardins e parques.

ESPELINA — Purga de caboclo.

—**FALSA** — Clitoria guyanensis Bth. Leguminosa erbácia com trifólios lineares, fls alvas ou encarnadas. Forrageira e diurética.

—**VERDADEIRA** — Purga de carijó (*C. espejina*).

ESPERTA — Guairana (*Tabernaemontana*).

ESPIGÉLIA — *Espigelia brachystachya* Prog. Loganiácia sub arbustiva, rizomatosa e reptante, com fos lanceoladas, fls em espigas e fr. capsular. O apelido é impreciso; por caber às sps do mesmo Ge e à Lombrigueira.

ESPINAFRE — *Spinacia oleracea* L. Quenopodiácia com o feitio da Couve. Fos radicantes, carnosas, sagitadas e amplas, constituindo reputada hortaliça; fls. unissexuadas. A'gumas sps e vars. Usado nas moléstias do fígado. Pouco cultivada na Bahia.

—**DAS ÍNDIAS**. — Tintureira.

—**MACIO** — Tintureira.

ESPINHA DE PEIXE — *Aranopus pulcher* Kuhl (?). Gramínea erbácia, erecta com fls invaginantes e fls em corimbo de espiguetas, no ápice de longa raque.

ESPINHEIRA SANTA — Maiteno.

ESPINHEIRO BRANCO — Tatajiba.

—**BRAVO** — Inúmeras sps armadas, de acúleos ou espinhos, geralmente conhecidas por outros apelidos. Além da Tatajiba, podem figurar, com esse nome certas Leguminosas: *Acacia martii* Bth., as Juremas e as Piptadenias — *P. laxa* Bth., *P. ramosissima* Bth., *P. trisperma* Bth e tantas outras.

—**DE AMEIXA** — Ameixa da Bahia.

ESPINHENTO — *Pileus setosus*.

Cactácia arbustiva ereta, com muitas arestas no caule e coberta de cerdas. Selvático.

ESPINHO BRANCO — Tatajiba.

—**CABEÇA DE BOI** — Juiz de paz.

—**DE AGULHA** — Carrapicho de agulha, *C. rastrello* e outras sps.

—**DE AMEIXA** — Ameixa da Bahia.

—**DE CARNEIRO** — Capim roseta, Carrapicho rusteiro e especialmente o Carrapicho de carneiro.

—**DE CARNEIRO DO GRANDE** — Carrapicho de carneiro.

—**DE CERCA** — Maricá.

—**DE CRISTO** — Coroa de Cristo (*P. australis*).

—**DE DEUS** — Maiteno.

—**DE ITALIANO** — Coroa de Cristo.

—**DE JERUSALÉM** — Rosa da Turquia.

—**DE JUDEU** — Coroa de Cristo.

—**DE MARICA** — Maricá.

—**DE SANTO ANTONIO** — Ora pro nobis.

—**DE ROSETA** — Carrapicho da praia e especialmente o Capim rosa.

—**DE VINTEM** — *Xanthoxylum rhoifolium* Lam. Rútacia arboreta, aculeada e frondosa. Fos imparipinuladas; fls em cachos e caulinares; fr baga oleosa. Lenho leve e duro. Amargo-tônico, eupéptico e febrífugo.

—**PRETO** — Ora pro nobis.

—**QUE DORME** — Sensitiva.

—**RAMOSO** — Espinho de vintem.

—**ROXO** — *Piptadenia polypetra* Bth. Leguminosa aculeada e pilosa. Fos compostas pinadas, do 2º grau, fls em espigas e fr vagens. Tanifera e resinifera. Lenho para carpintaria. Tem o mesmo apelido o Maricá.

ESPINILHO — Esponjeira.

ESPIRRADEIRA — *Nerium oleander* L. Apocinácia arboreta e mui decorativa. Fos longo lancioladas e ríjas; fls em abundantes cimeiras, amarelas na var *aurantium*, brancas na var *albiflora*, e roxa na *atropurpureum*. Sp lactifera, insectífera e tóxica.

ESPONJA — Esponjeira.

—VEGETAL — Bucha (*L. cylindrica*).

ESPONJEIRA — *Acacia farnesiana* Willd. Leguminosa robusta, ramosa e armada. Arboreta de fos compostas pinadas do 2º grau; fls esféricas, amarelas, aromáticas, em cachos axilares; fr vagem anegrada. Ornamental e adstringente; fls empregadas em perfumaria.

ESPORÃO DE GALO — Trcs Marias. (Somente as vars providas de espinhos).

ESPUMEIRA — *Alternanthera pilosa*. Amarantácia erbácia, com fos elípticas e acuminadas, fls albas e em glomérulos terminais.

ESTEFÂNIA — *Coboea scandens* Cav. Polemoniácia sarmentosa e com gavinhas. Fos pinadas; fls purpúreas, campanuladas e solitárias; fr capsular.

ESTEFANOTES — *Stephanotis floribunda* Brog. Asclepiadácia ramosa, sarmentosa, de muito crescimento. Fos elípticas, coriáceas e luzidias; fls albas, tubulosas, em cimeiras axilares. Ornamental.

ESTERCO DAS AVES — Erva de passarinho. (Indistintamente).

ESTORAQUE DA AMÉRICA — Cúia de brejo.

—DO CAMPO — Cúia de brejo.

ESTORAQUEIRO, ESTORAQUE —

Pamphilia aurea M. Estiracácia arbórea com longas fos elípticas, fls em espigas e fr drupáceo. Resina aromática sucedânea do Estorake e do Incenso. Tem idêntico apelido as sps congêneres — *P. ferruginea* e *P. ruinifera*.

—DO BRASIL — Estorakeiro (*P. aurea*).

ESTOTUQUE — *Epaltes brasiliensis* DC. Composta erbácia e ramosa. Fos lancioladas; fls em capítulos; fr aquênio.

ESTRAMONIO — *Datura stramonium* L. Solanácia erbácia, narcótica, tóxica e cosmopolita das zonas tropicais. Fos largas e dentadas; fls solitárias, tubulosas; fi-

cápsula elipsóide e espinesciente, com sementes oleosas. Das folhas, ricas em "daturina", alcaloide muito tóxico, preparam-se os conhecidos cigarros anti asmáticos.

—ARBORESCENTE — Trombeta branca.

ESTRELA — Margaridinha.

—AMAZÔNICA — Lírio eucarístico.

—DA REPÚBLICA — *Zigopetalum meleagris*. Orquídea epífita. Cau pseudo bulbo; fos distícas, ríjas e longas; fls amplas, carnosas, com invólucro branco na base, amarelo no centro e pintalgado nas margens. Sp rara.

—DE OURO — *Chrysanthemum segatum* L. Composta sub arbustiva e ramosa. Fos fendidas; fls em capítulos de flósculos e semielfósculos áureos; fr aquênio. Ornamento.

—DO CERRADO — Lírio eucarístico.

—DO EGITO — *Cosmos*.

—DO MATO — Lombrigueira (*S. anethelma*).

—DO NORTE — Lírio eucarístico.

ESTRIVEIRA — Ivitinga.

EUCALIPTOS — Mirtáceas do Ge Eucalyptus compreendendo mais de 500 sps, vars e híbridos. Geralmente são grandes árvores, robustas e de desenvolvimento rápido, recomendáveis por valiosas utilidades: troncos linchérios, fornecendo lenho para todos os misteres; fixadoras e dessecadoras do solo; melíferas e oleíferas; reflorestamento; para rumo das propriedades. Dentre as cento e tantas sps aclimadas no Brasil, destacam-se as seguintes: *E. globulus* Labl, o "rei dos Eucaliptos"; *E. citriodora* Hook, em virtude de suas fos fornecerem precioso ólio essencial, aromático e rico em cineol; *E. crebra* Muel., como ornamento; *E. obliqua* L'Heret; *E. robusta* Sm., sps umbrosas, ornamentais e florando durante meses — útil à criação de abelhas; *E. diversicolor* Muel, *E. amigdalina* Labl, pelo extraordinário crescimento; *E. gomphocephala* DC, pela excelente madeira, dentre muitas outras. São very rústicos e pouco exigentes.

—BRAVO — Arraindeira.

—LIMÃO — Eucalipto (*E. citriodora*).

EUCARIS — Lírio eucarístico.

FU E TU — Dois amigos.

EVI — Cajá manga.

EXTREMOSA — Norma.

F

FACÉ — Melancia.

FACHEIRO — Certas Cactáceas do Ge *Cereus*, armadas, xerófitas e de grande desenvolvimento. Figuram neste grupo os *Mandacarus* e o *Cereus scamosus* Guerk.

—**PRETO** — Facheiro (*C. scamosus*).

FACHO DE VIAJANTE — Candeia (Indistintamente).

FAIA — Pau concha e Lixeira.

FALSA IPECACOANHA — Ipeca bastarda.

—**ESPELINA** — Espelina falsa.

—**JALAPA** — Bonina.

FALSO AZOUGUE — Taiuá.

FANFÁ, FANFAN — Algodão do brejo.

FARINHA SECA — Ourates *castañefolia* DC. Ocnácia arboreta e ramosa. Fos elípticas e coriáceas; fls em umbelas; fr drupas. Lenho de segunda. Tônica e adstringente.

FARTURA — Híbrido do Milho com a Cana de açúcar e considerada var de Sorgo (*Capim massambará*). Os frs formam-se no extremo do colmo e de seus ramos.

FAVA — Denominação de muitas sps, de várias fns, especialmente Leguminosas, como a *Vicia faba* L.; trepadeira gavinosa, com trifólios e vagens comíveis quando verdes, ou suas sementes quando secas. Dessa sp são conhecidas inúmeras vars. O *Phaseolus lunatus*, nas mesmas circunstâncias, tem o mesmo apelido.

—**BELEM** — Fava (*P. lunatus*).

—**BRANCA** — Feijão de porco.

—**CAFÉ ou DE CAFÉ** — Mucuna (*M. pruriens*).

FAVACA — Alfavaca (Indistintamente).

FAVA CAVALEIRA — Rabugem de cachorro.

—**COCEIRA** — Mucuna.

—**CONTRA MAU OLHADO** — Guapuruuvá.

—**CUMANDÁLIA** — Mangalô.

—**DE ARARA** — Barbatimão (*D. gardneriana*).

—**DE BOLOTA** — Visgueiro.

—**DE EMPINGEM** — Feijão da praia.

—**DE SANTO INACIO DO BRASIL** — Fruto amargo e Nandiroba.

—**DE SUCUPIRA** — Faveira (*P. pubescens*).

—**DIVINA** — Sucupira e especialmente o Guapuruuvá.

—**DO SERTÃO DA BAHIA** — Umbú.

—**ELÉTRICA** — Chapéu de Napoleão.

—**LARGA** — Andu.

—**PARA DENTIÇÃO** — Guapuruuvá.

—**PURGATIVA** — Mucuna (*M. pruriens*).

FAVECA — Grossai.

FAVEIRA, FAVEIRO — *Pterodon pubescens* Bent. Leguminosa arbórea, com fos pinuladas, corola papilionácia e vagens oleosas e aromáticas. Córtox anti diabético; sementes diuréticas. Com o mesmo nome o Guapuruuvá e muitas outras sps.

—**AMARELA** — Faveira (*P. pubescens*).

—**DA BERLOQUE** — Visgueiro.

FAVEIRÃO — Visgueiro.

FAVEIRINHA BRANCA — Cana fistula (*C. multiflora*).

FAVELA, FAVELEIRA — *Cnidoscolus phyllacanthus* M. Euforbiácia arbórea das ratingas. Fos longas, de bordas irregulares; fls albas, em pequenos cachos axilares e terminais; fr cápsula édula. Seu látex urente, exacerbando a dor provocada pelos abundantes espinhos, das fos e dos ramos, é combustível, alimenta as candeias e é balsâmico — "Balsamo do vaqueiro". O gado come as fos e o córtex, os porcos as ras e os galináceos as sementes. Recomendam-se as vars *lobatus* e *repandus* Muel.

—**BRANCA** — Vinhático.

FAVINHA DE CAPOEIRA — *Taramnus uncinatus* Sw. Leguminosa trepadeira, com trifólios, fls em rácimos e vagens. Emoliente.

FAVORITO — Capim favorito.

FECHE A PORTA MEU BEM — Sensitiva.

- FEDEGOSO** — *Cassia occidentalis* L. Leguminosa sub arbustiva e incultta. Fos compostas; fr vagem longa e estreita, com sementes succédaneas do Café. Muitas utilidades, dentre as quais: anti febril, diurética, tónica e abortiva. Tem igual apelido a Crista de galo.
- BRAVO** — Crista de galo (*Heliotropium*).
- DE CAPOEIRA** — Fedegoso (*C. occidentalis*).
- DE PERNAMBUCO** — Crista de galo (*Heliotropium*).
- DO MATO** — *Cassia silvestre* V. Leguminosa arbustiva e ornamental, de fos compostas, fls em râcimos, amarelas e vagens chatas. Tem igual nome o Aguaraquinhá.
- DO PARA** — Borragem brava e Mata pasto.
- GRANDE** — Mata pastão.
- LEGÍTIMO** — Fedegoso.
- VERDADEIRO** — Aguaraquinhá e propriamente o Fedegoso.
- FEDORENTA** — Cipó cruz.
- FEIJÃO** — *Phaseolus vulgaris* L. Leguminosa erecta ou sarmentosa, apresentando inúmeras sps e vars, geralmente cultivadas pelo seu valor nutritivo. Aceltando-se, num critério geral, suas sementes, como elemento para classificação, têm-se admitido as seguintes vars: *Phaseolus vulgaris* L. var *compressus* DC, de sementes reniformes achata-das; *P. v.* var *ellipticus*, também reniforme, porém redonda; *P. v.* var *oblongus* Sav., de sementes cilíndricas; *P. v.* var *sphaericus* Sav., de sementes globôides. Há Feijões selváticos, ornamentais, sendo que muitos se recomendam pelo excelente paladar de seus frs, ricos em amiláceos e proteinas. A parte vegetativa, além de ser adubo verde, após a colheita, fornece azoto ao solo, absorvido da atmosfera pelas ras. Alguns são forrageiros. Grande quantidade é identificada apenas por nomes vulgares: anão, branco, caboclo, carapato, enxofre, manteiga, mulata gorda, mulatinho etc.
- ANDU** — Andu.
- CABELUDO** — Mucuna.
- CAFÉ** — Café dos navegantes.
- CARETA, CARITA ou CARITO** — Feijão frade.
- CHICOTE** — Feijão de metro.
- COVADO** — Feijão mulatinho.

- DA INDIA** — Mangalô.
- DA PRAIA** — *Sophora littoralis* Schr. Leguminosa sub arbustiva e ramosa. Fos compostas pinuladas; fls em cachos, amarelas; vagens longas e estreitas. As fos entorpecem as mandíbulas das saúvas. Tem igual nome a Batatarana.
- DE ÁRVORE** — Andu e Feijão da praia.
- DE BENGALA** — Mucuna preta.
- DE BOI** — Feijão da praia.
- DE CABRA** — Feijão de porco.
- DE CAVALO** — Feijão de porco.
- DE CORDA** — Feijão de macassa.
- DE FLÓRIDA** — Mucuna.
- DE FRADE** — Feijão frade.
- DE GUANDO** — Andu.
- DE GUISOS** — Cascavel.
- DE IMPINGEM** — Batatarana.
- DE MACASSA** — *Dolichos sesquipedales* L. Leguminosa sarmentosa, pouco exigente e produtiva. Trifólios; fls amarelas; vagens longas com sementes amarelas, comíveis secas ou imaturas.
- DE MASCATE** — Mucuna preta.
- DE MASSACAR** — Feijão de macassa.
- DE METRO** — *Vigna sesquipedalis*. Leguminosa trepadeira de bom desenvolvimento. Trifólio; fls albas; vagens de metro, cilíndricas e finas, comíveis imaturas.
- DE PORCO** — *Canavalia ensiformis* DC. Leguminosa sub arbustiva, robusta, ramosa, havendo uma var trepadeira. Trifólio, fls purpúreas, vagens longas e grossas, com grandes sementes alvas. É considerado mata pasto e adubo verde. Sementes tóxicas devido a presença do ac prússico.
- DE PORTO ALEGRE** — Feijão preto.
- DE WINDSOR** — Feijão de porco.
- DO MATO** — Feijão miúdo (*V. vexillata*).
- DO PERU** — Pinhão de purga.
- DO RIO GRANDE** — Feijão preto.
- ENCARNADO** — Feijão mulatinho.
- ESPADA** — Feijão de porco.
- ESPARGO** — Feijão de metro.
- FIDALGO** — Feijão mulatinho.
- FRADE ou FRADINHO** — *Dolichos monachalis* L. Leguminosa caracterizada pelas sementes miudas, manchadas e com olho preto, apresentando sabor sui generis muito apreciado. O Feijão frade, que tem sido estimado, sy diferente do Fra-

- dinho ha sido classificado como o *Phaseolus mesoleucus* Ser.
- GUANDU — Andu.
- HOLANDES — Feijão de porco.
- MASCATE — Mucuna preta.
- MAURÍCIO — Mucuna preta.
- MIUDO — Feijão frade ou F. fradinho, todavia o F. branco e a sp — *Vigna vexillata* L. — são Leguminosas com o mesmo apelido.
- MULATINHO — Var de Feijão (*P. vulgaris*) cor de café com leite, muito apreciada.
- PAULISTA — Feijão mulatinho.
- PRETO — *Phaseolus vulgaris* L. var. derassua. E' dos mais estimados, apesar da matéria corante negra que encerra. E' Leguminosa de arrancar.
- RAJADO — *Phaseolus vulgaris* L. var. *radiatus*. Difere dos outros Feijões pelas estriações de suas sementes.
- ROXO — Feijão mulatinho.
- SOJA — Soja.
- FEITICEIRA** — Dois amigos e Fedegoso.
- FEL DA TERRA** — Algumas sps identificadas por esse nome: *Gentiana centaurium* L. Gencianácia erbácia de cau quadrangular e sulcado, fos amplexicaule e fls em longas espiguetas. São tóxicas e febrífrugas, as extremidades floridas. *Exacum cubensis* Poep. e ainda da mesma Fa, destacadamente a *Cutubea splcata* Aubl. sub arbusto de fos retihas e opostas, fls em espigas e fr capsular; amargo-tônica e febrífruga. *Fumaria officinalis*, Fumaríacia. *Pteria fel-terrae* Lam, Escrofulácia. Juiz de paz. Quina de raiz.
- DE GENTIO — Purga de carijó (*C. esculenta*).

- FEITO ARBORESCENTE** — Samambáia aqua.
- CHORÃO — *Polypodium sub-augiculatum*. Polipodiácia muito ornamental, em virtude de suas longas frondes pendentes.
- TREPADOR — Erva silvária.
- FICHA** — Guapuruvú.
- FICHEIRO** — Guapuruvú.
- FICOS** — Numerosas sps de Moráceas do Ge *Ficus*, vulgarmente conhecidas por Figueiras e, ainda melhor, por Gameleiras.
- FIGO** (dos pomares), **FIGUEIRA** — *Ficus carica* L. Morácia arbórea de tardo crescimento. Fos ásperas

- e lobadas; fr — aliás infrutescência — em sieção, de excelente sabor, sendo laxativo e peitoral.
- BANANA** — Banana, Bananeira de frs comíveis.
- DA INDIA** — Figueira da India.
- DE ADÃO** — Banana, Bananeira de frs comíveis e indistintamente.
- DO INFERNO** — Mamona e principalmente o Pinhão de purga.
- DO PARAIZO** — Banana. Bananeira de frs comíveis e indistintamente.
- VERDE** — Figo (dos pomares).
- FIGUEIRA** — Vid Ficos.
- BENJAMIM** — *Ficus retusa* L. var. nitida Thun. impropriamente conhecido por *F. benjaminae*. Morácia robustíssima e de grande altura. Vale pela densidade de sua folhagem e a maleabilidade dos ramos, prestantes a curiosas formas. Ornamental.
- BRANCA** — Gameleira branca (*F. dolariaria*).
- BRAVA** — Estramônio. Impróprio, pois muitas Gameleiras merecem esse apelido.
- COMUM** — Figo, Figueira (dos pomares).
- DA BERBÉRIA** — *Opuntia vulgaris* Mill. Cactácia de cau segmentado, arbustivo e armado; fls encarnadas. Sp xerófita.
- DA ESPANHA** — Figueira da India.
- DA INDIA** — *Opuntia ficus-indica*. Cactácia do mesmo tipo da Figueira da Berbéria e das Palmatóriss. Tem bagas comíveis, conhecidas por "figo".
- DE ADÃO** — Vid Figo de Adão.
- DE BACO** — Figo, Figueira (dos pomares).
- DE ESPINHO** — Palmatórias do diabo e as Cactáciias armadas.
- DO INFERNO** — Estramônio, Cardo ananáz, as Palmatórias e as sps consignadas a propósito do Figo do Inferno.
- DO MANGUE** — Gameleira (*F. dolariaria*) e sps afins.
- DO MATO** — Gameleira (Indistintamente).
- DOMÉSTICA** — Figo, Figueira (dos pomares).
- DO REINO** — Figo, Figueira (dos pomares).
- GRANDE** — Gameleira branca e as sps florestais.

- MATA-PAU — Gameleira (*F. doliaria*) e sps afins, que sendo terrestres, podem ser epífitas.
- TERRESTRE — Contraerva. Impreário pois cabe a todas as sps conhecidas por Figueiras e Gameleiras.
- TREPADAIRA — Hera brasileira.
- VERMELHA — Gameleira vermelha.
- FIGUEIRINHA DO INFERNO** — Estramônio.
- FILANTO** — Quebra pedra. Impreário pois cabe a todas as Euforbiáceas do Ge *Phylanthus*.
- FILÃO** — Casuarina.
- FININHA** — Diamba.
- FIO DA VIRGEM** — Algodão de seda.
- FIOS DE OVOS** — Cipó chumbo.
- DO DIABO — Cipó chumbo.
- FIRMEZA DOS HOMENS** — Papoula de duas cores.
- FISALIDA** — Camapu.
- FITA DE MOÇA** — *Muehlenbeckia platycarpa* Meiss. Poligoniácia subarbustiva e ornamental. Cau achattado, com o aspetto de longa folínea, donde brotam fls albas. A sp estabelece alguma semelhança com Euforbiáceas do Ge *Phyllanthus*, como se observa no *P. koltzianus*.
- FLAMBOIAN** ou talvez melhor **FLAMBOIAO** — *Poinciana regia* Bog. Leguminosa arbórea, robusta, de grande envergadura e mui estimada como ornamento. Grandes fls compostas pinadas, caducando geralmente na floração. Fls encarnadas, amarelas ou raiadas.
- FLAMBOIAO** — Flamboian.
- FLAMBOIAOSINHO** — Barbas de barata.
- FLAMEJANTE** — Flamboian.
- FLECHA, FLECHEIRA** — Vid Frecha, Frecheira.
- FLOCOS** — *Flox*.
- FLOR AMARELA** — Flor de São João. Muito impreciso, porque é cabível a inúmeras sps.
- AZUL — Capela de viuva.
- DA ABISSINIA — Cacto japonês.
- DA AVE DO PARAISO — Barba de barata.
- D'AGUA — Lentilha d'água.
- DA IMPERATRIZ — *Hippastrum procerum* Lem. Amarilidácia erbácea, bolbosa, com fls ensiformes e belas fls campanuladas. Ornamental, tambem conhecida por Aqucena.

- DA LUA — Boa noite (*I. bonanox*).
- DA NOITE — Boa noite (*I. bonanox*), cabivel, porém, a muitas sps.
- DA OCEANIA — Graxa.
- DA PAIXÃO — Maracujá. (Indistintamente).
- DA QUARESMA — Quaresma.
- DA TRINDADE — Amor perfeito.
- DAS LAVADEIRAS — Mariânhia.
- DAS ONZE HORAS — Onze horas.
- DAS QUATRO HORAS — Bonina e Batata de purga.
- DE ABRIL — *Dillenia indica* L. Dilleniácia arbórea, copuda e elegante. Fls longo elípticas e plissadas; frs bagas não comíveis, com o aspetto da Fruta de conde. Para jardins, parques e ruas.
- DE AMOR — Bredo (Impreário).
- DE BABADO — *Echites fongiflora* Desf. Apocinácia de ras napiformes, cau rugoso e grandes fls. Lactífero. Ras usadas contra o tifo dos cavalos.
- DE BABEIRO — Flor de babado.
- DE BAUNILHA — Heliotrópio.
- DE CACHIMBO — Espatódia.
- DE CAMPA — Vela da pureza e especialmente a Árvore da pureza.
- DE CARDIAL — Primavera (Ipomoea).
- DE CERA — *Hoya carnosa* R. Br. Apocinácia sarmentosa, robusta e ornamental. Fls ovalares e pilosas como o caule; fls alvas em umbelas axilares. Outras sps: *H. variegata* D. Vries; *H. vridosia* R. Br. *H. coriacea* Blum. Tidas como tóxicas. O *Ora pro nobis* tem igual apelido.
- DE CIUMES — Bredo e Veludo.
- DE CORAL — *Russearia equisetifolia* Sch. e Cham. Escrofulácia arbustiva, de cau delgado e verdoso, fls filiformes e verticiladas e fls tubulosas, encarnadas sobre longo pedúnculo. *Clerodendron fallax* Lind. Verbanácia sarmentosa e ornamental, com fls encarnadas em cachos pendentes. *Jatropha multifida* L. Euforbiácia, arbustiva, ramosa e selvática, com fls digitadas, fls em cimeiras e fr capsula. Sp purgativa, hipnótica e parasitícola. Tem ainda o mesmo apelido o *A lineate de noiva* e os *Mulungús*.
- DE COURO — Flor de pau.
- DE DIANA — Sempre viva.
- DE ENGRAXATE — Graxa.

- DE GRAMA — Capim pé de galinha.
- DE GRAXA — Graxa.
- DE JANEIRO — Cebola cecém.
- DE LEVANDE — Cardamomo.
- DE LIS — Lírio branco e Lírio do brajo.
- DE LIXA — Cipó caboclo.
- DE MACACO — Esponjeira.
- DE MADEIRA — Flor de pau.
- DE MAIO — Margarida arbórea e Quaresmeira.
- DE MICO — Açucena do mato.
- DE NATAL — Tibouchina *salviaefolia* Cham. Melastomácia arbustiva do tipo das Quaresmeiras. Fos lancioladas, trinérvias; fls em paniculas terminais, roxas, com o cálice apresentando segmentos obtusos ou arredondados.
- DE NOIVA — Alfinete de noiva e Lírio eucarístico.
- DE ONZE HORAS — Onze horas.
- DE PAPAGAIO — Papagaio.
- DE PAU — Ipomoea *glazioui* Dam. Convolvulácia trepadeira, de enorme desenvolvimento, ornamental e cultivada. Fos digitadas; fls amarelas infundibulares. Ha persistência do cálice, envolvendo o fr e de consistência lenhosa.
- DE PAVAO — Barba de barata, Chagas e Flamboian. Impreciso.
- DE PIRARUCÚ — Coerana.
- DE PROSERPINA — Violeta (*V. odorata*).
- DE SANGUE — Chagas.
- DE SANTA BÁRBARA — Cana de macaco.
- DE SANTANA — Tres Marias.
- DE SANTO ANTONIO — Tres Marias. Isso devido a suposição da sp florescer no aniversário do santo.
- DE SÃO JOÃO — Allamanda nobilis F. Masts. Apocinácia sarmen-tosa e robusta. Tetrafólios verticilados; fls amarelas, em grandes corolas gamopétalas; cápsula com pírias espiniformes. A.A. schottii Pohl. do mesmo tipo, apresenta corola menor. Ha outras sps com o mesmo apelido e, dentre todas, a Campainha azul.
- DE SÃO JOSÉ — Espirradeira.
- DE SÃO MIGUEL — Capela de viúva.
- DE SAPATO — Graxa.
- DE SAPO — Cega olho.
- DE TODO ANO — Boa noite (*Vinca*).

- DE TROMBETA — Trombeta (Indistintamente).
- DE VIUVA — Capela de viúva.
- DO BISPO — Flor do paraizo.
- DO CARDIAL — Primavera (*Ipo-moea*).
- DO CLERO — Flor do paraizo.
- DO DIABO — Milhomens (Indistintamente).
- DO DIVINO ESPIRITO SANTO — *Oncidium crispum* Lod. Orquídacia ornamental.
- DO ESPÍRITO DO MAL — Milhomens (Indistintamente).
- DO ESPÍRITO SANTO — Flor do Divino Espírito Santo e Papagaio.
- DO GENERAL — Jasmim do Cabo.
- DO HIMENEU — Mangerona.
- DO INVERNO — Suspiro.
- DO NORTE — Boa noite (*I. bona-nox*).
- DO OLIMPO — Alecrim (*R. off.*).
- DO PAPA — Flor do paraizo.
- DO PARAIZO — *Clerodendron thompsonae* Balf. Verbenacia sarmen-tosa muito ornamental pelas inflorescências com seus elementos de cálices cor de creme e corolas encarnadas. Tem o mesmo apelido a Barba de barata.
- NACIONAL — Ipê amarelo (*T. umbellata*).
- TROMBETA — Tecomária. Impreciso, pois cabe também à Trombeta.
- FLOX** — *Phlox drumondii* Hook. Polimoníacia erbácia, anual e ornamental, para orla de canteiros e balcões. Sp *semper florens*.
- FOGUEIRA DO INFERNO** — Dois amigos.
- FOLHA BOA** — Catuaba (Indistintamente).
- CHATA — Capeba.
- FOLHADA** — Alfaca do mar.
- FOLHA DA COLÔNIA** — Cardamomo.
- DA COSTA — *Bryophillum pinnatum* Kur. Crassulácia erbácia. Fos gordas e suculentas; fls em longas paniculas, levemente encarnadas; fr folícujo. Fos proliferas; aplicadas na testa aplacam a cefaleia (?); são peitoraes. Ha outras sps do mesmo Gé com o mesmo nome.
- DA FONTE — Cipó imbé.
- DA FORTUNA — *Panax fruticosus* L. Araliácia arbórea, utilizada em cercas vivas. Fos lobadas; fls em umbelas e pequenos frs drupáceos. *P. gulfholei* Bail. Do mesmo tipo, porém com fos maiores e fen-

- didas. Ambas decorativas. Com esse apelido é identificada, fora da Bahia, a Folha da Costa.
- DA INDEPENDÊNCIA — Crotom (C. variegata). Var ornamental, muito comum, com fós longo elípticas verdes e amarelas.
- DA VIDA — Folha da Costa.
- DE CARDIAL — Papagaio.
- DE CARNE — São Gonçalinho.
- DE FOGO — Clímenia hirta Bail. Melastomácia sub arbustiva e inculta. Cau piloso; fós elípticas, com nervos longitudinais, cruzados por outros transversaes; fls em paniculas; bagas pequenas, pretas e comíveis. Os pêlos, mesmo das fós, não são urentes.
- DE LIXA — Lixeira.
- DE LOUCO — Erva do diabo.
- DE PAGÉ — Fedegoso.
- DE PAPAGAIO — Crotom (C. variegatum) e Papagaio.
- DE PIRARUCU — Folha da Costa.
- DE SANGUE — Papagaio.
- DE SANTANA — Assa-peixe (Indistintamente).
- DE SEDA — Phyllanthus nivosum Bent. Euforbiácia sub arbustiva, mui ornamental, pela beleza de suas fós compostas e pinadas, com folíolos arredondados e multicores; as pequeninas fls, pendentes, ficam entre os pecíolos dos folíolos.
- DE URUBU — Pothus quadrangularis. Arácea erbácia, de fós radicantes, lancioladas e de longo pecíolo. Fls em espádices. Anti reumática, usada externamente.
- DO CORAÇÃO — Sapatinho do diabo.
- DO IMPERADOR — Vid Folha da Independência.
- DOURADA — Caimito.
- FURADA — Timbó manso.
- GROSSA — Folha da Costa.
- GROSSA DO SERTÃO — Chá de bugre.
- IMPERIAL — Folha da independência.
- LARGA — Andrequicâ. Impreciso porque cabe a inúmeras sps, inclusive ao Pau doce da fo larga e à Colher de vaqueiro.
- ROTA — Timbó manso.
- SANTA — Rabugem de cachorro e Vasa matéria.
- FORGET ME NOT — Não me esqueças.
- FORMIGUEIRA — Mastruço (C. ambrostoides).

FORMOSA MARGARIDA — Margarida.

—SEM DOTE — Verbena.

FORQUILHA — Pau Pereira. Impreciso pois tambem é dado ao Taiaúá.

FORTUNA — Folha da fortuna.

FRANGIPANEIRO — Jasmim caiaua.

—DA GOIANA — Jasmim caiaua.

FRECHA — Ubá.

—VERDADEIRA — Cana frecha.

FRECHEIRO, FREXEIRO — Douradinha do campo (W. communis).

FROCO — Pinheirinho. Pinheirinho dos campos.

FRUTA DA CONDESSA — Fruta de conde. Pinha, fora da Bahia.

—DA COTA ou COCTA — Bucha, especialmente a L. cylindrica.

—DE ARARA — Andá açu.

—DE ÁRVORE — Sapucainha.

—DE BABADO — Sapucainha.

—DE BOBO — Cardo ananá.

—DE BURRO — Pegerecu.

—DE CACHORRO — Limão do mato.

—DE COMONA — Sapucainha.

—DE CONDE, ou DE CONDESSA — Anona reticulata L. Anonácia arborea e cultivada, mais pelos frs que por ornamento. Fós longo elípticas; fls amareladas; fr baga, com a forma de coração, de polpa apreciada. Lenho quebradiço.

—DE CONTA — Jequiriti.

—DE COTIA — Andá açu, Aroeira vermelha e especialmente à Sapucainha.

—DE GENTIO — Purga de caboclo.

—DE GUARA — Caiçara e Couvetinga.

—DE IMBÉ — Cipó imbé.

—DE JACARE — Limão do mato.

—DE LEPRÁ — Sapucainha.

—DE LOBO — Caiçara e especialmente a Lobeira.

—DE MACACO — Caju, Sapucalnha e especialmente a Sapucáia.

—DE PACO — Sapucainha.

—DE PERDIZ — Murici.

—DE POMBA — Erythroxylum peltierianum SH. Eritroxilácia arbustiva, com fós elípticas e alternas, fls axilares e albas e frs drupáceos. Madeira de lei e é eupéctica. Tem o mesmo apelido a Cuia de brejo.

—DE POMBO — Fruta de pombo e Pau pombo.

—DE PURGA — Andá açu.

- DE RAPOSA — Aroeira (Indistintamente).
- DE SABÃO — Saboeiro.
- DE SABIA — Aroeira (Indistintamente).
- DE SAIRA — São Gonçalinho.
- DE SAPUCAINHA — Sapucainha.
- DE TUCANO DO CAMPO — Cabelo de negro e Pau de tucano.
- DE VAQUEIRO — Licania dealbata Hoot. Rosácea arbórea, de folhas lancioladas, fls axilares e terminais e fr — baga insípida. Córtez adstringente.
- DO PERU — Graveola.
- DOS PAULISTAS — Bucha. Especialmente a *L. cylindrica*.
- ENCARNADA — Taiuá.
- ESTRELADA — Flor de abril.
- PAO ou DE PÃO — *Arthocarpus incisa* L. Morácia de grande desenvolvimento. Folhas grandes e fendidas, apreciadas pelo gado; fls em espigas, fr volumoso com o aspecto de polidrupe, de excelente sabor e saboroso. Essa sp é destituída de sementes, havendo portanto uma var "seminífera" ou "tipolo" pouco cultivada, com sementes.
- DE MASSA — Fruta pão.
- FRUTO AMARGOSO** — *Anisosperma passiflora*. Cucurbitácia robusta e gavinosa. Folhas longo ovalares; fls alvas e pequenas; fr baga — pepônido — com sementes medicinais: amarga, anti desintética, colagoga e purgante. Impropiamente também conhecida por Nandiroba.
- DE CACAMBA — Sapucaria.
- DE IMBÉ — Cipó imbé.
- DE OURO — Laranja (Indistintamente as Rutáceas).

- DE PURGA — Andá açú.
- DE RAPOSA — Aroeira (Indistintamente).
- DE SABIA — Aroeira (Indistintamente).
- DE TUCANO DOS CAMPOS — Cabelo de negro.
- DOS PAULISTAS — Bucha. Especialmente a *L. cylindrica*.
- FUMEIRO** — Lobeira. Apelido muito impróprio.
- FUMO** — *Nicotina tabacum* L. Solanácea sub arbustiva muito cultivada na Bahia. A excelência do Fumo bahiano é universalmente reconhecida. São conhecidas muitas variações além da sp mater, também considerada *vulgaris*.
- BRAVO** — *Elephantopus scaber* L. Composta erbácia e ereta. Folhas elípticas e serrilhadas; fls em capítulos, agrupados em espigas terminais. Antifebril, antireumática e adstringente. *Eremanthus incanus* Less. Outra Composta, inculta como a precedente, ereta e de caule piloso, folhas alternas elípticas e fls em capítulos solitários. Tem ainda o mesmo apelido a *Couvettinga*.
- BRAVO DE MINA** — Fumo bravo.
- ANGOLA** — Diamba.
- DO MATO** — Fumo bravo e Diamba.
- FUNCHO** — Anis estrelado.
- DA CHINA** — Anis estrelado.
- FUNDO DE LIMA** — Pimentão.
- FURA MUROS** — Quebra pedra.
- DE PAREDES** — Quebra pedra.
- FUSO** — Sebastião de Arruda (Dalsbergia).
- FUSTETE** — Tatajuba.

G

- GAFORINA** — Saudades.
- GAJACO** — Guaco.
- GAIA MOÇA** — Tintureira.
- GAIBIM** — São Gonçalinho.
- GAIFORINA** — Ipê branco e Saudades.
- GAIRO** — Coqueiro amargo.
- GAIUVIRA** — Ipê branco.
- GALANGA** — Caianga do Japão.
- GALINHA CHOMA** — *Erythroxylon suherosum* Sch. Eritroxiliá arbustiva de cau nodoso. Materia corante.
- GALINHO DO CAMPO** — *Milhomens* (*A. brasiliensis*).
- GAMBÁ** — Tipi.
- GAMELEIRA** — Algumas Moráceas do Ge *Ficus*. Sp. de rápido e grande desenvolvimento, notável pela robustez e resistência. Lactíferas; madeira para canhões, gâmetas. O latex do F. *anthelmintica* M. é drástico e vermisfugo; o Apui e o F. *pouieaster* Desf. são decorativos para ruas e parques.
- BRANCA** — *Ficus dollaria* M. Do mesmo tipo da Gameleira. Anti-helmíntico e purgativo.
- BRANCA DE PURGA** — Gameleira branca.
- BRAVA** — Gameleira branca.
- DE CANSAÇO** — Gameleira branca.
- DE LOMBRIGUEIRA** — Gameleira (*F. anthe'mintica*) e G. branca.
- DE PINGA** — Gameleira branca.
- DO PARÁ** — Gameleira (*F. anthel'mintica*).
- LEGITIMA** — Gameleira branca.
- VERDADEIRA** — Gameleira branca.
- VERMELHA** — *Ficus glabra* Grif. Morácea do tipo da Gameleira.
- GANHA-SAIA** — Bico de papagaio.
- GARAPA** — Grapeapunha.
- AMARELA** — Grapeapunha.
- BRANCA** — Grapeapunha.
- GARAPEAPUNHA** — Grapeapunha.
- GARATÁ** — Laranjeira do mato.
- GARAVATAPOCA** — Aranoca.
- GARAUATÁ, GARAVATÁ** — Gravata (Indistintamente).
- GARAUNA** — Barauna e Brauna.
- DA MODA** — Barauna e Grauna.
- GARDENIA** — Jasmin do Cabo.
- DA FOLHA GRANDE** — Jasmin do Cabo.
- DOS JARDINS** — Jasmin do Cabo.
- GARGAUBA** — Umbuba (Indistintamente).
- GARIROBA** — Côco amargo e Coqueiro amargo.
- GARUMAN** — Taiuiá.
- GATEADO** — Gonçalo Alves.
- GECUMA** — Geneuna.
- GEJUIRA** — Gonçalo Alves.
- GEMA DE OVO** — Arapoca e Grapéapunha.
- GENCIANA** — *Lisianthus pendulus* M. Gencianácia erbácia. Ra amargo-tônica e anti febril.
- DO BRASIL** — Féi da terra (*C. spicata*).
- SEM FOLHAS** — *Voyria uniflora* Lamk. Gencianágia.
- GENDIROBA** — Andiroba e Nandiroba (Impreciso).
- GENERAL** — Jasmin do Cabo.
- GENEUNA** — *Cassia grandis* L. Leguminosa alta e frondosa. Fis róseas, abundantíssimas. Sp. mui ornamental; madeira de lei. Outras Leguminosas têm o mesmo nome.
- GENGIBRE** — *Zingiber officinalis* Rosc. Zingiberácia erbácia. Os rizomas servem de condimento; refrigerante no Ginger bier.
- AMARELO** — Curcuma (Impreário, pois os rizomas do Gengibre também são desse coloração).
- DOURADO** — Curcuma.
- GENGIVRE** — Gengibre.
- GENIPA** — Genipapo.
- GENIPAPAIM** — Genipapo bravo.
- GENIPAPIM** — Genipapo bravo.
- GENIPAPINHO** — *Conocarpus erectus* Jacq. e Cabuçu (Impreciso).
- GENIPAPO** — *Genipa americana* V. Mirtácia arbórea e inulta. Madeira de lei. Frs excelentes — bagas — usados como eupéptico. A melhor grafia é Jenipapo.
- BRANCO** — Genipapo.
- BRAVO** — *Tocoyena formosa*

Schum. Rubiácia arbórea; madeira de lei.
 —COMUM — Genipapo.
 —DA AMÉRICA — Genipapo.
 —D'AGUA — Pequi.
 —DO CAMPO — Genipapo bravo.
 GENIPAT — Genipapo.
 GEORGINA — Mimo do ceu.
 GEQUIRITI — Jequiriti.
 GERANIO — Pelargonio zonale L'Herit. Geraniácia erbácia e ornamental, apresentando muitas vars. Tônico e aromático. A Malva rosa (*G. erodifolium*) tem o mesmo apelido.
 GERATACA, GERATACAIÁ, GERA-TATACA — Manacá.
 GERAU — Brejauva.
 GERBÃO — Gervão.
 GÉRBERA — *Gerbera jamersonii* Bolus. Composta erbácia e ornamental. Fls — capítulos — de longa raque.
 GEREBÃO — Gervão.
 —VERDADEIRO — Gervão.
 GEREMA — Jurema.
 GEREMARI — Vinhático de espinho.
 GERCELIM, GIRGELIM — *Sesamum indicum* DC. Pedaliácia arboreta. Sementes oleosas, sucedâneas da Oliveira. Óleo empregado em perfumaria. A ssp branca distingue-se da trigueira, por ser a primeira mais ramosa.
 GERIBÁ — Baba de boi (*C. romanzoffiana*).
 GERICÓ BRANCO — *Cladonia verticillata*. Líquem fruticoso, de coloração alva.
 —ROXO — *Selaginella convoluta* L. Lycopodiácia erbácia, cujas frondes, enroladas, distendem-se com a humidade.
 GERIMÚ, GERIMÓM — *Cucurbita maxima* Duch., var rotunda. Abóbora de excelente qualidade, apresentando costelas arredondadas.
 —BRAVO — Taluiá.
 —GALEGO — Abóbora cheirosa.
 GERIVÁ — Baba de boi (*C. romanzoffiana*).
 GERUMBEBA — Opúncia. Vid também Urumbeba.
 GERUMUÉ — Abóbora dagua.
 GERVÃO — *Stachytarpha dichotomica*, Vahl. Verbenácia erbácia e erécta. Diurético e anti febril. Da mesma Fa., do mesmo e de outros Ges., com o mesmo nome existem mais sps.
 —DAS CATINGAS — Gervão.

—DA FOLHA GRANDE — Gervão falso.
 —FALSO — *Bouchea pseudo-gervão* Cham. Verbenácia do mesmo tipo do Gervão. Tem ainda o dito apelido a *B. laetevirens*, estimulante e eupéptica.
 —FOLHA DE VERÔNICA — *Stachytarpheta cayennensis* Vahl. Do mesmo tipo do Gervão.
 —ROXO — Gervão.
 —VERDADEIRO — Gervão.
 GESSARA — Assai (Açai) e Palmito doce.
 GIBATAO — Aderno e Gonçalo Alves.
 GIGOGA VERDADEIRA — Nenufar.
 GILÓ — *Solanum gilo* Rad. Solanácia sub arbustiva e erécta. Bagas esferoides, apreciadas em culinária, embora amargas.
 GINGEIRA — *Prunus aphaerocarpa* Sw. ou *P. chamaeserasua* Rosácia arbustiva e decorativa. Fos tóxicas; frs encarnados, para doces.
 —BRAVA — Pau de tucano.
 GINGELIM — Gergelim.
 GINGIBA — Amendoi.
 GINGIBRE — Gengibre.
 GINJA, GINJEIRA — Gingeira.
 GEQUIRITO — Jequiriti.
 GIQUI — Umbu.
 GIRAME — Gerânia.
 GIRRASSÓL, GIRASOL — *Helianthus annuus* L. Composta arbustiva, pouco ramosa. Vistosos capítulos, com aquêniós, servindo à alimentação das aves. Ornamento.
 —BATATEIRO — Topinambo.
 —DE BATATA — Topinambo.
 —DO CANADÁ — Topinambo.
 —TUBEROSO — Topinambo.
 GIRASSOLINA — Margarida arbórea.
 GIRIMÚM — Gerimém.
 GIROFLE — Cravo da Índia.
 GIROU — *Capparis neglecta* V. Caprifácia do mesmo tipo do Icb.
 —LIMÃO — Girú.
 GISSARA — Assai (Açai).
 GITÓ — Bilreiro.
 —MIRIM — Bilreiro.
 —UTAUBA — Bilreiro.
 GLADÍOLO — Palma de Santa Rita.
 GOABÍ POCACAIBA — Avaremómeno.
 GOAGERU — Ariú.
 GOAMBU — Carrapicho de agulha.
 GOARUJÓ — Ariú.
 GOELA DE LEÃO — Graxa.
 GOERANA — Coerana (Indistintamente).
 GOGÓIA — Vide Agua-pé.

- GOIABA AÇU** — Goiaba branca e vermelha.
- AZEDA** — *Psidium densicorom* M. Mirtácia silvestre.
- BRANCA** — *Psidium goiava* Rad. var *pomiferum*. Mirtácia arboreta. Bagas piroides, de polpa alva. Adstringente.
- DE CORÔA** — Goiaba. Vid Araçá de coroa.
- DO MATO** — Cambu (E. *vellosina*).
- MACA** — Goiaba vermelha.
- PÉRA** — Goiaba branca.
- GOIABARANA** — Araçá pomba e Cruiú. Mais cabível à primeira sp.
- GOIABA VERMELHA** — *Psidium goiava* Rad. var *rufum*. Do mesmo tipo da G. branca, porém de polpa encarnada. Sp adstringente e mais encontradiça que a "branca".
- GOIARANA** — Coerana.
- GOITÉ** — Coité e Oiti. Cabível à primeira sp.
- GOLANDIM** — Landim.
- GOLFAO BRANCO** — Nenufar.
- GOLFINHO** — *Nymphaea rudgeana* Gris. Ninfeácia erbácia das águas palustres.
- COLFO** — Lentilha dagua e inúmeras Ninfeárias.
- DA FLOR BRANCA** — Nenufar.
- GOMA ARÁBICA DO BRASIL** — Pau de tucano (*V. thyrsoides*).
- DO BRASIL** — Pau de tucano (*V. thyrsoides*).
- LAGRIMA** — Pau de tucano (*V. thyrsoides*).
- LIMAO** — Almêcega (*P. llicariba*).
- GOMABEL** — Gonçalo Alves.
- GOMBO** — Quiabo.
- GOMEIRO AZUL** — Eucalipto (*E. globulus*).
- GONCALEIRO** — Gonçalo Alves.
- GONCALINHO** — São Gonçalinho.
- GONCALO ALVES** - *Astronium fraxinifolium* Schot. Tida como a var *brasiliensis* dessa Anacardiácia, copuda e alta. Sp resinifera. Lenho encarnado, para obras de luxo. O A graveolens Jacq. e sps afins têm o mesmo apelido. Não confundi-lo com o Aderno.
- GONDURÓ** — Condurú.
- CONGO DO CAMPO** — Gritadeira.
- CONGURÓ** — Condurú.
- CONGÓ, GUNÓ** — Taiuá de culabó.
- GORANA TIMBÓ** — Timbó de raiz.
- GORAREMA** — Pau d'alho.
- GORAZEMA** — Pau d'alho.

- OREMA** — Jurema.
- GOROÇAI** — Grossai.
- GOROROBA** — Potumujú.
- GOSMENTO** — *Urena sylvestre*. Malvácia do mesmo feitio da Guaxima (*U. lobata*).
- GRABIOLA** — Graveola.
- GRAÇA** — Graxa.
- GRACUI** — Angelim pedra.
- GRAGOATA** — Camboatá (Indistintamente).
- GRAMA (comum)** — *Triticum repens* L. Gramínia rasteira, sempre verde. *Stenotaphrum americanum*, da mesma Fa. e tipo da sp precedente, porém com fós verdes e amarelas. O Mate-me embora tem ainda o mesmo apelido, sem a mesma propriedade.
- BAMBU** — *Spigelia multispica* Steud. Loganiácia erbácia. Para orla de canteiros.
- BRANCA** — Grama (*T. repens*).
- CHEIROSA** — Capim cheiroso (Vetiver).
- CIDREIRA** — Erva cidreira.
- COMPRIDA** — Capim comprido.
- CONVALARIA** — Mondo.
- DA GUINÁ** — Capim Guiná.
- DA PRAIA** — Rabo de mucura e Grama (*S. americanum* e *T. repens*).
- DA TERRA** — Marianinha.
- DAS BOTICAS** — Grama (*T. repens*) e Mate-me embora.
- DAS INDIAS** — Capim cheiroso (Vetiver).
- DE BURRO** — Mate-me embora.
- DE CARNEIRO** — *Paspalum densum* Poir., var *millegrana*. Gramínia também conhecida por Capim colônia.
- DE CORADOURO** — Capim pé de galinha.
- DE JACOBINA** — *Chloris bahiensis* Steud. Gramínia rizomatosa, em soqueiras; boa forragem e pouco exigente.
- DE JARDIM** — Grama.
- DE MACAÉ** — Capim de Pernambuco.
- DE MARAJÓ** — Capim de Pernambuco e Mate-me embora.
- DE PERNAMBUCO** — Capim de Pernambuco.
- DE PONTA** — Grama (*T. repens*).
- DE SANANDUVA** — Capim comprido.
- DE RAIZ** — Mate-me embora.

- DE SÃO CARLOS — Capim de S. Carlos.
- DE SÃO PAULO — Mate-me embora.
- DE SEDA — Mate-me embora.
- DE SOMBRA — Mondo.
- DO BREJO — Marianinha.
- DO MARANHAO — Marianinha.
- DO PARA — Sapé.
- FINA — Mate-me embora.
- INGLES — Gramo da praia e Mondo.
- LARGA — Capim de S. Carlos.
- MAJOR JOSÉ INACIO, ou MAJOR INÁCIO — Capim de S. Carlos.
- MINEIRA — Mate-me embora.
- GRAMAO** — Mate-me embora.
- GRAMA PAULISTA** — Capim malada.
- PELO DE URSO — Mondo.
- PRETA — Mondo.
- RASTEIRA — Mate-me embora.
- ROXA — Mate-me embora.
- SAPO — Capim pé de galinha.
- SEM VERGONHA — Mate-me embora.
- GRAMIAMUNHA** — Grapacunha.
- GRAMINAL** — Leguminosa? Arbo-reta elegante, com fls odorantes, dos sertões.
- GRAMINHA** — *Chloris virgata* Sw. Gramínea erbácia de haste achatada e prolífica. Menos propriamente, o Mate-me embora.
- COMUM — Mate-me embora, mais cabível à grama (*T. repens*).
- DA CIDADE — Mate-me embora.
- DE ARARAQUARA — Capim cebola.
- DE CAMPINAS — Capim pé de galinha (*G. radiatus*).
- DE JACOBINA — *Chloris bahiensis* Steud. Gramínea rizomatosa, de soqueira e de cau nodoso. Flos lineares, fls em espigas, no extremo de longa raque. Sp arenícula e boa forragem.
- DE RAIZ — Mate-me embora.
- DOCE — Capim palmeira.
- FINA — Mate-me embora.
- SEDA — Mate-me embora.
- GRANA** — Caroá.
- GRANDE ABSINTO** — Losna.
- GRAO DE CAVALO** — Pequi.
- DE GALO — *Cordia superba* Cham. Borraginácia arbórea. Frs édulas, mucilaginosas, emolientes a peito-raes. Tem o mesmo apelido a Pitomba, a *Cordia excelsa* Alph e o

- Zizyphus ondulatus* Reiss, Rampa-cia, dentre outras sps.
- DE PORCO** — Grão de galo e Sebastião de Arruda (*Dalbergia*).
- GRAPEÁ, GRAPIÁ** — Grapacunha.
- GRAPEAPUNHA, GRAPIAPUNHA** — *Apulea praecox* M. Leguminosa arboreta. Madeira de lei, amarela e pesada; córtex adstringente.
- BRANCA** — Grapacunha.
- GRAPE FRUIT** — Pomejo.
- GRATAUBA** — Maria preta (Indistintamente).
- GRAUNA** — Barauna e Brauna (Indistintamente).
- GRAVATA** — Inúmeras sps rústicas, xerófitas, geralmente epífitas e de longas fos. Algumas são Amarili-dácia, a maioria, porém, Bromeliácia: *Bromelia karatas* L. de frs acre-doces, diureticos e peitorais: *Bilbergia marmorata* Mez; *B. pyramidalis*; *B. zebrina*. De parte a primeira, as outras sps valem pela be-leza de suas fos e fls.
- ACU** — *Agave vivifera* L. Amari-lidácia. O Ananáz pelado, a Piteira, o Sisal e outras sps, merecem o mesmo apelido.
- BRANCO** — *Aechmea bromeliacea-forlia* Bak. Bromeliácia epífita. Fls purpúreas; frs bacáciros; ras com matéria corante.
- DE GANCHO** — Gravatá (*B. karatas*).
- DA PEDRA** — *Aechmea nudicaulis* Gries. Bromeliácia.
- DE RAPOSA** — Gravatá (*B. karatas*).
- DE REDE** — Ananáz pelado.
- DE RÔLO** — Ananáz pelado.
- DE TINGIR** — Gravatá branco.
- GIGANTE** — Piteira e as sps registadas como Gravatá açu.
- GORDO** — Piteira.
- VERMELHO** — Trapoeiraba açu.
- ZEBRA** — *Cryptanthus zonatus*. Bromeliácia ornamental, com fos radicantes e zebróides — estrias transversais.
- GRAVEOLA, GRAVIOLA** — *Anona cherimolia* Mill. Anonácia arbórea, copuda e ornamental. Frs comíveis — grandes bagas de sabor adocicado e enjoativo, munidos de papilas espiniformes. A sp é tambem conhecida por *Anona muricata* L.
- DO NORTE** — Graveola.
- GRAVILIA** — Grevilia.

GRAXA (Singela) — *Hibiscus rosa-sinensis* L. Malvácia arbórea, ramosa, semper florens, muito ornamental, pelas grandes corolas simples. Algumas vars.

—(Dobrada) — *Hibiscus rosa-sinensis* L. var *fulgens*. Malvácia ornamental, que difere da singela pelo volume de sua corola, amarela ou encarnada. *Hibiscus rosa-sinensis* L. var *zebrinus*, de ampla corola raiada.

—DE ESTUDANTE — Graxa.

GREVILIA — *Grevillea robusta* Cunn. Proteácia de grande desenvolvimento. Flos multifidias; madeira de lei forte e durável. Ornamental e especialmente melífera.

GRINALDA DE VIUVA — Capela de viuva.

GRINFIO — *Lonchocarpus capester*. Leguminosa arbórea. Vagens com estrangulações transversas. Lenho não atacado por animais de sangue frio devido à presença da "rotérona".

GRITADEIRA — *Psychotria rigida* Wil. Rubiácia arbustiva e campestre. Fr drupáceo; córtex e sumidades florais diaforéticas e diuréticas. Algumas vars, com esse e outros apelidos.

—DO CAMPO — Douradinha e Douradinha do campo.

—DO MATO — Douradinha.

—DOS TABOLEIROS — Gritadeira.

GROÇAI — Grossal.

GROGOATÁ — Piteira.

GROSELHA, **GROSELHEIRA** — *Phyllanthus acidus* Skeel. Euforbiácia arbórea, cultivada como ornamento e pelos frs — drupas — ou pitangas brancas, fortemente ácidas.

—BRANCA — Groselha.

—DA ÍNDIA — Groselha.

—DOS BARBADOS — *Ora pro nobis*.

GROSSABI — Grossal.

GROSSAI — *Moldenhauera floribunda* Schr. Leguminosa arbórea e florestal. Tanifera; lenho para obras externas.

GRUMICHAMA, **GRUMIXABA**, **GRUMIXAMA**, **GRUMEXUBA** — *Stenocalyx brasiliensis* Berg. Mirtácia arbórea, de frs saborosos, brancos, na var *leucocarpus* e arroxeados na *erithrocarpus*.

—BRANCA — Vid Grumichama.

—**ROXA** — Vid Grumichama.

GYA — Milho.

GUABI-POCACAIABA — Avaremoto.

GUABIRABA — *Cordia rotundifolia* R. e Pav. Borraginácia arbustiva, com drupas piróides comíveis.

GUABIROBA — Coqueiro amargoso. O apelido há sido conferido a outras sps: *Abbevillea klotzschiana* Berg. Mirtácia arbustiva e ramosa, com bagas acre-doçes e lenho de segunda: *Campomanesia reticulata* Berg. Mirtácia.

—DO CAMPO — Coqueiro católe.

GUACATINGA, **GUACATONGA**, **GUACATUMBA** — São gonçalinho.

GUACO — Algumas sps de Compostas do Ge. Mikania: *M. glomerata* Spreng. Sarmentosa volvel, estimada como anti espasmódica, sudorífica e anti febril. *M. amara* Willd. Sarmentosa de grande desenvolvimento. Peitoral e cicatrizante, usada no nordeste contra as mordeduras de cobras. Vid Coração de Jesus.

—CABELUDO — Cipó cabeludo.

—DA SERRA — Coração de Jesus.

—DE CABELOS — Cipó cabeludo.

—DE CHEIRO — Guaco (*M. glomerata*).

—LISO — Guaco (*M. glomerata*).

—TREPADOR — Guaco.

GUACU — Babaçu.

GUADANDI — Landim.

GUAGUAÇU — Babaçu.

GUAIABA — Golaba.

GUAIABI — Ipê branco.

GUAIACU — Babaçu.

GUAIABIRA — Ipê branco.

GUAIAVA — Goiaba.

GUAIAVI — Ipê branco.

GUAIABIPOCAIBA — Avaremoto.

GUAIERU — Ariú.

GUAIRANA — Pau pereira, Coerana e Jasmim de cachorro (*T. coronarium*). Apelido impreciso.

GUAIMBÉ — Cipó imbé.

GUAIRÚ — Coqueiro amargoso.

GUAITI — Oiti (Indistintamente).

GUAIUVIRA — Ipê branco.

GUAJABA, **GUAJAVA** — Golaba.

GUAJABARA, **GUAJAVARO**, **GUAJAVIRA** — Cabuçu e Baga da prain.

GUAJANA TIMBÓ — Anil.

GUAJARÁ — Ariú.

VERMELHA — Ariú.

GUAJIBIRA, GUAJUVIRA — Ipê branco.
GUAJIRU — Ariú.
GUAJURU — Ariú e Carajurú.
GUAMARA — Gravatá (B. karatas).
GUAMBU — Carrapicho de agulha.
GUAMIXAMA — Grumichama.
GUANABANO — Graveola.
GUANAMBI, GANANDI — Landim.
CARVALHO — Landim.
CEDRO — Landim.
DE LEITE — Landim.
LANDIM — Landim.
VERMELHO — Landim.
GUANATIM — Landim.
GUANDEIRO — Andu.
GUANDO — Andu.
GUANDU — Andu.
GUANXUMA — Guaxima (Indistintamente).
GUAPARAIBA, QUAPARIBA — Mangue vermelho.
GUAPARINO — Pau d'arco.
GUAPÉ — Vid Agua-pé.
GUABEBA, QUAPEVA — Vid Agua-pé, impropriamente, o Fruto amergoso e a Nandiroba.
GUAPECUM — Algodão da praia.
GUAPERIBA — Mangue vermelho.
GUAPERUVU — Guapuruvu.
GUAPEVA — Nandiroba.
GUAPIRA — Mangue amarelo.
GUAPIRÚ — Mangue branco.
GUAPIRUVU — Guapuruvu.
GUAPOI — Gameleira (F. dollaria).
GUAPORÉ — Gameleira (F. dollaria).
GUAPURUNGA — Manacá.
GUAPURUVU — Schizolobium exsertum Vog, ou S. parahybum V. Leguminosa alta, com longas fós pinadas, pouco ramificada. Ornamental; as sementes são usadas para facilitar a dentição das crianças.
GUAR — Mangalô.
GUARABU — Pau roxo.
AMARELO — Pau roxo e Itapicurú.
BATATA — Gonçalo Alves.
CEBOLA — Phyllocarpus pterocarpus Ried. Leguminosa de grande porte e decorativa; fls encarnadas e caulinares.
MIRIM — Itapicurú.
VERMELHO — Condurú (B. condurú).
GUARAÇAI — Grossai.
GUARAEM — Buranhem.

GUARAIBA — Ipê (Indistintamente) e Carobelra.
GUARAITO — Caimito.
GUARAJÁ TIMBÓ — Anil.
PIRANGA — Carajurú.
VERMELHA — Ariú e Barbati-mão.
GUARAJU — Ariú.
GUARAJUBA, GUARAJUVA — Terminalia acuminata F. Ale. Combretácia de grande porte. Madeira de lei. O Ariú tem o mesmo apelido.
GUARAJURU PIRANGA — Cara-jurú.
GUARAJUVIRA — Ipê branco.
GUARANA — Coqueiro de Venus.
GUARANÁ — Paullinia cupana HBK. Sapindácia sarmentosa, com sementes cuja polpa se transforma na pasta do Guarana, de virtudes tónicas e eupépticas.
UVA — Guarana.
GUARANHÈ, GUARANHEM — Buranhem.
GUARAPAI, GUARAPARI, GUARAPARAIBA — Mangue vermejho.
GUARAPAN — Mangue vermelho.
GUARAPEAPUNHA, GUARAPIAPUNHA — Grapéapunha.
GUARAPIÁ — Pimenta de galinha.
GUARAPIRACA — Angico.
GUARAPUVIRA — Ipê branco.
GUARAQUIM, GUARAQUINHO — Pimenta de galinha.
GUARAREMA — Pau d'alho.
GUARAROBA — Araribá (Quina ver.) e Potumujá. Mais cabível à última sp.
GUARASSAI — Grossai.
GUARATÁ, GUARATAN — Laranjeira do mato e Arapoca branca.
GUARATAIA — Arapoca.
BRANCA — Arapoca.
GUARATAPOCA — Arapoca.
GUARATIMBÓ — Vid Timbó (Indistintamente).
GUARAUNA — Barauna e Brauna.
DA MODA — Barauna e Brauna.
PRETA — Barauna e Brauna.
GUARDA SOL — Amendoeira da índia.
GUARDIAO — Abóbora do mato.
GUARÉ — Bilreiro.
GUAREITA — Arco de pipa.
GUAREPI — Ariú.
GUARETÁ, GUARETAN — Sete e sacos.
GUARIJUBA — Guariuba.

GUARIMBI — Sete casacas.
GUARINDIBA — Crindeuva.
GUARIRABA — Guabiraba.
GUARIROBA — Coqueiro amargoso.
—DO CAMPO — Coqueiro catolé.
GUARIROBINHA — Coqueiro catolé.
GUARITA — Gonçalo Alves e Tamaneira.
GUARIUBA — *Olmedia erythrorhiza*
 Hub. Morácia arbórea, fls em espigas, frs drupáceos. Lactífera; lenho resistente para carpintaria.
GUARUBU — Pau roxo.
GUARUCAIA — Ibira puita.
GUARUJÓ — Ariú e Barbatimão.
—VERMELHO — Ariú.
GUASSAI — Assai (Açai).
GUASSATINGA, **GUASSATONGA**,
GUASSATUNGA — São gonçalinho.
GUASUMA BRANCA — Sacarolba.
GUATAMBÁ — Pequi.
GUATAMBÚ — Quina de Camamu.
—MARFIM — Pau marfim.
—ROSA — Quina da Camamu.
—VERMELHO — Quina da Camamu.
GUATAIPOCA — Arapoca.
GUAXIMA — Guaxima (Indistintamente).
GUAVIROVA — Vid Guabiroba (*S. oléreas*).
GUAXICA — Pau concha.
GUAXIMA — *Urena lobata* Cav., também considerada var americana dessa sp. Fos lobadas, fls roxas; fr drupa — "Carapicho redondo". Sp rústica e prolífica, que além de emoliente, bequiva e diurética, fornece fibras muito procuradas industrialmente. Esse apelido também é conferido a outras sps.
—BRANCA — Guaxima (*U. lobata*).
—COR DE ROSA — Carapicú.
—DA PRAIA — Algodoero da praia.
—DO MANGUE — Algodoero da praia.
—MACHO — Guaxima e Mutamba.
—MIUDA — *Sida linifolia* Cav. Malvácia erbácia, erecta e inculta. Fos longo lancioladas; fls axilares. Sp fibrosa.
—ROSA — Carapicú.
—ROXA — Guaxima (*U. lobata*).
—TORCIDA — Mutamba.
GUAXIMBA — Guaxima (Indistintamente).
GUAXIMBÉ, **GUAXIMBI** — Jacaraná (Indistintamente).
GUAXINDUBA, **GUAXINGUBA** — Gameleira branca.

—BRAVA — Gameleira (*F. antehelmintica*).
GUAXUMA — Guaxima (Indistintamente).
—BRANCA — Malva branca.
—ROXA — Guaxima (*U. lobata*).
GUAZUMA — Mutamba.
GUELDA DE JACU — Cipó de corda.
—DE LEÃO — Graxa.
—DE LOBO — Papagaio.
GUEMBÉ — Cipó imbé.
GUENDU — Andu.
GUEQUIRI — Jequiritti.
GUIA DOS VIAJANTES — Árvore dos viajantes.
GUIABA, **GUIAVA** — Goiaba.
GUIABARA — Baga da praia.
GUIBÁ — Palmatória miuda.
GUIMBÉ — Cipó imbé.
GUINÉ — Tipi.
—LEGÍTIMO — Capim guiné.
GUIPA — Palmatória miuda.
GUIRÁ — Erva de passarinho.
GUIRAIBA — Ipê (Indistintamente).
GUIRAUNA — Barauna e Brauna.
GUITI — Oiti (especialmente o mirim) e o Saboeiro.
GUIZO DE CASCAVEL — Cascavela.
GULANDE, **GULANDI**, **GULANDIM** — Landim.
—CARVALHO — Landim.
GUPIUBA — Copiba.
GURAÇAI — Grossai.
GURANHEM, **GURA-EN** — Buranhem.
GURATÁ, **GURATAM** — Arapoca branca e Laranjeira do mato.
GURATAIA — Pau marfim.
GURATAIPOCA — Arapoca.
GURATAM MOENDA — Gonçalo Alves.
GURATAPOCA — Arapoca.
GURI — Vid Burí.
GURINDIVA — Crindeuva.
GURIRI — Cachandó.
GURIXIMA — Vid Crissiumá.
GURU — Náz de cola.
GURUBO, **GURUBÓ** — Gonçalo Alves e Pau roxo.
GURUMIÇABA, **GURUMICHABA**,
GURUMIXABA — Grumixaba.
GURUPIA — Grapeapunha.
GUSSAI — Grossai.
GUTI — Oiti (Indistintamente).
GUTIBA — Oiti, especialmente o mirim.
GUVITINGA — Couvetinga.
GUZABU PRETO — Gonçalo Alves.

H

- HABOI** — Gameleira (*F. doliaria*).
HATI DE ESPINHO — Carrapicho de carneiro.
HELIANTE, HELIANTO — Girassol.
HELIOTRÓPIO (dos jardins) — *Heliotropium peruvianum* L. Borraginácia erbácia. Fos longo elípticas com nervuras plexiformes; fls aromáticas e violáceas, apresenta vars e híbridos. Dá matéria corante, é anti espasmódica e cordial.
—(inculto) — Crista de galo (*H. foetidum*).
HELIOTROPO — Heliotrópio.
HENEQUEM — *Agave fourcroydes* Lem. Amarílidácia xerófita. Fos radicantes, longas, espessas e espinhosas, fornecendo fibras industriais. Floração em longa fuste, até de 10 metros de altura.
HERA (brasileira) — *Ficus repens* Willd. Morácia cultivada e trepadeira. Cau ramosíssimo, aderente às paredes e muros; fos ovalares; frs — sicônia — globulosos, com ampla câmara de ar.
—**MIUDA** (brasileira) — *Ficus repens* Willd., var *pumila*. Tem as características da Hera brasileira, porém de fos menores. Cumpre notar que as fos dos ramos livres desta sp são maiores que às dos aderentes.
HÉVEA — Seringueira.
HIACINTO — Jacinto.
HICACO — Ariú.

- HORTELA, ORTELAN** — *Mentha piperata* L. ou *M. sativa* L. Labíndia erbácia e reptante. Fos aromáticas e escabrosas; fls purpúreas. E' conhecida por "cheiro"; anti espasmódica.
—**BRAVA** — Rabugem de cachorro.
—**COMUM** ou **HORTENSE** — Hortela.
—**DAS COSINHAS** — Hortejá.
—**DO BRASIL** — Alfavaca de cheiro e Rabugem de cachorro.
—**DO CAMPO** — Santa Maria e Alfavaca de cheiro.
—**DO MATO** — Rabugem de cachorro.
—**DO MATO VERDADEIRA** — Rabugem de cachorro.
—**MELADINHA** — Rabugem de cachorro.
—**VERDE** — *Mentha virides* L. Piperícia do mesmo tipo da Hortelã (*M. piperata*).
HORTÉNSIA — *Hydrangea japonica* Sieb. ou *H. hortensis* DC. Saxifragácia sub arbustiva e copuda. Fos amplas e elípticas; fls em belas cimeiras dicotómicas e eretas, de vários coloridos. Ornamento bem aclimado na Bahia.
HUACO — Guaco (Indistintamente).
HUMARI — *Geoffrea superba* H. e Bomp. Leguminosa de ponderável crescimento. Fr capsular edule, embora amargo.

IAJABUIA, IABALUIA — Tabebuia
(Pau de tucano).
IBORANDI — Jaborandi (Indistintamente).
IAGUÁ-ARROZ — Capim pintado.
IAÍA NÃO ME TOQUE Dols amigos.
IANDIBACABA — Bacaba.
IANGUARANDI — Jaborandi (Indistintamente).
IAPECANGA — Japecanga.
IARATACOCA, IARATATACA — Tipi.
IBÁ — Pinho do Paraná.
IBACOPARI, IBACUPARI — Bacuri e mais cabível ao Bacupari.
IBACORI, IBACURÍ — Bacuri.
IBAMETA — Cajá.
IBAMETARA — Umbú.
IBAPAI, IBAPOF — Gameleira, especialmente a branca.
IBARÁ, IBARÓ — Sabociro.
IBATIMÓ — Barbatimão.
IBAXIMÁ — Guaxima.
IBIPITANGA — Pitanga.
IBIRA — Pegerecu e, de preferência, a Embira.
IBIRABA, IBIRABA — Biriba.
IBIRACAMBI — Capixava.
IBIRACEM — Buranhem.
IBIRACEMA — Pau d'alho.
IBIRACICA — Almêcega.
IBIRAÉ, IBIRAEN — Buranhem.
IBIRA OBI — Pau ferro.
—PERE — Grapeapunha.
—PIITA GUAZU — Ibira pulta.
IBIRAPITANGA, IBIRAPITONGÁ — Pau Brasil. O primeiro apelido é “usado literariamente”, segundo A. Neiva.
IBIRAPUITA — *Peltopherum vegetianum* Bent. Leguminosa de cedrado porte, com folhas paripinuladas e fls em abundantes panículas compostas. Muito ornamental.
IBIRAREMA — Pau d’alho.
IBIRATAÍ — Jaborandi (*P. pinnatifolius*).
IBIRAUNA — Barauna e Brauna (Impreciso, pois são espécies distintas).

IBIRIBA, IBIRIBA — Biriba.
IBIRIPITANGA — Pau Brasil.
IBIRUBE — Jacaratá.
IBITANGA — Pitanga (Da Fa das Mirtáceas).
IBITINGA — Ivinga.
IBIUVA — Jataí.
IBIXUMA — Fedegoso e Mutamba. Apelido que não se ajusta às duas espes.
ICA — Palmeirinha de Petrópolis.
ICACO — Ariú.
ICARAPÉ — Jacaré.
ICARIBA — Almêcega.
ICICA — Almêcega.
—**AQU** — Almêcega.
ICICARIBA — Pinho do Paraná, porém mais usado para a Almêcega.
ICÓ — Capparis ico Esch. Caparidácia arbustiva das catingas. Flos coriáceas, simples, elípticas e tomentosas na página dorsal; fr. capsular, só aceito pelo gado nas secas.
—**BRANCO** — Icô.
—**PRETO** — *Capparis jacobinae* More. Caparidácia parecida com o Icô, porém com flos lineares e acuminadas. *Capparis angustifolius* HBK, como a sp precedente, apresentando flos lineares porém de extremidade romba. Frs escuros e édulis.
IERICÓ — Jericó (As duas espes registradas).
IGARÇU — Nandiroba.
IGIGIBÁ, IGITIBÁ — Jequitibá.
IMBAIBA, IMBAIVA — Umbuba.
—**VERDADEIRA** — Umbuba (*C. palmata*).
IMBAMITARA — Umbú.
IMBARÉ — Barriguda (Indistintamente).
IMBAUBA, IMBAUVA — Umbuba (Indistintamente).
—**DE CHEIRO** — Tararsanga.
—**PURUMA** — Tararsanga.
IMBÉ — Cipó imbé.
—**DE COMER** — Cipó imbé.
—**FURADO** — Timbó manso.
—**SÃO PEDRO** — Timbó manso.

IMBIRA — Embira.

—**BRANCA** — Pau de jangada.

—**BRAVA** — Sacarolha.

—**DO MATO** — Sacarolha.

IMBIRAGUAÇU — Imbiruçú.

IMBIRAPITANGA — Pau Brasil.

IMBIRI — Caeté. Apelido impreciso, conferido a outras sps — Buri, Coquinho — dentre muitas.

IMBIRIBA — Mutamba.

IMBIRICU, IMBIRUÇU — *Bombax pubescens* M. ou *B. Pentaphillum V.* Bombácia do porte e grupo das Barrigudas. Fos opostas; amplas fls albas; cápsula com sementes envoitadas em painas setosas. Fibras do córtex para corduaria e madeira de lei.

IMBOCAIA — Pindoba e Macauba.

IMBÚ — Umbú.

IMBÓIA — Embúia.

IMBURANA — *Bursera leptophloea* M. Burserácia arbórea, armadissima, de ramificação difusa e das catingas. Fos opostas; fls em cachos; frs drupáceos, acre-doces e comíveis bem sazonados. Látex com a função da terebentina, sobre as vias respiratórias.

—**BRAVA** — Imburana.

—**DE CAMBAO** — Imburana.

—**DE CHEIRO** — *Torresia cearensis* F. Al. Leguminosa arbórea, também conhecida por Cumaru (Conduru). Córtez espesso, fos pinadas; fls amarelas, em cachos e aromáticas; vagens com sementes aliadas tendo o cheiro da "cumariana" existentes no Cumaru verdadeiro. Lenho para carpintaria e medicinaria. Peitoral. A sp está, atualmente, compreendida no Ge Amburana.

—**DE ESPINHO** — Imburana.

—**MACHO** — Imburana.

IMBUREIRO — Imburana (Indistintamente).

IMBURI DA CACHORRO — Baba de boi (*C. romanzoffiana*).

IMBURUÇU — Imbiruçú.

IMIRÁ-ITÁ — Pau ferro.

IMIRACEM, IMIRANHEM — Buranhem.

IMIRA PITANGA — Pau Brasil.

IMORTAL — Sempre viva.

INAJÁ — *Maximiliana regia* M. Palma ereta, de média altura, de longas fos pinadas e verticiladas.

INAJÁGUAÇU-IBA, INAJAUÇU, INAJUGUAÇU-IBA — Coqueiro da Bahia.

INCENSO DE CABOCLO — Capim limão.

—**DE CAIENA** — Almâcega.

—**PRETO** — Estoraqueiro.

INCÓ — Icô (Indistintamente).

INCONSTANTE — Papoula de tres cores.

—**AMANTE** — Graxa.

INDÁ-AÇU, INDÁ-GUAÇU — Andá-açu.

INDÁIA — *Attalea humilis* M. Palmaia de fos pinadas e verticiladas, do tipo Coqueiro de piassava, porém quase acaule, fornecendo fibras para cordas e redes. Frs drupáceos, com sementes oleosas de usos culinários e industriais. O Catolé tem sido considerado da mesma sp e Ge.

—**AÇU** — Babaçu.

INDÁI-AÇU — Andá-açu.

INDAJÁ — Babaçu.

INDEPENDÊNCIA — Folha da independência.

INDIGOFERA — Anil.

INFALIVEL — Inúmeras sps conhecidas com esse apelido e de virtudes medicinais, como o Bol gordo e Para tudo.

INGÁ, INGAZÉIRA — Denominação de muitas Leguminosas, geralmente arbóreas, apresentando, entre os elementos mais característicos, vagens édulis, de variavel tamanho, ricas em polpa — espermoderma — que envolve a semente. São taníferas e seu lenho presta-se para carpintaria. Serve de exemplo a *Inga edulis* M. Árvore ramosa e esgalhada, de fos paripinuladas e de longas vagens estriadas longitudinalmente. Algumas sps ou vars são apenas identificadas pelos nomes vulgares.

—**AMARELO** — Ingá-l.

—**ANGICO** — Angico.

—**ARQUEADO** — Ingá ferradura.

—**CAETITÔ** — Ingaraná.

—**CIPÓ** — Ingá (I. edulis).

INGAÇU, INGA-AÇU — *Inga ciliamomea* Spruc. Leguminosas com as características do Ge., de vagens longas e largas.

INGÁ CURURU — Mococona.

—**DA TERRA FIRME** — Ingaraná.

—**DE QUATRO FOLHAS** — Ingá-l.

—**DOCE** — Ingá (I. edulis).

—**FERRADURA** — *Inga sessilis* M. Leguminosa com as características do Ge., porém de vagens recurvadas.

Fos compostas e sub coriáceas. Combustível.

—GRANDE — Ingaçu.

INGA-E, INGA-I — *Inga bahiensis* Sprun. Leguminosa arbórea, copudia, com pequenas vagens édulas, achatadas e poucas sementes.

—MACACO — Ingaçu.

—MIMOSO — Ingá-i.

—MIRIM — *Inga cylindrica* M. Leguminosa com as características do Ge. Frs. cilíndricos e édulas.

—MOCOCONA — Mococona.

—OPEAPIBA ou OPEAPUBA — Ingá (*I. edulis*).

—RABO DE MICO — Ingá (*I. edulis*).

INGARANA — *Pithecellobium cauli-florum* M. Leguminosa arbórea. Fos compostas de 6 a 8 foliolos; fls. ao longo dos ramos, após a queda das fos; vagem longa. Lenho para carpintaria.

INGASINHA — Ingaraná.

INGÁ TIMBÓ — Ingá (*I. edulis*).

—VERDADEIRO — Ingá (*I. edulis*).

INGLÊS — Landim.

INGUAÇU — Andá-açu.

INHABENTO — *Ora pro nobis*.

INHAIBA — *Chytroma* sp. (C. *jarana* Hub?). Lecitidácia de grande desenvolvimento e fornecendo mastros para embarcações. Fr capsular — pixidiforme — parecido com o da Sapucainha. Tem idêntico apelido a Canela preta (*N. mollis*) e outra Lecitidácia, a *Lecythis olla-ria* L.

—DE REGO — Inhaiba.

INHAME — Denominação de espécies de Aráceas, Dioscoriáceas e, raramente, de outras, como as Amarilidáceas. Tem geralmente esse apelido na Bahia as Dioscoriáceas; os das Aráceas são mais conhecidos por Carás e outros nomes vulgares. Aqueles são sarmentos anuais, com tuberas volumosas — rizomas — e nutritivas. Os Carás, de menor volume, dão bulbos também nutritivos e saborosos e são erbáceos.

—BRANCO — Taioba.

—DA COSTA — *Dioscorea aculeata* L. Dioscoriácia, com tuberas subterrâneas nas mesmas condições do I. de Angola.

—DA GUINÉ — Inhame da Costa.

—DE ANGOLA — *Dioscorea bulbifera* L. Dioscoriácia de grande desenvolvimento. Além das tuberas sub-

terrâneas, até de 10 quilos, apresenta outras pequenas e globoideas, ao longo dos ramos, todas de mesmo valor nutriz.

—DE SÃO TOMÉ — *Dioscorea sativa* L. Dioscoriácia do mesmo tipo dos congêneres.

—DE TAIORA — Taioba.

—FIGADO DE PERU — *Dioscorea latifolia* Bth. Dioscoriácia. Latifólios lanciolados; fls unisexuadas e fr capsular. Ao longo dos ramos, formam-se pequenos tubérculos comíveis, da cor e configuração do fígado das aves.

—GIGANTE — Inhame japonês. Pertencendo à Fa das Aráceas, melhor lhe cabe o nome de Cará gigante, pois somente entre os Carás merece tal sobrenome.

—JAPECANGA — Inhames das Dioscoriáceas caracterizados pelos longos rizomas.

—JAPONÊS — *Colocasia esculenta* Schoot. Arácea de grande desenvolvimento. Latifólios longo peciolados e radicantes. Além da tubera principal, formam-se muitas outras, todas elas comíveis e saborosas. Serve também para sombriar o Cauê nas primitivas fases de crescimento.

—ROXO — *Alocasia* e especialmente o *I. japonênsis* que tem essa coloração nas tuberas e nas fos.

—SAPATEIRO — Inhame de Angola.

—TARO — Inhame japonês e Taioba.

INHANDUVA — Espinho de vintem.

INHAPECANGA — Japecanga.

INHARÉ — Apé, Mururé e suas afins.

INHAUBA — Inhaiba.

INIÁ — Castanha do Pará.

INJMBOI — Carniça.

INQUIRÍ — Sensitiva.

INQUIRIOMANO — Carniça.

INQUIRITI — Jequiriti.

IPÊ — Denominação de uma Borrágincia, o *I. branco*, de certas Leguminosas e especialmente de Bignoníacées. Embora as Leguminosas — *Macrolobium biflorum* Aubl. e *M. hymenaeoides* Wild. — sejam consideradas como Ipês verdadeiros, tal qualificativo cabe a certas Bignoníacées do Ge *Tecoma*. Estas, tornaram-se também conhecidas por Pau d'arco ou Piúva e mesmo por Caroba. Existe também desta Fa, de outro Ge

- **Cybistax, Paratecoma, Zeyhera** — com o mesmo apelido. A sp tipo é *Tecoma ipe* M. Árvore elegante e ornamental, com fós compostas palmadas, fls violáceas em cachos — “fl nacional” — e fr capsular. A coloração da fl ou do lenho, oportunou diferentes designações das sps e vars.
- **AMARELO** — *Tecoma umbellata* Sond. Bignoniácia de médio porte, confundida com o Ipê (*T. ipe*). Fós sagitadas e panículas amarelas, multifloras. E' também considerada como *T. ochracea* DC., ou Mandiocai.
- **BOIA** — Moçutáiba.
- **BRANCO** — *Patagonia americana* L. var *bahiensis* Moric. Borraginácia arbórea com fós elípticas, fls em pequenos rácimos e frs envoltos pelo cálice. Com o mesmo apelido: *Tecoma odontodiscus* Bur., A Caroba da fo verde e os Velames, donde a imprecisão do apelido.
- **BRANCO DO SUL** — Ipê branco (*P. americana*).
- **CABELUDO** — Bucho de boi.
- **CAVATAN** — Ipê (*T. ipe*) e I. amarelo.
- **COMUM** — Ipê e I. amarelo.
- **DA FLOR VERDE** — Caroba da fo verde.
- **DE SAO PAULO** — Ipê (*T. ipe*).
- **DO BREJO** — Ipê amarelo.
- **ESCURO** — Ipê roxo.
- **MANDIOCA** — Caroba da fl verde.
- **MIRIM** — Caroba da fl verde.
- **PAVÃO** — Caroba da fl verde.
- **PIRANGA** — Ipê roxo.
- **PRETO** — Bucho de boi e especialmente o Ipê roxo.
- **ROSA** — Ipê roxo.
- **ROXO** — *Tecoma heptaphylla* M. Bignoniácia muito ornamental. Ramos quadrangulares; fós compostas, de 5 a 7 folíolos, que caem na floração; fr capsular.
- **TABACO** — Ipê (*T. ipe*) e o *T. chrysotricha* M. Bignoniácia arbórea, frondosa e com fls amarelas.
- **TARUMAN** — Barauna e Brauna.
- **UNA** — Ipê roxo.
- **UVA** — Ipê das Bignoniáceas, indistintamente.
- IPECA** — Denominação de muitas sps de Fas diversas, com propriedades eméticas, dentre outras, obtidas de suas raízes ou rizomas. As ver-

dadeiras, mais ricas em “emetina”, são Rubiáceas, podendo-se nesse rol incluir as Violáceas. As falsas, que se contam por dezenas, e identificadas por diferentes sobrenomes são especialmente destas Fas: Acantháceas, Asclepiadáceas, Euforbiáceas — *Euphorbia ipecacuanha* L. —, Nictagináceas — *Boerhavia diffusa* L., Malpighiáceas — *Heteropterys pragua* V. — e Poligáláceas. Mesmo entre as Rubiáceas, numerosas deixam de ser as legítimas Ipecas: Cipó cruz, *Diodia polymorpha* Cham., *Machaonia brasiliensis* C. Sch., *Manettia cordifolia* M., *Richardsonia rosea* Gomes, dentre outras. Ipeca, Ipecacuanha e Poia são apelidos equivalentes, no entanto reserva-se o segundo para as consideradas legítimas. Vid Poia.

— **AMILÁCIA** — Ipeca falsa. Vid Ipeca.

— **BASTARDA** — *Ruelia bahiensis* Moric. Acantácia erbácia e ramosa. Fós lanceoladas; fls sulfurinas e axilares. Tem o mesmo apelido a Barba de S. Pedro, sendo que muitas Ipecas falsas estão nesse caso.

— **BRANCA** — Purga do campo.

— **BRAVA** — Cega olho.

— **DA PRÁIA** — Purga do campo.

— **DAS ANTILHAS** — Cega olho.

— **DO CAMPO** — Vid Ipeca (*R. rosea*).

— **FALSA** — Vid Ipeca.

— **RASTEIRA** — Vassoura de relógio (Borreria).

— **RELOGIO** — Vassoura de relógio (Borreria)..

IPECACOANHA, IPECACUANHA — Eeva ipecacuanha (Brotero) Stand. muito conhecida por *Uragoga ipecacuanha* Baill, dentre outros nomes científicos. Rubiácia erbácia de ras vermiculares, fós ovátares, fls solitárias e fr bacálio. E' estimada como a genuína Ipecacuanha, pelo maior teor em emetina, retirada de suas ras. Específica da amebiase, da leishmaniose e das hemoptises. Entre as Rubiáceas contam-se as seguintes sps: *Diodia polymorpha* Cham e Schi., *Manettia ignita* Schum., *Borreria capitata* DC., *B. verticillata* Meyr., existentes na Bahia. São Ipecacuanhas das Violáceas o Cipó sumo e a Purga do campo.

— ANELADA — Ipecacuanha (Evea).
 — BRANCA DE CAIENA — Purga do campo.
 — DE CUIABÁ — Ipecacuanha (Evea).
 — DE MARAJÓ — Purga do campo.
 — DE MATO GROSSO — Ipecacuanha (Evea).
 — DO BRASIL — Ipecacuanha (Evea).
 — OFICIAL — Ipecacuanha (Evea).
 — ONDEADA ou ONDULADA — Vassoura de relógio (Borreria).
 — PRETA — Ipecacuanha (Evea).
 — VERDADEIRA — Ipecacuanha (Evea).
IPU — Batata de purga.
IRACÁ — Bombonassa.
IRAIRANDIIRA — Landim.
IRATACACA — Tipí.
IRATINGUI — Ivitinga.
IRI — Brejauva.
IRICURI — Nicurí.
IRINO — Pau concha.
IRIRIBÁ — Potumujú.
ROSA — Araribá rosa.
VERMELHA — Quina vermelha do Brasil.
IRIS — *Cypella longifolia* Klatt. Iridácia erbácia de fls azuis.
ITABURANA — Peroba da Bahia (*S. nitens*).
ITAL — Saboeiro.

ITAMBARANA — Peroba do Brasil (*S. nitens*).
ITAPICURO, ITAPICURÓ — Geniorrhachis marginata Taub. Leguminosa florestal, de grande porte. Fos compostas; vagens duras. Madeira de lei. Apresenta a var. o Itapicurusinho.
PRETO — *Machaerium sp.* Leguminosa.
ROXO — Pau roxo.
ITAPINHOA — Tapinhoã.
ITAUBA — *Ocotea megaphylla* Meis. Laurácia arbórea. Madeira de lei para construções.
CAMARA — Cambará vermelho.
ITÓ — Bilreiro.
ITÚ — Pau ferro.
IUCA — Árvore da pureza.
IUQUIRÍ — Sensitiva.
IURUMBEBA — Urumbeba (Juru-beba).
IVANTINGI — Ivitinga.
IVIRO — Guipá.
IVITINGA — *Luehea grandiflora* M. Zuc. Tiliácia de grande envergadura. Fos ovalares e discolores; fls albas em rácimos; fr capsular. Adstringente. Córtez fibroso. Conhecida também por Açoita cavalo.
IVURANHEM — Buranhem.
IVURAREMA — Pau d'alho
IXORA — Alfinete de noiva.

J

JABAI — Tamarindo.

JARAO — Gervão.

JABORANDI — O verdadeiro, conhecido fornecedor da pilocarpina, é Rutácia, do Ge *Pilocarpus*, estando nesse caso o conhecido sudorífico *P. pennatifolius* Lem. e spp. congêneres. Pertencentes à dita Fa e à das Piperácias, também encontram-se na Bahia outros Jaborandis — falsos — com as virtudes do verdadeiro (Lofgren): Alfavaca de cobra (*M. trifoliata*), Aperta ruão e Jaborandi da mata virgem.

—**DA MATA VIRGEM** — *Ottonia anisum* Mert. Piperácia que se confunde com o Jaborandi falso, sendo aliás sp erbácia e menos ativa que o J. verdadeiro.

—**DAS ALAGOAS** — Jaborandi falso.

—**DAS PIPERACIAS** — Jaborandi falso.

—**DAS RUTACIAS** — Jaborandi (*P. pennatifolius*).

—**DAS TRES FOLHAS** — Maricotinha, também conhecida por Alfavaca de cobra.

—**DO CEARÁ** — Jaborandi (*P. pennatifolius*).

—**DO DR. COUTINHO** — Jaborandi da mata virgem.

—**DO MATO** — Aperta ruão.

—**DO NORTE** — Jaborandi (*P. pennatifolius*) e J. da mata virgem. Impreciso.

—**DO PARÁ** — Maricotinha.

—**FALSO** — *Piper jaborandi* V. Piperácia arbustiva. Ras tortuosas; cau geniculado; fos de sabor acre e inflorescência em espiga — amêntilho. Sudorífico, mais fraco que o verdadeiro, e sialagogo.

—**MANSO** — Jaborandi da mata virgem.

—**VERDADEIRO** — Jaborandi (*P. pennatifolius*).

JABORANDIRANA — Jaborandi falso.

JABOTÁ — Fruto amargoso.

—**DE CABINHO** — Jaboticaba.

—**DE SÃO PAULO** — Jaboticaba.

JABOTAPITÁ — Batioutá.

JABOTÁ VERDADEIRO — Fruto amargoso.

JABOTI-CAK — Pega pinto do miudo.

JABOTICABA, JABOTICABEIRA — *Myrciaria jaboticaba* Berg., Mirtácea arbórea. Fls albas ao longo dos ramos. Embora decorativa, vale pelos frs — drupas — de cor arroxiada e de grato sabor. Anti astmática. Madeira de segunda. É também conhecida por *Myrcia caniflora* M. Há outras vars.

—**AÇU** — Jaboticaba.

—**DA CAMPINA** — Jaboticaba.

—**DE CABINHO** — Jaboticaba.

—**DE CABOCLO** — Jaboticaba.

—**DE CIPÓ** — Parreira brava.

—**DE MINAS** — Jaboticaba.

—**DE SÃO PAULO** — Jaboticaba.

—**DO CAMPO** — Mundururú.

—**DO CERRADO** — Mundururú.

—**DO MATO** — Jaboticaba.

—**MIUDA** — Jaboticaba.

—**PONHÉMA** — Jaboticaba.

—**SABARÁ** — Jaboticaba.

—**TUHA** — Jaboticaba.

JAROTIPUTÁ — Batiputá.

JABUMBA — Zabumba.

JABUTÁ — Jabolá (Indistintamente)

JABUTÍ — *Eriisma calcaratum* Warm. Voquisiácia arbórea. Fos inteiras, com nervura marginal; fls de corola calcinada e fr capsular indecisa. Lenho de segunda.

JACA, JAQUEIRA — *Artocarpus integrifolia* L. Morácia de rápido e grande desenvolvimento. Fos inteiras; fls caulinares, produzindo volumosas infrutescências — polidrupas — saborosas. Conforme a consistência da porção carnosa das drupas, ha Jaca dura e J. mole.

—**DA BAHIA** — Jaca.

—**DA ÍNDIA** — *Araticum* (Do brejo e spp congêneres).

—**DE POBRE** — *Araticum* (Do brejo e spp congêneres).

- DO PARÁ — Graveola.
JACAMINHA — Marianinha.
JAÇAPÉ — Capim cheiroso (K. odorata).
JAÇAPUCAIA, JAÇAPUCAIO — Sapucáia.
JAÇAPUCARI — Sapucáia.
JACARANDÁ — Designação que deveria ser unicamente conferida às Bignoníacias do Ge Jacaranda, também conhecidas por Carobas. No que se entende com a sua excelente madeira, o verdadeiro Jacarandá pertence à Fa das Leguminosas, Ges Dalbergia e Machaerium; no que se entende com sps medicinais são Bignoníacias.
—**ATAN** — Jacarandá negro e, especialmente, o J. rosa.
—**BAGRE** — Jacarandá rosa.
—**BANANA** — Jacarandá branco.
—**BICO DE PATO** — Sete casacas.
—**BRANCO** — Platypodium elegans Vog. Leguminosa de médio desenvolvimento. Fos pinadas; fls em rácimos amarrados; vagens oblongas. Madeira clara, com manchas pardas. Ornamental.
—**CABIUNA ou CAVIUNA** — Jacarandá negro.
—**CAPITÃO** — Pacari.
—**CAROBA** — Caroba guaçu.
—**DA BAHIA** — Jacarandá negro.
—**DA FLOR ROXA** — Caroba guaçu.
—**DA SERRA** — Caroba do campo.
—**DO CAMPO** — Jacarandá branco (Impreciso porque compete aos Jacarandas em geral).
—**MIMOSO** — Caroba guaçu.
—**NEGRO** — Dalbergia nigra F. All. Leguminosa de elevado porte. Cau lérme; fos compostas de foliolos minimíssimos; fls caulinares; vagens chatas. Com o mesmo apelido o *Machaerium incorruptibile* F. All. Leguminosa arbórea. Cau com fos de estípulas espinescentes e compostas do 2.º grau; fls axilares. As duas sps fornecem a preciosa madeira tão só conhecida por Jacarandá — Ebane noir — resistente e incorruptível.
—**PARDO** — Jacarandá roxo (M. firmum).
—**PAULISTANO** — Bignonia brasiliensis Lamk. Bignoníacia arbórea, fornecendo madeira incorruptível e para obras de luxo, também denominado J. negro, com o qual se confunde.
—**PRETO** — Jacarandá negro.
- * É a opinião valiosa de G. Kuhlmann. Para esse eminent botânico, as sps do Ge Jacaranda devem ser grafadas vulgarmente como Jacarandas. Os Jacarandas são Leguminosas.
- PUTIAN** — Jacarandá rosa.
—**ROSA** — Machaerium allemani Bent. Leguminosa com as características do Jacarandá negro, do Ge *Machaerium*. Importante essência florestal, duríssima e incorruptível, de lenho cor de rosa.
—**ROXO** — Caroba guaçu e *Machaerium firmum* Bent. Leguminosa do mesmo tipo dos Jacarandas desta Fa. Lenho para marcenaria, cor de rosa com veias pretas.
—**TAN** — Jacarandá rosa.
—**VERDADEIRO** — Vid Jacarandá. Há quem considere como verdadeiro, não as Leguminosas desse grupo e sim a Jacaranda brasiliana, registrada como J. paulistano.
—**VERMELHO** — Jacarandá rosa.
—**VIOLETA** — *Machaerium violaceum* F. All. Leguminosa do grupo dos Jacarandas verdadeiros. Lenho escuro, para obras de luxo.
—**JACARANDAZINHO** — Jacarandá branco.
—**JACARATIÁ** — *Jacaratia spinosa* DC. ou *Carica digitata* Poep., que diz de seu parentesco com o Mamoeiro. Caricácia silvestre, com o aspecto da barriguda de espinho, no tocante às fos e ao cau. Frs — bagas comíveis — parecidos com os da sp congênere referida, sendo menores. Lactífero.
—**SETE FOLHAS** — Jacaratá.
—**JACARÉ** — *Enterolobium monjolo* M. Leguminosa arbórea e armada com picantes em fileiras. Fos compostas; fls em cachos; fr vagens. Lenho alvo para marcenaria. Tanífero, adstringente. Outra sp da mesma Fa: *Piptadenia communis* Bent. Arboreta com fos compostas e luzidias; fls em espigas axilares e cachos terminais; vagens. Bom combustível. Tanífero.
—**CATINGA** — Jacaré do mato.
—**DA SERRA** — Caroba do campo.
—**DO CAMPO** — Capororoca comum e Galinha choca.
—**DO MATO** — *Weigelia detergens* M. ou *Cybianthus detergens* M. Mircinácia arbórea, de fos inteiras e coriáceas, fls em longos rácimos; Drupa. Resinífero. Combustível. Tem o mesmo apelido a Capororoca.
—**IBA ou UIBA** — Landim.
—**NEGRO** — Jacarandá negro (D. nigra).

JACAREUBA, JACAREUVA — Jacaré e Landim. Impreciso.

JACATIÁ — Jacaratá.

JACATIRÃO — *Miconia brasiliensis* Tr. Melastomácia arbórea, com as características da Fa. Suas bagas — pretas — dão matéria corante preta ou violúcia. Lenho para obras externas. Tanígero.

—**DE CAPOTE** — Quaresma.

JACÉ — Melancêia.

JACEA — Amor perfeito.

JACINTO — *Hyacinthus orientalis* L. Liliácia erbácia e bolbosa, apresentando muitas var., consoante a coloração de suas fls, que ainda podem ser singelas ou dobradas. As vistosas e abundantes inflorescências, necessitam de tutores.

—**DAS INDIAS** — Angélica dos Jardins.

JACITARA — Titara.

—**AÇU** — Titara.

JACOARÁ MURU — Grão de galo (*C. superba*).

JACOTIRÃO — Jacatirão.

JACUACANGA — Cana de macaco e Heliotrópio. Impreciso.

JACUANDI — Landim.

JACUANGA — Cana de macaco.

JACUARA MURU — Grão de galo (*C. superba*).

JACUIBA — Jequitibá (Indistintamente).

JAGOARAQUINHA — Aguaraquinha.

JAGOIRANA — Visgueiro.

JAGUARÁ MURU — Grão de galo (*C. superba*).

JAGUARANDI — Jaborandi (Indistintamente).

JAGUATIRÃO — Jacatirão e impropramente Jataí.

JALÃO — Jambolão.

JALAPA — Batata de purga.

—**BASTARDA** — Batata de purga.

—**BRANCA** — Batata de purga.

—**BRASILEIRA** — Batata de purga.

—**COMPRIIDA** — Bonina.

—**DE LISBOA** — Batata de purga.

—**DE SÃO PAULO** — Batata de purga.

—**DO MATO** — Bonina.

—**FALSA** — Bonina.

JALAPÃO — Batata de purga.

JALAPA VERDADEIRA — Bonina.

—**VERMELHA** — Erva venenosa.

JALAPINHA — *Ipomoea sinuata* Orte. Convolvulácia volvulus, de

consistência erbácia. Fos palmatinervias; fls axilares; baga. Sp purgativa.

JAMALAC — Jambo vermelho.

JAMARACÁ, JAMARUCÚ — Figueira da Índia, porém mais cabível ao Mandaracu.

JAMBA — Agrião do Brasil.

JAMBO, JAMBEIRO, JAMBOEIRO (amarcelo) — *Eugenia jambosa* L. Mirtácia de bom desenvolvimento. Fos luzidias; fls albas; fr drupácia, esferóide, édula e perfumoso. Lenho muito resistente.

—**AÇU** — Espinafre.

—**AGUADO** — Jambo branco.

—**AMARELO** — Jambo.

—**BRANCO** — *Eugenia aquae* Bur. Mirtácia com os caracteres do Jambo, apresentando porém frs alongados, áivos, inodoros e sem sabor. Madeira de lei.

JAMBOCHA — Jambo vermelho.

JAMBO DA ÍNDIA — Jambolão.

—**DA TERRA** — Jambo.

—**DE MÁLAGA** — Jambo vermelho.

—**DO PARA** — Jambo vermelho.

—**ENCARNADO** — Jambo vermelho.

JAMBOL — Jambolão.

JAMBOLANO — Jambolão.

JAMBOLÃO — *Eugenia jambolana* L. Mirtácia copuda, umbrosa e ornamental. Fos compostas; fls axilares; frs drupáculos, esferoides, roxo escuros, apetecido peças crianças. Eupéptico e adstringente, empregado no diabetes.

JAMBOLEIRO — Jambolão.

JAMBO MORENO — Jambo (*E. jambosa*).

—**ROSA** — Jambo (*E. jambosa*). O apelido é procedente, pois seus frs bem maduros são roséos.

—**VERMELHO** — *Eugenia malaccensis* L. ou *E. prodigiosa*. Mirtácia de grande crescimento, piramidal e decorativa. Fos vernicosas; fls caulinares; frs — drupas piroides — violáceos, abundantes, de polpa branca e pouco saborosos.

JAMBÚ — Cravo do campo.

—**AÇU** — Espinafre, porém mais cabível ao Agrião do Brasil.

—**RANA** — Agrião do Brasil.

JAMBUL — Jambolão.

JAMBURA — Imburana de cheiro.

JAMBURANA — Imburana (Indistintamente) e secundariamente o Cravo do campo.

JAMBURF — Baba de boi (*C. romanoffiana*).
JAMELÃO — Jambolão.
JANAUNA — Plumiera drasticaria M., atualmente *Himanthus obovata* Wood. Apocinácia alta. Latifólios coriáceos e fls em corimbos. Látex tóxico em grandes doses e usado nas moléstias do fígado. Dá matéria corante. Lenho para carpintaria. Purgativo e febrífugo.
JANDIROBA — Nandiroba.
JANGADA, JANGADEIRA — Pau de jangada.
 —BRANCA — Pau de jangada.
 —DO CAMPO — Grão de gallo.
JANIPA — Flor de coral (*J. multifida*).
JANIPABA, JANIPAPO — Genipapo.
JANDIPARANA, JANIPARANA — Pau fedorento.
JANIPARANDUBA, JANIPUARANDUBA — Pau fedorento.
JANIVA — Mandioca.
JANIVARANA — Imburana (Indistintamente).
JAPECANGA — *Smilax japecanga* Gris. Liliácia sarmentosa e silvestre. Cau armado; fos coriáceas e lobadas; fls em umbelas; bagas. É sp geralmente confundida com a *Salsaparilla* e figurando com muitos nomes científicos. Vale pelas ras, febrífugas, depurativas e tónicas.
 —VERMELHA — *Smilax papiracea* Poir. Liliácia do mesmo tipo da Japecanga.
JAPERAÇABA, JAPERACAVA — Piaçava.
JAPICAF — Botão de ouro (*Xyris*).
JAPICURU — Bacupari do campo.
JAPONIA — Ameixa do Japão.
JAPOTÁ — Fruto amargoso.
JAPUCALIA — Sapucáia (Indistintamente).
JAQUATIRAO — Jacatirão.
JARACATIÁ — Jacaratá.
JARAGUÁ — Capim Jaraguá.
JARAMACURU — Mandacaru (Indistintamente).
JARANA, JARANÁ — *Eschweilera*. jarana. Lecitidácia arbórea.
JARANDEUA, JARANDIU — Ingávara e Ivtinga (Impreciso).
JARANGANHÁ — Cará de caboclo.
JARAPÉ — Capim cheiroso e Capim sapé (Impreciso).

JARATACACA, JARATICACA — Manacá.
JARAUBA — Janauba.
JARBÃO — Gervão.
JARERÉ — Amendoin.
JARIVA — Baba de boi (*C. romanoffiana*).
JARRA — Milhomens.
 —CAPACETE — Milhomens, especialmente a *A. brasiliensis*.
JARRINA, JARRINHA, JARRINHO — Milhomens (Indistintamente).
JARRO DO DIABO — Milhomens, especialmente a *A. cymbifera*.
JARVÃO — Gervão.
JASMJM — Denominação de inúmeras esp. até de Fas diversas. O perfume de suas fls poderia criar entre elas alguma afinidade, se não faltasse em algumas. Os mais autênticos representantes encontram-se na Fa das Oláceas e no Ga Jasminum: *Jasminum odorantissimum* Vahl. Trepadeira, de fos miudas, fls de corola hipocrateriforme, albas e odorantes.
 —AZUL — Emilia.
 —BOGARI — Bogari.
 —BORROLETA — Lírio do brejo.
CAJANA (Correnteia de Cayenne) — Plumiera tricolor. Apocinácia arbórea e lactífera. Cau bifurcado; fos longo lancioladas. Muito ornamental pelo perfume e colorido — multicolor — de suas corolas carnosas. *Semper fiorens*. Existe vars alba, rosea e rubra.
CORAL — Alfinete de noiva.
DA BAIIA — *Jasminum asoricum* L. var *bahiensis*. Oleácia sarmen-tosa, longa e ramosa. Trífolios lanciolados e fls albas, de coroa hipocrateriforme, formando umbelas.
DA ITÁLIA — *Jasminum floribundum* R. Br. Oleácia parecida com o Jasmin da Bahia, porém com fls maiores — *J. grandiflorum* L., como também é conhecido. Tem o mesmo apelido o Arrebenta cavalo.
DA NOITE — Coerana.
DA TERRA — Sabonete de soldado.
DE CACHORRO — *Tabernaemontana coronaria* Willd. Apocinácia arbustiva e elegante. Fos lancioladas, com a pagina dorsal descolorada; fls axilares hipocrateriformes, alvissimas, de brilho porcelânico e

sem perfume. Tem ainda esse apelido o Sabonete de soldado.

—DE CAIENA — Jasmim Caiana.

—DE ESPANHA — Jasmim da Bahia.

—DE LEITE — Jasmim de cachorro.

—DE SÃO JOSÉ — Alfinete de noiva.

—DE SOLDADO — Sabonete de soldado.

—DE VIUVA — Capela de viuva.

—DO BREJO — Lírio do brejo.

—DO CABO — *Gardenia florida* L. Rubiácia arbustiva, elegante e cultivada como ornamento. Flos ovalares; fls em cachos, notáveis pela beleza, brancura e perfume de suas corolas dobradas. A sp mais generalizada é a *Gardenia jasminoides*.

—DO MAR — Boa noite (*Vinca*).

—DO MATO — Limão do mato.

—DO PARAGUAI — Manacá.

—DO RIO — Jasmim da Bahia.

—DOS AÇORES — Jasmim da Bahia.

—FLORIDO — Jasmim do Cabo. Embora o apelido corresponda ao nome científico, torna-se impreciso por caber a outros Jasmims.

—IMPERIAL — Alfinete de noiva.

—MANACÁ — Manacá.

—MANGA — Jasmim caiana.

—MANTEIGA — Jasmim calena e J. de cachorro.

—PORCELANA — Jasmim de cachorro.

—REAL — Jasmim da Bahia.

—SAMBAC — Bogari.

—TROMBETA — *Tecoma radicans* Jus. Bignoniácia semi trepadeira, ramosa e ornamental para caranchões. Flos compostas; fls encarnadas em corimbos; fr capsular. O apelido cabe às sps do mesmo Ge e ornamentais.

—VERDE — Coersana.

—VERMELHO — Alfinete de noiva.

JASPE SANGUÍNEO — Heliotrópico (*H. peruvianum*).

JASSAI — Jatai (Indistintamente).

JASSARA — Assai.

JATABUÇU — Taioba.

JATAI — *Hymenaea courbaril* L. Leguminosa de grande porte e frondosa. Flos compostas; fls pequenas e em cachos; frs vagens, curtas e grossas, com sementes envoltas em polpa — arilo — comível. A sp dá à selva conhecida como "resina

de Jatobá", "goma copal" e "Jatai-cica", industrial e tônica, balsâmica e anti blenorragica. Madeira de lei. Há sps congêneres com o mesmo apelido, inclusive o Jataizinho.

—ACU — Jatai.

—AMARELO — Grapeapunha.

JATAIBA — Jatai.

JATAI GRANDE — Jatai.

—PEBA — Jatai.

—MONDÉ — Pau roxo e Jatai.

—UBA, TATAI UVA — Jatai.

JATAL — Taioba.

JATAUBA — Bilreiro e óleo pardo.

JATAZ — Taioba.

JATEI — Jatai.

JATI — Jatai e especialmente o Jatobá capão.

JATIBA — Jatai e Jatobá.

JATOBÁ — Jatai.

—CAPÃO — *Hymenaea stignocarpa* M. Leguminosa parecida com o Jatai e quasi com as mesmas propriedades. Estão em caso idêntico, outras sps do mesmo Ge como a *H. oliveriana*.

—DE ANTA — Jatai.

—DE CASCA FINA — Jatobá capão.

—DE CATINGA — Jatobá capão.

—DE PORCO — Jatai.

—DO CAMPO — Jatobá capão e Leguminosa *Cassia bianchetti Bent.*

—MIRIM — Copaiba verdadeira.

—ROXO — Jatai.

—TRAPUCA — Jatai.

—VERDADEIRO — Fruto amargoso, Jatai e Jatobá. Impreciso.

JATOBÉIRA — Jatobá em geral e especialmente o J. do campo.

JATUABA, JATUAMBA — Bilreiro.

—BRANCA — Bilreiro.

JATUATUBA, JATUAUBA — Bilreiro.

—BRANCA — Bilreiro.

JATUBÁ — Jatobá (Indistintamente).

JAUABA — Jurubeba.

JAVARANA — Imburana (Indistintamente).

JECUIBA — Jequitibá.

JECUIORITO — Jequiriti.

JEFINGO — Jequiriti.

JEGEREUCU, JEGERECUM, JEJERECU — Pegerecu.

JEIJJAPA — Bombonassa.

JEJUIRA — Aroeira em geral, e Gonçalo Alves.

JENEUNA — Geneuna.

JENIPAPINHO — Cipó branco.
JENIPOPO, GENIPABO, GENIPABEIRO — Genipapo.
JEPIJAPA — Bombonassa.
JEQUIRANA — Favinha de capoeira.
JEQUIRITI — Abrus precatorius L. Leguminosa volvel e inculta. Fos compostas; fls em cachos axilares; vagens, com sementes encarnadas e mancha preta, encerrando a "ambrina", substância — toxialbumina — muito venenosa. Ensaiada na cura do tracoma.
JEQUITIBÁ — Couratari legalis M., o "rei das florestas". Um belo exemplar dessa vigorosa essência serve de distintivo à "Sociedade dos Amigos das Árvores". E' uma Lecitidácia de grande porte e envergadura. Há sps congêneres com o mesmo apelido, mesmas fós simples e frs pixídios.
BRANCO — Jequitibá.
ROSA — Jequitibá. Tambem conhecido por Cariniana brasiliensis Cas. Talvez var de Jequitibá, que com esse apelido se diferencia da amarela e da branca. Lenho rúseo e madeira de lei. Tanígero e apresentando fibras no córtex.
VERMELHO — Jequitibá rosa.
JEQUITIVÁ — Jequitibá (Indistintamente).
JERAMU — Geremu.
JERATACA, GERATATACÁ, GERA-TACAIA — Manacá.
GEREMA — Jurema.
JEREREBOU, JERERECU, JERE-RECUM — Pegerecu.
JERIBA, JERIBÁ — Baba de boi (C. romanzoffiana).
JERICÓ — Gericó (As duas sps).
JERIMÓLIA — Graveola.
JERIMÚ, JERIMUM — Geremu.
JERIQUITI — Jequiriti.
JERIVA, JIRIVÁ — Baba de boi (C. romanzoffiana).
JEROTACA — Manacá.
JERUINA — Aderno e Gonçalo Alves.
JERXELIM — Gergelim.
JETAI — Jatai (Indistintamente).
DE PERNAMBUCO — Jatai (H. courbaril).
DO PIAUÍ — Jatobá capão.
JETAIBA, JETAIBO, JETAIUBA, JETAIUVA — Jatai (Indistintamente).
JETAICI, JETAICICA — Jatai (Indistintamente).

JETICA, JETIQUE, JETUCA — Batata doce.
AÇU, JETICUÇU — Batata de Furga.
JETIRANA, JITIRANA — Denominação vulgar de inúmeras sps de trepadeiras incultas, geralmente da Fa das Convolvuláceas.
BRANCA — Boa noite (I. bona-nox).
JETUÍ-PEBA Jatal.
JIBATÃO — Aderno e Gonçalo Alves. Melhor grafia que Gibatão.
JICARA — Assai.
JILÓ — Gilô. Melhor grafia que Gilô.
JINDIROBA — Nandiroba.
JINJURUCU — Pegerecu.
JIPABA — Bombonassa.
JIQUI — Umbú.
JIQUIRIOBA — Bredo de Santo Antônio.
JIQUIRITI — Jequiriti.
JIRIVA, JIRIVÁ, JIRUVA — Baba de boi (C. romanzoffiana).
JISSARA — Assai.
JITÓ — Bilreiro.
MIRIM — Bilreiro.
JOÁ — Arrebanta cavalo e especialmente o Juá.
BRAVO — Peito de moça.
JOÃO — Mentrasto.
BORANDI — Jaborandi (Indistintamente).
CONGO — Stigmatophyllum sp. Malpigiácia sarmentosa e praga dos terrenos, sendo muito prolífica. Ras tuberosas; fos longo lancioladas e opostas; fls amarelas em cachos umbeliformes. Varias sps do mesmo Ge.
CORREIA — Peroba (A. tomentosa).
CURTO — Mulungú (Indistintamente).
DA COSTA — Orelha de onça e Paina de penas (Impreciso).
DE MELO — Erva do diabo.
MOLE — Pisonia tomentosa Cas. Nictaginácia arboreta. Fos inteiras e opostas; fls masculinas campanuladas, femininas tabulosas; fr aquênio; madeira de segunda.
JOÁ POCA — Camapu.
JOARANA — Visgueiro.
JOÁ TI — Babá.
JOAZEIRO — Juá, Juazeiro.
JOCONGO — João congo.
JOERANA, JOEIRANA — Visgueiro.

JORGELIM — Gergelim (Indistintamente).

JORRO-JORRO — Chapéu de Napoleão.

JOSE MOLEQUE — Vernonia elegans Gardn. Composta erbácia, erecta e ruderal. Fos ásperas, lancioladas e brancas na face dorsal; flos em glomerulos axilares. Tido como digestivo.

JOSSARA — Assai.

JOVENA, JOVEVA — Jurubeba.

JUA, JUAZEIRO — Ziziphus joazeiro M. Ramnácia arbórea, fortemente armada, copudia, xerófita e rústica. Flos orbiculares; fls axilares fr — pequenas drupas edulis, que juntamente com as fos servem de alimento ao gado, mormente nas secas. Semper virens; lenho para marcenaria e carpintaria. As cinzas servem para sabão. Sp amarga e astringente.

—**AMARELO** — Babá.

—**ARREBENTA CAVALO** — Arrebenta cavalo (*S. aculeatissimum*).

—**BRAVO** — Arrebenta cavalo (*S. aculeatissimum*).

—**DE CAPOTE** — Camapu.

—**DO NORTE** — Babá.

JUAPECANGA — Japecanga.

JUA-POCA — Camapu.

JUAUANA — Jurubeba.

JUAZEIRO, JUAZEIRO GRANDE — Juá.

JUBAI — Tamarindo.

JUBAO — Tamarindo.

JUBATAN, JUBATÃO — Aderno e Gonçalo Alves.

JUBEBA — Jurubeba e o *Solanum insidiosum* M. Sp congénere e do mesmo tipo da Jurubeba.

JUCÁ — Pau ferro.

JUCAINA — Pau ferro.

JUÇAPÉ — Capim santo e especialmente o *C. sapé*.

JUCAREUBA, JUCAREUVA — Landim.

JUCERI BABÁ — Babá.

JUDEU ERRANTE — Viuvinha.

JUERANA — Visgueiro.

JUIRATUCA — Castanheiro do Pará.

JUIZ DE PAZ — *Acanthospermum xanthoides* DC. Composta erbácia, dos terrenos descobertos. Cau bifurcado; flos amarelas em capítulos; fr aquênio com fortes picantes. Sp prolifera; febrífuga, emoliente e diurética.

JUJUBA, JUJUUBA — *Ziziphus jujuba* Gaert. Ramnácia arbórea. Frs alimentícios. Madeira de lei; córtex com matéria corante.

JULE — Parreira brava.

JUMACARU, JUMARACU — Mandacaru (Indistintamente).

JUMBEBA — *Ora pro nobis* e especialmente Jurubeba.

JUMPEBA — Jurubeba.

JUNÇA — Dandá. Na Bahia deixa de ser o *Cyperus esculentus*. Tem ainda aquele apelido o Capim de cheiro.

—**CHEIROSA** — Dandá.

—**DE CONTA** — Capim dandá.

JUNCINHA — Capim dandá.

JUNCO — Dandá (Impropriamente).

—**DE CANGALHA** — *Lepidosperma officinale*. Ciperácia hidrófila, de haste, vernicosas e fistulosa, terminada por coroa de espiguetas. Para cestas e cangalhas.

—**DE LAGOA** — Dandá. Impreciso, porque cabe a várias Ciperácias.

—**DE TRES QUINAS** — *Rhynchospora cyperoides*. Haste triangular de maia de 2 metros, do grupo do Piri-piri. Para estíciras. As cinzas, tidas como hemostáticas e anti desintéticas. Ciperácia.

—**DO BREJO** — Dandá, Piri-ipri e inúmeras sps afins. Impreciso, portanto.

JUNDIAI — Pau terra.

JUNIPAPO, JUNIPAPEIRO — Genipapo.

JUNQUILHO — Dandá e muitas Ciperácias.

JUPATI — Jatai e Rapia (Impreciso).

JUPEBA — Jurubeba.

JUPICAL — Botão de ouro (*Xyris*).

JUPICANGA, JUPIACANGA — Japecanga.

JUPIUBA, JUPUUBA, JUPUUVA — Visgueiro.

JUQUER — Sensitiva.

JUQUERIOMANO — Carnica.

JUQUETIBA — Jequitibá.

JUQUIRI — Sensitiva.

—**ARBÓREO** — Calumbi d'água.

—**GRANDE** — Calumbi d'água.

—**RASTEIRO** — Sensitiva.

JUQUIRIRANA — Carnica.

JUQUIRITI — Jequiriti.

JUREMA, JUREMA BRANCA — *Pithecellobium diversifolium* Bent. Leguminosa arbórea e inculta. Cau

armada; folhas bipinadas; folhas em glo-mérulos. Vagem longa, apetecida pelos afins — "Árvore de macan-ço". Madeira para construções. Córtez amargo e adstringente. Apresenta vars.

— PRETA — *Acacia jurema* M. ou *Mimosa nigra*. Leguminosa arbó-rea, parecida com a J. branca, es-galhada e armada.

JUREPEBA, JURIPEBA — Jurubeba.

JURUBEBA — *Solanum panicula-tum* L. Solanácia arboreta, incul-ta e armada. Folhas palmínervas e espinhosas; folhas arroxeadas; bagas esféricas e amargas. Usada nas moléstias do fígado. Apresenta vars.

— DO PARÁ — Peito de moça.

— GRANDE — Lobeira.

— NIL — Jurubeba.

— VERDADEIRA — Jurubeba.

JURUBEBINHA — Jurubeba.

JURUIUBA, JURUJUBA — Ver-bena.

JURUMBEBA — Figueira da Índia e, mais cabível, à Jurubeba.

JURUMÓ, JURUMÓM — Gerimó. JUSSARA — Assai e mais próprio ao Palmito doce.

JUTA BAHIANA — Guaxima.

— BRASILEIRA — Papoula de São Francisco.

JUTAI, JUTAIUBA, JUTAIUVA — Jatai.

JUTAIRANA — Pau roxo.

JUTA NACIONAL — Juta brasilei-ra e Carrapicho da calçada (*T. se-mitrilobata*).

JUTE — Parreira brava.

JUTICA — Batata doce.

JUTUAIBA — Grão de gallo.

JUUNA, JUVENA, JUVERA — Ju-rubeba.

JUVIÁ — Castanha do Pará.

K

KAKI — Caqui.

KAPOK — Sumauma.

KI-OIÖ — Quídia.

L

- LABAÇA** — Bardana.
- LABAREDA** — Pingo de lacre.
- LABIRINTO** — Aveloz.
- LACRE** — Capianga.
- BRANCO** — Capianga.
- VERMELHO** — Capianga.
- LAGRIMAS DE CRISTO** — Flor do paraíso.
- DE JÓ** — Lágrimas de Nossa Senhora.
- DE MOÇA** — Lírio do brejo.
- DE NAPOLEÃO** — Raios de Júpiter.
- DE NOSSA SENHORA** — Cola lagrima-Jobi L. Gramínea sub arbustiva e ereta. Colmo ramificado; frs invaginantes; frs cariopses pequenos, lustrosos, usados para contas de rosário e muito ricos em amilácos. Tem impropriamente o mesmo apelido, a Flor do paraíso. Apresenta dezenas de vars, sendo a mais importante a conhecida por "Ma-guem-staff".
- DE SANTA MARIA** — Lágrimas de Nossa Senhora e, impropriamente, Carnica.
- LÂMPADA ELÉTRICA** — Graxa (Var síngea).
- LANCETA** — Cordão de ouro (*S. microglossa*) e a Erva botão.
- MILAGROSA** — Sumaré.
- LANDI** — Landim.
- LANDIM** — *Callophyllum brasiliense* Camb. Gutifera frondosa. Fos vernicosas, fls em pseudo umbelas e fr capsular. Lenho para construções navais; côrtez fornecendo o aromático "Bálsamo de Landim". São conhecidas as vars também denominadas Guanambi ou Granandi. Vid Guanambi.
- DO BREJO** — Landim.
- JACAREUBA** — Landim.
- LANDIRANA** — Bacuri.
- LANTANA** — Cambará (Indistintamente).
- ESPINHOSA** — Cambará vermelho.
- LANTERNA** — Candelabro (Lustre).
- LANTIM** — Landim.

- LAPACHIO** — Pau d'arco (Ipê).
- LARANAJA** — Laranja amarga.
- LARANJA, LARANJEIRA** — *Citrus aurantium* L. Sp tipo. Rutácia muito cultivada, arboreta, elegante e semper virens. O cau geralmente armado, pode ser inerme em algumas vars. Fos semi coriáceas, fls aromáticas, frs hispéricios, uma variedade de baga, nutritiva e saborosa. O nome vulgar estende-se a sps de Frs diferentes.
- AMARGA** — *Citrus aurantium* L. var amara. Vid Laranja. Cau armado; frs de polpa ou medula amarga e mesocarpo, ou albedo, espesso, servindo para compotas. Epicarpo, ou "xeste", prestante para o "Xarope de L. amargas".
- AZEDA** — Laranja amarga.
- BOCETA** — Laranja tangerina.
- BRANCA** — Tembetaru.
- CAIPIRA** — Laranja da China.
- CRAVA ou CRAVO** — Laranja tangerina.
- DA BAHIA** — *Citrus aurantium* L. var brasiliensis Tanaka. Rutácia arboreta, perpetuada por enxertia, cosmopolita e de origem bahiana. Seus frs correspondem à Laranja mais comercial do Mundo" (E. Bruck). Sobre a nomenclatura dos Citrus, a origem da Laranjeira da Bahia, seu tipo estandar e assuntos correlatos, ver art. do autor — "A Laranja da Bahia", dado à estampa no "Jornal do Comércio" do Rio de Janeiro, de 24 de Março de 1946 e, em separata, pela Secretaria de Agricultura da Bahia, no mesmo ano.
- DA CHINA** — *Citrus aurantium* L. var sinensis Galles e L. Sp rústica, de cau armado, com frs geralmente acre doces e muito encontração.
- DA INDIA** — Toranja.
- DA TERRA** — Laranja amarga.
- DE SEVILHA** — Laranja amarga.
- DE TANGER** — Laranja tangerina.

- DE UMBIGO — Laranja da Bahia.
- DE VAQUEIRO — Juá.
- DO CABULA — Laranja da Bahia.
- DOCINHA — Laranja Lima.
- IMPERIAL — Var de *Citrus aurantium* L. Frs de coloração verde e amarela.
- INDEPENDÊNCIA — Laranja imperial.
- LIMA — *Citrus aurantium* L. var *lumia*. Rutácia do mesmo tipo das sps congêneres, apresentando seus frs o sabor aproximado da Lima da Pérsia.
- MANDARINA — Laranja tangerina.
- MELANCIA — Toranja.
- MEXERIQUEIRA — Laranja tangerina.
- PERA — *Citrus aurantium* L. var *pyriformis*. Rutácia muito cultivada, pela exceléncia dos frs, de médio volume, mais elipsóides que propriamente piróides e prestantes à exportação.
- SELETA — *Citrus aurantium* L. var *depressus* Riss. Rutácia muito generalizada. Nenhuma Laranja a excede em docura. Acidentalmente apresenta umbigo.
- SELETA DA BAHIA — Laranja da Bahia.
- SELETA DA CIDADE — Laranja seleta.
- SELETA DE UMBIGO — Laranja da Bahia.
- SELETA DO RIO — Laranja seleta.
- SEM CAROÇOS — Laranja da Bahia.
- SERRA D'AGUA — Laranja lima.
- TANGERINA — *Citrus nobilis* Lour., ou *C. deliciosa* Swing. Rutácia copuda e muito produtiva. Frs de sabor sui generis e de pericarpo muito aromático.
- TORANJA — Toranja.
- VINAGRE — Limão galego.
- LARANJEIRA DO CAMPO** — Bacupari do campo.
- DO MATO — *Esembeckia febrifuga* Fus. Rutácia arbórea, copuda e elegante. Fos com as bordas espinhosas; frs capsulares, lenhosos e não comíveis; sementes oleosas e purgativas. A sp é eupéptica, febrífuga e tónica. A *Esembeckia leiocarpa* Engl. tem o mesmo no-

- me vulgar, porém os frs são oblongos e costados.
- LARANJINHA** — Espinho de vintem.
- DO CAMPO — Bacupari do campo.
- DO MATO — Porangaba.
- LAVADEIRA** — Marianinha.
- LAVANDO** — Alfazema (*L. spica*).
- LAVA PRATOS** — Fedegoso.
- LA VEGETAL** — Umbuba (*C. palmita*). Impróprio, pois cabe a inúmeras sps.
- LAVRADIO** — Mucuna.
- LEANDRO** — Espirradeira.
- LECHIA** — Litchi.
- LEITÁRICA** — Curraleira.
- LEITEIRA** — Jasmim de cachorro, Paine de penas e cabível a muitas sps, donde a imprecisão do apelido.
- LEITINHO** — Macuec (*L. heteromorpha*), a Mucucurana e sps afins.
- LEITUGA** — Alface.
- LEMbra-te DE MIM** — Não me esqueças.
- LENgue-LENgue** — Macaça.
- LENHA BRANCA** — Carne de anta.
- LENHO ALOE, ou ALOES** — Babosa.
- LENTILHA D'AGUA** — *Pistia occidentalis* Lum. Arácea natante, dos aquários. Fos espessas e radicantes; ras fasciculadas. Com o mesmo apelido a Lenácia: *Lenna gibba* L.
- DO CAMPO — *Aeschynomene brasiliensis* DC. Leguminosa erbácea, do grupo dos Carrapichos. Forragem.
- LENTISCO** — Aroeira, Almêcega.
- LEONURO** — Erva Macaé e sps congêneres.
- LEQUE** — Árvore do viajante.
- LEVANTE** — Cardamomo.
- LEVANTE** — Hortelã (*M. piperata*).
- LEVISTONA** — *Livistona olivaeformis*. Palmácia de médio porte. Fos palmadas; frs drupáceos, com o feitiço de Azeitonas, em cachos abundantes. Ornamental.
- LIAMBA** — Diamba.
- LIANA ALCATRUZ** — Jequitriti.
- LIBANOTES** — Alecrim (*R. off.*).
- LICHIA** — Litchi. Melhor que Litchi.
- LICOPÓDIO BRASILEIRO** — Pinheirinho.
- INDÍGENA** — Pinheirinho.

- LICURANA** — Sangue de dragão (*C. urucurana*). Vid Urucurana.
- LICURÍ** — Nicurí. Apelido até preferido pelos Naturajistas brasileiros.
- AÇU** — *Cocos* Campos-portuana Bondar. Palmácia robusta, de nozes saborosas, em cachos, até de 4 arrobas. Sp nova, que tem muito do Nicurí e da Baba de boi.
- LICURIOBA** — Nicurioba.
- DO SERTÃO** — Ariri.
- LIGA-LIGA** — Contraerva (*D. brasiliensis*).
- OSSO** — Contraerva (*D. brasiliensis*).
- LILÁ, LILÁS** — *Syringa vulgaris* Lam. Oleácia arbustiva e ornamental, fornecendo óleo essencial para perfumaria.
- COMUM** — Lila.
- DA CHINA** — Sabonete de soldado.
- DA ÍNDIA** — Sabonete de soldado.
- DA PÉRSIA** — Sabonete de soldado.
- DAS ANTILHAS** — Sabonete de soldado.
- LIMA COMUM** — Lima da Pérsia.
- DA PÉRSIA** — *Citrus limetta* Riss., var *vulgaris*. Rutácia arboreta, muito cultivada pelos hispéricios, de epicarpo verdoso e liso, com a polpa doce-amarga.
- DE BICO** — Lima de umbigo.
- DE UMBIGO** — *Citrus limetta* Riss., var *lumia*. Rutácia arboreta e robusta. Diferem scus frs da Lima da Pérsia por apresentar acentuação mamilo ou têta.
- LIMÃO AMARGO** — Limão de molho.
- AZEDO** — Limão de molho.
- BRAVO** — Capitiú.
- BRAVO DO BREJO** — Ameixa da Bahia.
- CIDRA** — Limão galego.
- COMUM** — Limão de molho.
- CRAVO** — Limão galego.
- DA CASCA GROSSA** — Limão galego.
- DA ÍNDIA** — Limão galego e Limãozinho de jardim.
- DE BOTICA** — Limão de molho.
- DE CAIENA** — Biribirí.
- DE MOLHO** — *Citrus limonum* Riss., var *médica*. Rutácia frutuosa, muito cultivada. Scus hispéricios, além de largo uso doméstico, fornece o ac. cítrico. Vars:

- Caja, Cetim, Casca fina, Cristal, dentre outras.
- DOCE** — *Citrus limonum* Riss., var *lumia*. Rutácia arboreta, com frs intermediários às Limas e os Limões, edulis e pouco apreciados — casca fina e a'ongada.
- DO MATO** — *Bassacantha spinosa* Shum, var *polyantha*. Rubiúcia arbórea e ornamental. Ra usada nas moléstias venéreas; lenho alvo, para carpintaria. Com o mesmo apelido, o Café do mato (*C. Coffeoides*).
- FRANCES** — Limãozinho de jardim e, especialmente, o Limão galego.
- GALEGO** — *Citrus limonum* Riss., var *bajoura*. Rutácia arbórea e fruticosa. Frs. maiores que o Limão de molho, de epicarpo escabroso e de polpa menos aquosa. Porta enxerto (cavalo).
- RANA** — Limão do mato.
- ROSA** — *Citrus limonum*. Rutácia arboreta, com frs dessa coloração.
- SICILIANO** — Limão galego.
- SILVESTRE** — Limão de molho (Apelido injustificável).
- LIMÃOZINHO** — Carne de anta.
- DE JARDIM** — *Triphasia aurantiola* Lour ou *Limonia trifoliata* L. Rutácia arbustiva e ornamental. Trifólios armados; frs encarnados, menores que a Cereja.
- LIMÃO VERDADEIRO** — Limão de molho.
- LIMO** — *Fucus communis*. Alga feofícia. Sp hidrófila, filamentosa ou laminar, fixa às rochas submersas e ao casco de embarcações, constituindo revestimento escorregadio.
- LIMOEIRO BRAVO** — Limão do mato.
- DE JARDIM** — Limãozinho de jardim.
- DO CAMPO** — *Styrax ferrugineum* Pohl. Estiracácia arbórea, com folhas alternas, fls axilares e drupas.
- DO MATO** — Limão do mato.
- LIMPA SAPATOS** — Graxa e Malva rosa (*H. syriacus*).
- LINDA FLOR** — Cosmos.
- LINGA** — Aninga.
- LINGUA DE BOI** — Cipó escada.
- DE LAGARTO** — São Gonçalinho.
- DE LEAO** — Papagáio.

- DE SOGRA — Papagáio e imprópriamente a Flor do paraíso.
- DE TEIÚ, ou TIÚ — São Gonçalinho.
- DE TUCANO — Guaxima miuda.
- DE VACA — *Talimum patens* Willd. Portujacácia erbácia e prolífica. Haste e folhas carnosas; fls encarnadas e fr capsular. Mortaliça. Fora da Bahia, tem o mesmo apelido a Costa branca e a congênere *Chaptalia integrofolia* Bak. Composta erbácia, amargo-tônica, febrifuga e peitoral. Vid Costa branca.
- DE VACA DA FLOR AMARELA — Lingua de vaca (*T. patens*). Var.
- DE VACA DA FLOR RÓSEA — Lingua de vaca (*T. patens*).

LINHO DA NOVA ZELÂNDIA — *Phormium tenax* Fors. Liliácia prolífica. Folhas radicantes, ensiformes, de metro, dando excelente fibra alva e flexível, para corduaria. Cultivado experimentalmente.

LÍRIO — *Iris germanica* L. Iridácia rizomatosa, de fls aromáticas e ornamentais. Nome também de outras espécies de lirios diferentes.

BRANCO — *Lilium candidum* L. Liliácia ornamental, notável pelas corolas alvas e perfumadas. De seus bulbos extraí-se óleo essencial. Tido como "rei das fls"; simboliza a candura, a inocência, a magestade e a purícia.

D'ÁGUA — Nenúfar.
DAS ÍNDIAS — Sabonete de soldado.
DAS MONTANHAS — Canela de ema.
DAS PEDRAS — Canela de ema.
DE CERCA — Lírio roxo do Brasil.
DE PETRÓPOLIS — Lírio do brejo.
DO AMAZONAS — Lírio eucarístico.

DO BREJO — *Hedychium coronarium* Koem. Zingiberácia sub arbustiva, hidrófila e ornamental. Fls de amplas corolas, alvas e perfumeiras. Sp extraordinariamente prolífica pelos seus rizomas, tidos como excitantes, peitorais e tónicos.
DO MATO — Açucena do mato.
DOS POETAS — Lírio branco.
EUCARÍSTICO — *Eucharis amazonica* Lind., ou *E. grandiflora*

- Planct. Amarilidácia muito ornamental. Fls alvas e aromáticas, providas de coroa. Sp sub arbustiva, com volumoso bulbo.
- FLORENTINO** — *Iris florentina* L. Iridácia sub arbustiva e ornamental.
- JAPONÊS** — *Iris pumilla*. Iridácia sub arbustiva. Folhas radicantes, distícas e ensiformes. De seu eixo surgem fls azuis.
- ROXO DO BRASIL** — *Cypella coerulescens* Seub. Iridácia bulbosa, erbácia e ornamental.
- ROXO DOS CAMPOS** — Bariricô.
- ROXO DOS MONTES** — Lírio.
- TUBEROSEN** — Tupinambá.
- VERDE** — *Cypella northiana* Klatt. Iridácia erbácia de folhas de metro. Fls alvas, esverdeadas. Volumosos bulbos, purgativos.
- LÍS** — Lírio.
- DA LAGOA** — Nenúfar.
- LITCHI** — *Nephelium litchi* Bail. Sapindácia arbórea e ornamental. Folhas compostas lancioladas; frutos — bagas — com o feito de pequenas pinhas. Pouco cultivada na Bahia.
- LIXA** — Lixeira.
- LIXEIRA** — *Curatella americana* L. Dileniácia arbórea, robusta e tortuosa. Latifólios; quando secos, servem de lixa. Lenho resinífero e para carpintaria.
- DO CERRADO** — Lixeira.
- LIXIA** — O mesmo ou melhor que Litchi.
- LOANDRO** — Espirradeira.
- DA ÍNDIA** — Espirradeira.
- LOBEIRA** — *Solanum grandiflorum* R. e Pav. Solanácia com o aspecto da muito vulgar Jurubeba, porém de maior porte. Folhas globóides — bagas — do tamanho de pequena laranja. Na var *pulverulentum* os frutos fazem juiz a esse qualificativo.
- LOCO** — Erva do diabo.
- LOENDRO** — Espirradeira.
- LOMBRIGUEIRA** — *Spigelia anthelmia* L. Loganiácia erbácia, ereta e inculta. Folhas verticilares, dispostas em cruz; fls em cimeiras helicoides. Vermífugo e sudorífico, tido como tóxica. Com o mesmo apelido a Gameleira (*F. anthelmintica*).
- MANSA** — Lombrigueira (*S. anthelmia*). Seus efeitos sobre o sistema nervoso não justificam o apelido.

- LONICERA** — Madre silva.
- LOSNA** — *Artemisia absinthium* L. Composta erbácia e cultivada. Fos partidas e recortadas; fls em espiras de capítulos. Aromática, eupeptica, emenagoga e tónica.
- DE DIOSCORIDES** — Losna.
- DO MATO** — Macela (*E. viscosa*).
- MAIOR** — Losna.
- ORDINÁRIA** — Losna.
- LOUCO** — Erva do diabo.
- LOUCURA** — Norma.
- LOUREIRO CANELEIRO** — Canela. Impreciso por caber às inúmeras sps de Lauráciás caneleiras.
- GREGO** — Sabonete de soldado.
- ROSA** — Espirradeira.
- TULIPA** — Magnólia (Branca).
- LOURO** — Sps dos Ges *Nectandra* e *Ocotea*, muito conhecidas por Canelas e da Fa das Lauráciás. São arbóreas, aromáticas e de lenho para marcenaria. Serve de tipo a *Ocotea teleiandra* Mez., arbórea e decorativa. Fos bicolores e fr bacácio. Madeira leve e de fácil manejo, com o cheiro de Limão (Canela limão). Ainda há Louros entre Rosáciás e Borragináciás.
- ABACATE** — Abacate
- AMARELO** — Embúia (*N. nitidula*).
- AMARELO DO RIO** — Embúia.
- AMARGOSO** — *Nectandra pemberiana* Nees. Laurácia copuda. Fos coriáciás; fls aromáticas em cachos. Madeira para carpintaria.
- BESUNTÃO** — Louro amargoso.
- BRAVO** — *Nectandra canescens* Nees. Laurácia arbórea. Fos coriáciás e elípticas; fls albas e fr baga. CórTEX tónico. Lenho para carpintaria.
- CÓCO** — Canela fedorenta.
- DA CASCA PRETA** — Canela preta.
- DA MATA VIRGEM** — Canela da folha grande.
- FEDORENTO** — Canela fedorenta.
- PRETO** — Canela barauña, *C. parada* e *C. preta*. Mais cabível à última sp.
- SASSAFRÁZ** — Canela sassafrás e Sassafráz.
- SILVESTRE** — Louro bravo.
- TI** — Canela seca.
- VERMELHO** — Canela preta (*N. globosa*).
- LUCATIVA** — Bombonassa.
- LUCEMADURA** — Erva do diabo.
- LÚCIA LIMA** — Cedron.
- LUFA** — Bucha (Indistintamente).
- LUMA** — Aluman.
- LUSTRE** — *Hibiscus schisophyllum* Hoot., ou melhor *H. schisopetalus*. Malvácia arboreta e muito ornamental. Fls encarnadas de pétalos recortados e recurvos, de cujo centro pende os venticilos reprodutores, em única coluna.
- LUZERNA** — Alfafa.
- LUZETRO** — Curraleira.

M

MAÇÃ, MACIEIRA — *Pirus malus* L. Rosácea arboréta com algumas vars. Fr pomo, var de baga. Desenvolve-se precariamente na Bahia.

MACABEIRA — Macauba.

MACAÇA — Não especificada — Labiada erbácia. Inflorescência piramidal. Muito aromática.

MACACAIBA, MACACAUBA — Macauba.

MACACHI — Azedinha (*O. corniculata*).

MACACOACAN — Cacau maracujá.

MACACU, MACACURANA — Macucurara.

MAÇA DO DIABO — Estramônio.

MACAÉ — Neves. Cabe porém melhor á Erva Macaé.

MACAEMBIRA — Macambira.

MAÇÃ ESPINHOSA — Estramônio.

—ESTRELADA — Caimito.

—MELÃO — Pomelo.

MACAGÊ — Mucugê.

MACAI — Azedinha (*O. Corniculata*).

MACAIBA — Macauba.

MACAJÁ, MACAJU, MACAJUBA — Macauba.

MACAMBARA — Capim massambará.

—DO PIAUÍ — Capim massambará.

MACAMBIRA — *Bromelia laciniosa* M. Bromeliácia xerófita, com longas fos em rosâta, fornecedora de fibras têxteis.

MACANA, MACANAN — Mucuna.

MACAQUEIRO — Bilreiro.

MACAQUINHO — Inhame de Angola.

MACARANDIBA, MAÇARANDIVA — Maçaranduba.

MACARANDUBA, MAÇARANDUVA — *Lucuna procera* M. Sapotácia de grande altura. Suas bagas, embora leitosas, são muito apreciadas. Lenho para carpintaria e marcenaria. A *Mimusops elata* e outras sps do mesmo Ge e Fa têm o mesmo apelido. Substituem o Pau Brasil.

—BRANCA — Maçaranduba.

—VERDADEIRA — Maçaranduba (*L. procera*).

MAÇATAIBA — Moçutaliba.

MACAU — Azedinha.

MACAUBA — *Acrocomia sclerocarpa* e *A. intumescens* M. Palmáceas robustas e elevadas. Seu espinho aumenta de diâmetro de baixo para cima. Fos pinadas e longas, fornecendo boas fibras; frs com albuminom espesso, rico em óleo alimentício e industrial. Ornamental. Algumas Leguminosas do Ge *Platymiscium* têm o mesmo apelido.

MACAXERA — Alpim.

MACÉ DE FOGO — Macucurana.

MACEGA BRAVA — Cana brava.

MACELA — Algumas sps. são identificadas por esse apelido: *Achyrocline satureoides* DC. Composta erbácia, com fos lancioladas e espessas, fls alvas, fr aquênio. Sp tônica e amarga; as inflorescências servem para colchões. *Triantha ramosissima* M. Amarantácia erbácia, tida como sudorífica. Suas fls, aromáticas, servem para travesseiros e colchões. *Egletis viscosa* Less; composta amargo-tônica. *Matricaria americana* L.; composta erbácia e aromática, com suas partes aéreas pilosas, tida como sucedânia da Camomila.

—DA TERRA — Macela (*Matricaria americana*).

—DE SÃO JOÃO — Mentrasto.

—DO CAMPO — Carrapicho de agulha.

—FRANCESCA — Macela galega e Mentrasto.

—GALÉGA — *Matricaria chamomilla* L. Composta erbácia, aromática e eupéptica. Tem o mesmo apelido a Camomila romana e sua var. aurea.

MACHICHE — Maxixe.

MACHINÉ — Capim machinde.

MACHUCHÚ — Chuchú.

MACOIBA — Macauba.

MACONHA — Um dos apelidos mais empregados da Diamba.

MACUCO — *Licania heteromorpha* Bent. Rosácea arbórea. Madeira de lei. Com o mesmo apelido a Macucurana.

MACUCURANA — *Hirtella americana* Aubl. Rosácea arbórea e madeira de lei. Com o mesmo apelido a *H. triandra* Sw. Essas sps são tambem conhecidas por Macuco.

MACUJÉ — Mucugé.

MACUQUEIRO — Bilreiro.

MACURA CAA — Tipi.

MACURUBU — Guapuruvú.

MAÇUTAIBA — Moçutiba.

MACUXERA — Aípi.

MADRE CRAVO — Quitoco.

— **SILVA** — *Lonicera caprifolium* L. Caprifoliácia trepadeira e ornamental, pelas fls perfumosas. Várias sps.

— **SILVA DOS JARDINS** — Madre silva.

— **SILVA TREPADEIRA** — Madre silva.

MAE DE FAMILIA — Margarida.

— **DAS ARVORES** — Sumauma.

— **IZABEL** — *Priva bahiensis* L. Verbenácia inculta e erbácia, do grupo dos Carrapichos. Fr capsular, de cálice vesiculoso, com duas saíncias em forma de nadegas. Constituido vermífugo.

MAFOME — Cipó cururú (P. Pinnata).

MAFUÁ — Visgueiro.

MAGERIOBA — Fedegôso.

MAGNÓLIA (branca) — *Magnolia grandiflora* L. Magnoliácia arbórea muito ornamental, com amplas corolas albas e perfumadas.

— (amarela) — *Micheelia champaca* L. Magnoliácia arbórea, piramidal e elegante. Fls amarelas em cachos.

— **COMUM** — Magnólia branca.

— **DA CAROLINA** — Magnólia branca.

— **DA FLOR GRANDE** — Magnólia branca.

— **DA FLOR PEQUENA** — Magnólia pequena.

— **DE JAVA** — Magnólia amarela.

— **DE PETRÓPOLIS** — Magnólia amarela.

— **GRANDE** — Magnólia branca (Referência ao tamanho da fl).

— **LIRIO** — Magnólia pequena.

— **MIUDA** — Magnólia pequena.

— **PEQUENA** — *Magnolia pumila* Andr. Tem os mesmos caracteres da M. branca, porém com fls menores. Febrífuga.

MAIRU — Caju açú.

MAIS, MAIZ — Milho.

MAITENO — *Maytenus ilicifolia* M. Celastrácia arbustiva e ramosa. Fr capsular. Analgésico, cicatrizante e tónico.

MAJARAIBA — Tucum.

MAJORANA — Mangerona. Impreco, por ser conferido ao Algodão do brejo, ao Canudo e à Lingua de vaca.

MAJOR GOMES — Lingua de vaca.

MALACACHÉTA — Pau de tucano (Tabebuia).

MALAGUÉTA — Pimenta malagueta.

MALAMBO — Casca de anta.

MALEITE DE FOLHAS LARGAS — Parece mas não é.

MALEITEIRA — Curraleira.

MALICIA DAS MULHERES, MALICIA DE MULHER — Sensitiva.

— **DOS HOMENS** — Unha de gato.

MALI-MALI — Geneuna e algumas Leguminosas do mesmo tipo.

MAL-ME-QUER, MAL-ME-QUERES — *Wedelia paludosa* DC e sua var *vialis*. Composta erbácia e sarmentosa. Capítulos amarelos e eretos. Os apelidos são conferidos, com muito menor propriedade, ao *Chrysanthemum carinatum* Schoub, ao *C. coronarium* L. e à *Aspilia foecacia* Bar., sps ornamentais e da mesma Fa.

— **AMARELO** — Mal-me-quer (*C. carinatum*).

— **BRANCO** — Margaridinha.

— **DOS BREJOS** — Mal-me-quer (*W. paludosa*).

— **GRANDE** — Andrequicê.

MALVA — *Malva silvestris* L. Malvácia silvestre e erbácia. Algumas sps do Ge Sida, da mesma Fa, têm o mesmo apelido.

— **BRANCA** — *Abutilon pauciflorum* S. H. Malvácia erbácia e pilosa. Fls amarelas; fr capsular. Usada em gargarejos.

— **BRANCA DO SALGADO** — Pacopaco.

— **CABEÇA DE VEADO** — *Pavonia varians* M. Malvácia arbustiva. Praga, devido aos frs. com dois picantes em forma de chifres de veado, que ferem os pés dos animais.

— **DA PRAIA** — Vassoura de relógio.

— **DA TERRA** — Malva.

— **DAS HORTAS** — Malva.

— **DE CASA** — Malva.

- DE JARDIM — Gerânio.
- DE PENDÃO — Paco-paco.
- DE SÃO FRANCISCO — Papoula de São Francisco.
- DE SÃO SEBASTIÃO — Guaxima.
- MALVADISCO** — Guaxima.
- MALVA DO CAMPO** — Kalmeyera speciosa S. H. Gutifera arbórea de folhas coriáceas. Fr. capsular; lenho para carpintaria. Merecem o mesmo apelido, dentre outras, as seguintes espécies: a Malva e a Sida macrodon DC, ambas Malváceas.
- FLOR — Gerânio e Malva rosa.
- GRANDE — Malva cabeça de veado.
- TUCANO — Guaxima miuda.
- MALVAISCO** — Guaxima. Apelido também de algumas outras Malváceas e também a espécie de Fas diferentes.
- COR DE ROSA — Carapicu.
- SILVESTRE — Guaxima.
- MALVALISCO, MALVALISTRO, MALVANISCO** — Guaxima.
- MALVA MAIOR** — Malva.
- MAÇÃ — Gerânio.
- MALVÃO** — Malva cabeça de veado.
- MALVA PRETA** — Vassoura de relógio.
- RABO DE FOGUETE — Paco-paco.
- RELÓGIO — Vassoura de relógio.
- RELÓGIO GRANDE — Vassoura de relógio.
- ROSA — Geranium erodifolium. Geraniácea, híbrido dos Geranium e Pelargonium. Erbáceo aromático e antiespasmódico. Hibiscus syriacus L. Malvácea sub arbustiva e ornamental.
- SARDINHA — Gerânio e Malva rosa.
- ROXA — Guaxima.
- VARÉTA — Paco-paco.
- VINAGREIRA — Algodão do brejo.
- MALVAVISCO** — Guaxima.
- MAMA DE CADELA** — Apé e Espinho de vintem.
- MAMANGUÁ** — Fedegoso.
- MAMAO, MAMOEIRO** — Carica papaya L. Caricácea arbórea, e eretica. Seus frutos — pepónidos — além de saborosos, encerram papaina, ou pepsina vegetal. Sementes vermífugas.
- BRAVO — Jaracatiá.
- COCO — Mamão (Var. globoide, pouco apreciada).

- DA BAHIA** — Mamão melão. Impróprio, pois nesse Estado cultiva-se igualmente outras vars.
- DA INDIA** — Mamão melão.
- DE CAENA** — Mamão melão.
- DE CORDA** — Mamão. Var. apresentando frs de longo pedúnculo e impropriamente denominada var de Mamociro macho.
- DE ESPINHO** — Jaracatiá.
- DE TONKIM** — Mamão melão.
- DO CHILE** — Mamão melão.
- DO MATO** — Jaracatiá.
- DO TALO ROXO** — Mamão. Var. em que os pedúnculos são arroxeados.
- MAMAO-I** — Jaracatiá.
- MAMAO JARACATIA** — Jaracatiá.
- MACHO** — Carica papaya L. var microcarpa. Geralmente, esta var tem somente fls masculinas, podendo porém apresentar algumas femininas, produzindo frs pequenos, do tipo do M. de corda.
- MELÃO** — Carica papaya L. var piriformis. Mamão. Var. em que os frs são piriformes ou elipsóides.
- PRÍNCIPE** — Mamão melão.
- MAMAO-RANA** — Jaracatiá. Impróprio, pois melhor cabe à Mamarana.
- MAMAO-SINHO DO MATO** — Jaracatiá.
- MAMAO TONKIM** — Mamão melão.
- VERMELHO** — Mamão (var de talo roxo e polpa encarnada).
- MAMAURANA** — Mamorana.
- MAMEI** — Abricot (do Pará).
- MAMEIRO GRANDE** — Cucurbitácea mammeata Mol. Cicurbitácia.
- MAMICA DE CACHORRA, ou DE CADELA** — Apé e Espinho de vintem.
- DE PORCA** — Espinho de vintem.
- MAMINHA DE CADELA** — Apé e Espinho de vintem.
- DE PORCA** — Espinho de vintem.
- DE QUATI** — Buranhem.
- MAMOERANA** — Mamorana.
- MAMONA, MAMONEIRA** — Ricinus communis L. Euforbiácea geralmente arboreta. Fr. cápsula — tricoca ou triaquênio — com sementes oleosas, fornecendo o "Óleo de ricino", purgativo e de grande valor industrial. Apresenta numerosas vars.
- BRANCA** — Mamona.
- DO MATO** — Canudo de pito (M. fistulifera).

—VERMELHA — *Ricinus sanguineus* Hoot. Var de Mamona com frs encarnados, em grandes cachos eretos. Ornamental e produtiva de boas sementes.

MAMONINHA, MAMONINHO — *Amanoa glaucophylla* M. Arg. Euforbiácia. Impreciso, pois cabe ao Pinhão roxo, é também conferido à Laranjeira do mato e à Trombeta branca.

—BRAVA — Estramônio.

—DE CARNEIRO — Estramônio.

MAMONO — Mamona.

—BRANCO — Mamona.

MAMORANA — *Pachira aquatica* Aubl. Bombácia arbórea, umbrosa, robusta e ornamental. Frs capsulares, com o feitio do Cacau. Lenho leve.

—GRANDE — Mamorana.

—PEQUENA — Castanha do Pará (*B. affinis*).

MAMOTA — Jaracatia.

MAMPA-I — Pau paraiba.

MANACÁ, MANACAM — *Brunfelsia hopeana* Bth. Escrofulariácia arbustiva e decorativa. Fls albas, liliás e roxas. Ras depurativas — "mercúrio dos pobres".

MANACARU — Vid Mandacaru.

MANAGÁ — Manacá.

MANAIARA — Acapurana.

MANAIBARU — Mandioca.

MANAIBUÇU — Mandioca.

MANAIBUNA — Aipí.

MANAJÁ — Manacá.

MANDACARU — Certas Cactáceas do Gé *Cereus*, erectas, caneladas, espinhosas e xerófitas, podendo alcançar ponderável altura.

—DE BOI — *Cereus jamaracu* DC. Cactácia das catingas, alta e ramosa, do grupo dos Mandacarus.

—DE FAIXA — Mandacaru de boi.

—DE LEITE — Cumana.

—DE TRES QUINAS — Cardo ananá.

—FACHEIRO — Mandacaru de boi.

MANDAPUÇA — Mundururú.

MANDARAVÉ — Borla de bispo.

MANDARINA — Laranja tangerina.

MANDIBA, MANDIVA — Mandioca.

MANDIBÚ, MANDIVÚ — Capim ser. rra.

MANDIOCA — *Manihot utilissima* Pohl. Euforbiácia arbustiva, apresentando numerosas vars. Ras tuberosas — "pão dos pobres" — encerrando ac. cianídrico.

— AIPÍ ou AIPÍFM — Aipí.

—AMARGA — Mandioca.

—BRANCA — Aipí.

—BRAVA — Mandioca.

—DOCE — Aipí.

MANDIOCAI — *Tecoma araliacea* D. C. ou *T. ochracea* Cham. Bignoniácia arbórea. Lenho branco e rijo. Ainda com o mesmo apelido, a *Didynopanax morototoni* D. e Planc. Araliácia arbórea.

MANDIOCA MANSA — Aipí.

—VENENOSA — Mandioca.

—VERMELHA — Mandioca (Impróprio).

MANDIOQUEIRA — Mandiocai (*D. morototoni*).

MANDIOQUINHA — Bucho de boi.

—BRAVA — Chapeu de frade.

—DO CAMPO — Chapeu de frade.

MANDIU GUAÇU — Pinhão de purga.

MANDOBI — Amendoi.

—GUAÇU — Pinhão de purga.

MANDUBÁ — Mandioca.

MANDUBI — Amendoi.

—GUAÇU, MANDUI GUAÇU — Pinhão de purga.

MANDUBIRA — Amenduirana (*Melobomia axillaris*).

MANDUIRANA — *Cassia sp.* (*C. hæccliaris?*) Leguminosa florestal de elevado porte; fls amarelas, vagens longas.

—DA FOLHA MOLE — Cana fistula (*C. multijuga*).

—DO CERRADO — Boi gordo.

MANE MOLE — Cega olho.

MANE VELHO — Tucum.

MANFUI GUAÇU — Pinhão de purga.

MANGA, MANGUEIRA — Mangifera indica L. Anacardiácea de enorme desenvolvimento. As antigas e reputadas Mangueiras da Bahia, adstritas a repetidos cruzamentos, por serem outrora perpetuadas por sementes, transformaram-se em muitissimas vars. Restam, porém, ainda algumas, insuperáveis pela beleza, perfume e delicioso sabor de suas drupas.

—DO MATO — Farinha seca.

MANGABA, MANGABEIRA — *Hancornia speciosa* Gom. Apocinácia arbórea, ramosa, xerófita e inculta. Além das saborosas bagas, seu látex dá excelente borracha.

—BRAVA — Mangabinha do norte e Pacari.

MANGABARANA — *Hancornia pubescens* M. Apocinácea arbórea e lactífera.

MANGABINHA DO NORTE — *Hancornia minor* M. Arg. Sub sp de Mangaba, com frs menores.

MANGAIBA — Mangaba. Impróprio por caber melhor à Manga.

MANGALÓ — *Canavalia enciformis* DC. Leguminosa trepadeira, com vagens de sementes comíveis. Fls e frs arroxeados ou violáceos. A var alba é a Ervilhaca, conhecida também por Dolichos labiat L. Has vars ornamentais e selváticas.

—**BRANCO** — Ervilhaca (*Dolichos labiat* var *alba*).

—**DA COSTA D'AFRICA** — Manga-18.

MANGANAS — Mangará.

MANGARÁ — Algumas Aráctias dos Ges *Caladium* e *Xanthosoma*, com tuberas comíveis. Sps cultivadas.

MANGARABEIRA — Mangue vermelho. Cabe melhor aos Mangarás.

MANGARA BRANCO — *Caladium poecile* Schot. Arácia de tuberas brancas.

MANGARAI — Mangará mirim.

MANGARA MIRIM — *Xanthosoma sagittifolium* L. Var de Mangará, com tuberas pequenas.

—**PEUNA** — Mangará roxo.

—**ROXO** — *Xanthosoma violaceum* Schot. Var de Mangará, com tuberas roxas.

MANGARATAIA — *Carecuma* e Gengibre. Cabe melhor à segunda sp.

MANGARATIA — Gengibre.

MANGARAVI — Mangalô (Indistintamente).

MANGARAZ — Mangará (Indistintamente).

MANGARITO — Mangará mirim.

—**MIRIM** — Mangará mirim.

MANGAROBEIRA — Mangue vermelho.

MANGEIRONA — Mangerona.

MANGERICAO — *Ocimum gratissimum* L. Labiada erbácia, ramosa, aromática e ornamental, apresentando vars. Eupéptica e anti febril.

—**DA FOLHA LARGA** — Alfavaca cheirosa.

—**DA FOLHA MIUDA** — Mangericão miudo.

—**DE ALFAVACA** — *Ocimum americanum* L. Labiada do mesmo tipo

do Mangericão, porém de perfume mais agradável.

—**DE CHEIRO** — Mangericão (Indistintamente) e Alfavaca.

—**DE MOLHO** — Alfavaca cheirosa.

—**DOS COSINHEIROS** — Alfavaca cheirosa.

—**GRANDE** — Alfavaca, A. cheirosa e A. de cheiro.

—**MIUDO** — *Ocimum minimum* L., O. *basileicum* L. var *minimum*. Sp de Mangericão de fós miudas.

MANGERICO — Mangericão (Indistintamente).

MANGERIOBA — Fedegoso.

—**GRANDE** — Mata pastão.

MANGERROBA — Mangerona.

MANGERONA — *Origanum mangonella* L. Labiada erbácia, rasteira, formando touças. Sp aromática, sonífera e eupéptica.

—**GRANDE** — Mata pastão (Injustificável).

MANGO — Manga, Mangueira.

MANGORA — Mangue e Mangará. Cabe melhor à segunda sp.

MANGUE AMARELO — *Laguncularia racemosa* Gart. Combretácia arbórea e hidrófila. Fós simples e opostas; fls bracteadas. Sp litorânea e ribeirinha. Apresenta rizóforos.

—**BOTÃO** — Mangue de bola.

—**BRANCO** — *Avicenia nitida* Jacq. Aviceniácia arbórea e hidrófila. Fós coriáceas; fls em cachos terminados. Tanígero. Sp de grande desenvolvimento.

—**BRAVO** — Mangue vermelho. Impreciso, pois os demais estão no mesmo caso.

—**CANOÉ** — Mangue vermelho.

—**CEBOLA** — *Clusia* sp. talvez C. *insignis* M. Gutifera do mesmo tipo da C. *fluminensis*, porém menor e com frs menores. Fós largas e coriáceas; fr drapáceo com o felito de cebola.

—**DE BOLA** — *Conocarpus erectus* Jacq. Combretácia arbórea e tortuosa. Frs esféricos em cachos, com o epicarpo acidentado. Não é hidrófilo, mas vegeta nas proximidades do litoral.

—**DE ESPETO** — Mangue vermelho.

—**DE PENDÃO** — Mangue vermelho.

—**DO CERRADO** — Cuia do brejo.

—**DO MATO** — Farinha seca.

- PRETO — Mangue vermelho.
- SAPATEIRO — Mangue vermelho.
- SECO — Mangue amarelo.
- SERIRA ou SIRIBA — Mangue amarelo.
- VERDADEIRO — Mangue vermelho.

— VERMELHO — *Rhizophora mangle* L. Rizoforácia arbórea, constituindo o elemento mais encontrado dos mangualis. Frs vivíparos, em forma de charutos. Sp essencialmente tanífera. Lenho para carpintaria e excelente combustível.

MANI — Amendoin.

MANIBARU — Aipi.

MANIBA TATU — Aipi.

MANICÓBA, MANICÓBEIRA —

Apelido de muitas Euforbiáceas do Ge Manihot, ricas em látex produtor de borracha. Serve de tipo a *M. glaziovii* M. — árvore de médio porte, fos palmadas e fls monóicas. Sem nomes vulgares, Ule regista as seguintes sps: *M. cuneata*, *M. ferruginea*, *M. lirata*, *M. harmonica*, *M. microdendrom*, *M. rotundata*, *M. trifoliata*.

— DE JEQUIÉ — *Manihot dichotomica* Ule. Euforbiácia arborea, copudia, cau delgado e córtex fino.

— DE SAO FRANCISCO — *Manihot heptaphylla* Ule. Euforbiácia arborea, com fos verde-escuras, e de 7 lobos; frs costados.

— DO CEARÁ — Manicoba (*M. glaziovii*).

— DO PIAUÍ — *Manihot piauiensis* Ule. Sp menor, porém mui parecida com a *M. de São Francisco*.

MANIOCA — Mandioca.

MANIPEBA — Mandioca. Uma de suas melhores vars. Resiste às secas e às chuvaradas. Considerada "prodígio da providência".

MANIPOCA — Aipim.

MANITINGA — Mandioca.

MANIVA — Mandioca.

MANJAR GRUDE ou GRUDO — Fruta de vaqueiro.

MANJARONA — Mangerona.

MANJOLO — Jacaré.

MANJORANA — Algodão do brejo.

MANOBI — Amendoin.

MANOEL COMPRUDO — Farinha seca.

MANTIMENTO DE POBRE — Muriçá.

MANTO DE CRISTO — Trombeta roxa.

MÃO DE MOMO — Taiuiá.

— DE SAPO — Capim calandrina e Cruz de malta.

— FECHADA — Gericó roxo.

MAPARAJUBA — *Mimusops paraensis* Hub. Sapotácia parecida com a Massaranduba, de porte maior e com fos e fls menores. A Massaranduba tem o mesmo apelido.

MAPAREIBA — Mangue vermelho.

MAPATI — Tararanga preta.

MARACÁ — Cascavel e Coquinho. Impreciso, pela dupla designação.

MARACUJÁ — Apelido de muitas sps de Passifloras do Ge Passiflora. São sarmentos gavinhosos e de grande desenvolvimento. Fls vistosas — "fl da paixão" — Frs bagas com arilo de agradável sabor. Sedativas e hipnóticas.

— **AÇU ou UAÇU** — Maracujá melão.

— **BRANCO** — *Passiflora capsularis* L. Passiflora.

— **COMUM** — *Passiflora edulis* Sim. Passiflora com frs elipsóides, mui apreciados. Hoehne refere-se a uma variedade — *verruciformis* — referida por G. Soares. Talvez seja a *Passiflora bahiensis* Klotz, conhecida por Maracujá da Bahia.

— **DA BAHIA** — Vid Maracujá comum.

— **DE ROI** — *Passiflora microcarpa*. Passiflora inculta, com frs pequenos.

— **DE CAIENA** — Maracujá melão.

— **DE COMER** — Maracujá comum.

— **DE MACACO** — Maracujá comum.

— **DE PERIQUITO** — Fruto amargoso.

— **DE QUATRO QUINAS** — Maracujá melão.

— **DE TRES PERNAS** — Maracujá melão.

— **GIGANTE** — Maracujá melão.

— **GRANDE** — *Passiflora alata* Ait. Passiflora. E Maracujá melão.

— **MAMAO** — Maracujá grande (*P. alata*) e Maracujá melão.

— **MELAO** — *Passiflora macrocarpa* Roiz. Passiflora robusta, com frs até mais de quilo, elipsóides e de pericarpo espesso. Combate a gota.

— **MIRIM** — Maracujá de boi.

— **MIUDO** — Maracujá comum.

— **PERA** — Maracujá comum.

- PEROBA — Maracujá comum.
 — REDONDO — Maracujá de boi.
 — SELVAGEM — Maracujá de boi.
 — SUSPIRO — Maracujá comum.
MARACUJAZINHO — Maracujá de boi.
MARACUJINA — Maracujá melão.
MARACUNAM — Maracujá melão.
MARAGOA — Diamba.
MARAIÁ, MARAJÁ — *Bactris maja* M. Palmácia de médio porte e espinhosa. Drupas édulis e roxas. Sp do grupo dos Tucuns.
MARAJAIBA — Maraíá.
MARAOARA — Lixeira.
MARAJUIRA — Diamba.
MARANGABA — *Paidium pigmentum* — Mirtácia arboreta.
MARAPÁ DO CAMPO — Pau paraiba.
MARAPUAMA — Catuaba (*A. mirandum*).
MARAPUI — Pau paraiba.
MARAREÇÔ — Baririçô.
MARAVILHA — Bonina.
 — DE FORQUILHA — Bonina.
MARCELA — Macela.
MARE-MARI — Mari-mari.
MARERIÇÔ — Baririçô.
MARFIM — Bucho de boi e, especialmente, o Pau marfim.
MARFINZINHO — Laranjeira do mato.
MARGARIDA — *Aster sinensis* L., *Callistephus chinensis* Nees. ou *C. lanciolata*. Composta erbácia, ornamental e mui generalizada. Fls em capítulos amarelos.
AFRICANA — Gérbera.
AMARELA — Margarida.
ARBÓREA — *Montanoa bipinnatifida*. Composta arboreta e ornamental. Fos multifendidas; capitulos alvos.
 — DE TRES CORES — Gérbera.
DO JAPÃO — *Aspilia fojata*. Composta erbácia, cultivada, com capítulos amarelos. Ornamental.
DO TRANSVAL — Gérbera.
RASTEIRA — Margaridinha.
MARGARIDINHA — *Bellis perennis* L. Composta erbácia com fos radicantes e capítulos pequenos e alvos. Possue vars.
MARGARITA — Margaridinha.
MARI — Humari e algumas outras Leguminosas do Ge *Cassia*.

- MARIA ANGU** — Lingua de vaca (*T. patens*).
DA COSTA — Angélica de rama.
GOMBE, GOMBI ou GOMBU — Lingua de vaca (*T. patens*).
GOMES — Lingua de vaca (*T. patens*).
GORDA — Pimenta malagueta (Var com frs maiores e mais grossos).
MOLE — Cardo morto e, especialmente, a Marianinha.
MARIANA — Marianinha.
MARIANGOMBI — Lingua de vaca (*T. patens*).
MARIANINHA *Commelinia pudiplora* L. ou *C. communis* V. Comelinácia inculta, hidrófila e estolhosa. Fls azuea. Diurética e emoliente. Há, ainda, com o mesmo nome, outras Comelináceas do mesmo Ge — *C. deficiens* Heber; *C. diuretica* M. — e do Ge *Tradescantia*.
VERMELHA — Carurú de espiga.
MARIA PEIDORREIRA — Açucena do mato.
 — PRETA — Sps de Fas diversas tornaram-se conhecidas com esse apelido: *Solanum dulcamara* L. Solanácia sub arbustiva, com fls roxas e frs bacáciros, pequenos e da mesma cor; algumas Verbenáceas do Ge *Vitex* — *V. bahiensis*, *V. cymosa*, as sps descritas como *Tarumã* e, especialmente, a *V. polygamia* Cham., sp sub arbustiva, com frs bacáciros e estimada como depurativa, como o *Solanum dulcamara*; a Borraginácia *Cordia curaçavica*, arboreta arenícola e aromática; a Catingueira (*C. pyramidalis* Tul.); a sp registada como Erva pré, dentre outras.
 — PRETA DA MATA ou DO MATO — Barauna e Brauna.
 — PRETA DO CAMPO — Barauna e Brauna.
 — PRETA VERDADEIRA — *Eupatorium ballotaefolium* HBK. Composta sub arbustiva.
MARIA PRETO — Maria preta.
MARIASINHA — Marianinha.
 — SEM VERGONHA — *Impatiens sultana* Hoot. Balsaminácia sub arbustiva, ornamental e *semper fiorens*. Cau carnoso; fls esporoadas.
MARICA — *Mimosa sepiaria* Bth. Leguminosa arborecente, armada e

esgalhada. Encontrada nas margens dos rios. Sp peitoral.

MARICOTINHA — *Monnieria trifolia* L. Rutácia arbustiva e inculta. É comum a var *bahiensis*. Amargo-tônica e diurética.

MARI-MARI — Geneuna e outras Leguminosas como a *Cassia leiantha* Benth. e, especialmente, a *Cassia superba* HBK. — sp arbustiva com fls fétidas, tida como vermisfuga.

—**MARI GRANDE** — Geneuna.

—**MARI PRETO** — Geneuna.

—**MARI-RANA** — Geneuna.

—**MARI SARRO** — Geneuna.

MARINHEIRO — Bilreiro e Juá.

—**DA FOLHA MIUDA** — *Trichilia cathartica* M. Meliácia parecida com o Bilreiro. Córtez purgativo, adstringente e vermisfugo.

—**DO MATO** — Bilreiro.

MARIOLO — *Araticum cortiça*.

MARIQUINHA SEM VERGONHA — Mariquinha sem vergonha.

MARIRIÇÔ — Baririçô.

MARIUANA — Diamba.

MARIZEIRO — Mari e Mari-mari.

MARMELADA BRAVA — Amajoua guianense Aubl. Rubiácia arbórea e madeira de lei.

—**DE CAVALO** — *Melbomia discolor* Vog. Leguminosa arbustiva do grupo dos Carrapichos. Forragem rica em proteína.

—**VERMELHA** — São Gonçalinho.

MARMELINHO DO CAMPO — São Gonçalinho.

MARMELO, MARMELEIRO — *Pirus cydonia* L. Rosácea arbórea, com drupas servindo para doces. Algunas euforbiáceas, do Ge Croton, têm o mesmo apelido, especialmente as seguintes: *C. jacobinensis* e *C. hemiorrhyncha*.

—**BRAVO** — Gingeira.

—**DO MATO** — Capixava.

MARMITA DE MACACO — Sapucáia (Indistintamente).

MARMOLINHO — Cabeça de negro.

MARQUEZA DAS BELAS — Cipó de S. João (*P. ignea*).

MARRÓIO — Erva Macaé.

MARTÍRIO — Dois amigos.

MARUBÁ — Pau paraiba.

MARUORANA — Algodão do brejo.

MARUPÁ — Pau paraiba.

MARUPAI — Pau paraiba.

—**DO CAMPO** — Pau paraiba.

MARUPA-UBA FALSO — Mandlócaí.

MASSAEMBIRA — Macambira.

MASSAMBARI — Capim massambá-mirim.

MASSAPÉ — Capim sapé.

MASSARANDIBA, MASSARANDIVÁ — Maçaranduba.

MASSARANDUBA, MASSARANDUVÁ — Magaranduba.

MASTICO, MASTICO FALSO — Aperta ruão.

MASTRUÇO — *Chenopodium ambrosioides* L. Quenopodiácia erbácia e inculta na Bahia. Sp aromática, fornecendo óleo essencial de grande poder anti helmíntico. A var *integrifolium* tem fos sem denteações. Há, com o mesmo apelido, sps de outras Fas, especialmente, entre as Cruefferas: *Coronopus didymus* L. e *Lepidium bonariense* L. dentre outras.

—**BRAVO** — Mastroço do sul.

—**DO PARA** — Agrião do Brasil.

—**DO PERU** — Chagas.

—**DO SUL** — *Lepidium ruderale* L. Crucífera erbácia. Fls em longas espigas eretas; frs drupas escartadas. Esperatorante e estomáquico.

—**SILVESTRE** — Mastroço do sul.

MASTRUZ, MASTURÇO — Mastroço (Indistintamente).

MATA BARATAS — Angelim doce e Pau paraiba.

CABRAS — Algodão do brejo e Canudo.

CACHORRO — *Bernardia fluminensis* Planc. Conariácia arbórea.

CAES — Angélica de rama.

CANA — Gritadeira.

FOME — Coqueiro mata fome e Camapu. Cabivel à primeira sp.

MATA-ME EMBORA — Mate-me embora.

MATA-MATA — *Lecythis lanciolata* Poir. Lecitidácia de elevado porte, do grupo das Sapucáias. Madeira de lei, sementes oleosas, de valor industrial e medicinal — moléstias das vias urinárias.

MATAMBA — Mutamba.

—**PRETA** — Ivinga.

MATA-ME EMBORA — Mate-me embora.

MATA OLHO, ou OLHOS — Cega olho.

—**PASTAO** — *Cassia alata* L. Leguminosa arboreta de ramificação difusa e muito decorativa. Fls em râcimos amarelos de longa fuste; vagens com 4 expansões aladas.

- PASTINHO — São João.
- PASTO — *Cassia sericia* Swart. Leguminosa sub arbustiva e inculta, com fls amarelas e vagens recurvas. Boa forragem, prestante à semente. Tal apelido aplica-se a muitas outras sps que, em aglomerados, entravam o desenvolvimento de Gramíneas forrageiras: *Cassia tora* L., São João, Juiz de paz e outras.
- PAU — Gameleiras, com especialidade, Cipó, imbé e Guttiferas — Mangue cebola — e outras sps.
- PEIXE — Tinguis e Timbós.
- PINTO — Algodoeiro bravo e Canudo.
- PIOLHO — Sapucainha.
- PORCO — Milhomens (Indistintamente).
- TAMBA — Mutamba.
- MATATAUBA** — *Cecropia sciadophylla* M. Morácia arbórea, pouco ramosa e inculta. Do grupo das Umbaubas.
- MATA VERRUGAS** — Aveláz.
- MATE BASTARDO** — Congonha de Goiáz.
- DO RIO — Congonha do Rio.
- ESPÚRIO — Congonha de Goiáz.
- FALSO — Congonha de Goiáz.
- MATE-ME EMBORA** — *Panicum dacrylyon* L. Gramínea cosmopolita, mui prolífica. Erbácia estolhoso e boa forragem, resistente ao pisoteio.
- EMBORA DA PRAIA — Salsa da praia.
- MATINÉTA** — *Rhynchosia minima* DC. Leguminosa sub arbustiva, inculta e ramosissima. Fls viscosas; fls amarelas. Peitoral.
- MATOMBO** — Mutamba.
- MATRI** — Mastruço. (Indistintamente).
- MATRICÁRIA** — Mal-me-quer (*C. carinatus*).
- AMERICANA — Vid Macela.
- MATRUZ** — Mastruço (Indistintamente).
- MATUCANA** — Douradinha (*Lindernia*).
- MAXIXE** — *Cucumis africanus* L. Cucurbitácia sarmentosa, muito cultivada pelas suas bagas. Sp tida por emoliente e anti helmíntica.
- BRAVO — *Cucumis anguria* L. Cucurbitácia.
- FRANCES — Xuxú.
- MAXIXERE** — Maxixa.
- MECHOACAN DO CANADÁ — Tintureira (*P. decandra*).
- MECHOACANA, MECHUAÇÃO — Bataia de purga e Tintureira.
- MECONHA** — Diamba.
- MEDICINEIRA** — Pinhão de purga.
- MELADINHA** — Rabugem de cachorro.
- DE CAVALO — *Stylosanthes viscosa* Swart. Leguminosa sub arbustiva, com trifólios viscosos e vagens articuladas.
- MELAMBO** — Casca de anta.
- MELA-MELA** — Rabugem de cachorro.
- MELANCIA** — *Citrullus vulgaris* Schrad. Cucurbitácia muito cultivada pelas suas deliciosas e volumosas bagas, encerrando vitaminas. Muitas vars.
- BRAVA — Babá.
- DA PRAIA — Babá.
- MELAO AMARELO** — Melão casca de Carvalho.
- CABOCLO, ou DE CABOCLO — Sicana odorifica Naud. Cucurbitácia de grande desenvolvimento e trepadora, com grandes bagas cilíndricas, arroxadiadas, recomendáveis pelo sabor e aroma.
- CASCA DE CARVALHO — Cucumis melo L. Cucurbitácia trepadora, com apreciadas bagas, volumosas, elipsoides, costadas e de epícarpo rugoso.
- CROÁ ou CRUÁ — Melão caboclo.
- D'AGUA — Melancia.
- DE CHEIRO — Melão caboclo.
- DE MESA — Melão caboclo e M. casca de carvalho.
- DE MORCEGO — Abóbora do mato.
- DE SÃO CAETANO — *Momordica charantia* L. Cucurbitácia gavinha-sa e rústica. Fos tidas como anti helmínticas, calmantes e purgativas. Fr cápsula carnosa.
- DE SÃO VICENTE — Melão de S. Caetano.
- MELA PINTO** — Erva tostão.
- MELINDRE, MELINDRO** — *Asparagus verticillatus* L. Liliácia semi sarmentosa e ornamental. Fos lineares e verticiladas; bagas encarnadas. O Bambu chinês e a Verbena têm igual apelido.
- NÃO ME TOQUES — Beijo de frade.
- TREPADOR — Bambu chinês.
- MELISSA** — Erva cidreira.

- DE PISON — Mentrasto guaçu.
MELITÉIA — Erva cidreira.
MELOEIRO — Melão (Indistintamente).
MELOMBE — Milhomens (Indistintamente).
MELOSO — Rabugem de cachorro.
MEMBECA — Capim membeca.
MENDANHA — Laranjeira do mato.
MENDOBI, MENDOIM, MENDUBI — Amendoin.
--**BRAVO** — Boi gordo.
MENDUBI GUAÇU — Plinhão de purga.
MENDUI — Amendoin.
MENSAGEIRA DA NOITE — Boa noite (*I. bona-nox*).
MENSTRUÇÔ — Mastruço (Indistintamente).
MENSTRUSTO — Mastruço (Indistintamente).
MENTRASTO — *Ageratum conyzoides* L. Composta erbácea e rústica. Sp pilosa e aromática. Tônica, carminativa, diurética e anti diarréica.
--**DO GRANDE** — Mentrasto guaçu e Neves.
--**GUAÇU** — *Hyptis suaveolens* Poir. Labiada sub arbustiva. Tida por anti espasmódica e sudorífica.
MENTRUSTO, MENTRUZ — Mastruço (Indistintamente).
MERCÚRIO — Galinha choça.
--**DO CAMPO** — Curraleira (*C. Antrophyphiliteus*) e Galinha choça.
--**DOS POBRES** — Manacá.
--**VEGETAL** — Manacá.
MERECAM — Buranhém.
MERENDIBA, MERINDIBA — *Terminalia brasiliensis* Camb. Combretácia elegante, de grande porte. Madeira para carpintaria. Com o mesmo nome e características, figura a *T. Januarensis* DC.
--**BAGRE** — Merendiba (*T. januarensis*).
--**ROSA** — *Lafoensia glyptocarpa* Kochn. Litrácia arbórea e madeira de lei.
MERITI — Buriti, especialmente o B. do brejo.
MESCLA — Almêcega.
MESPILO — Ameixa do Japão.
METI — Vela da pureza.
MEXERICA, MEXERIQUEIRA — Laranja tangerina e, impropriamente, a Fo de fogo.
MICUIBA — Bicuiba.

- MICUTAIBA** — Moçutaiba.
MIIICA — Buranhém.
MIJARA DO NORTE — Urinária.
MIJARONA DO NORTE — Urinária.
MILAGRE DE COSME E DAMIAO — Viuvinha.
--**DE SÃO JOAQUIM** — Folha da Costa.
MIL GRAOS — Brilhantina (*P. microphilla*).
MILHA (ou **MILHAN**) **DO NORTE** — Capim lixa.
--**DO SERTÃO** — Capim guiné.
--**GIGANTE** — Capim guiné.
--**GRANDE** — Capim guiné.
--**PÉ DE GALO** — Capim pé de galinha (*P. crus-galli*).
--**VERDE** — Capim guiné.
MILHAZINHA, MILHAZINHO -- Capim guiné.
MILHETE GIGANTE — Capim porró.
MILHO — *Zea mays* L. Gramínea anual, mui conhecida e generalizada, com muitas raças e vars.
--**ALPISTA ou ALPISTE** — *Phalaris canariensis* L. Gramínea erbácia, de folhas estreitas e frs — criopses — apetecidos pelos pássaros e ricos em amilúcios.
--**BRAVO** — Capim massambára.
--**BURRO** — Milho zahurro (Fartura).
--**DA TERRA** — Milho.
--**DO MARANHÃO** — Milho gigante.
--**FARTURA** — Fartura.
--**GIGANTE** — Milho. Var apresentando longas e delgadas espigas.
--**SORGO** — Vid Sorgo.
--**ZABURRO** — Vid Sorgo.
MILHOMENS, MILHOME — Inúmeras Aristoloquiáceas do Gc Aristoloquia. Sarmentos silvestres, de grande desenvolvimento e com fls de enormes corolas gamopétalias; fr capsular com o aspecto de cestinhas. Destacam-se, entre outras sps, as seguintes: *A. brasiliensis* M. e Zucc; *A. birostria* Duch; *A. cymbifera* M. e Zucc; *A. eriantha* M. e Zucc; *A. pubescens* Wild; *A. trilobata* L. São também ornamentais, pela curiosidade das fls e medicinais. Ras empregadas contra as mordeduras de cobras.
MILHO ROXO — *Zea mays* L. var *violaceus*. Espigas com fls violetáceas.
MILOLÓ — Fruta de conde.

MILOTO — Fruta de conde.

MIMO DE VENUS — Graxa.

—**DO CÉU** — *Antigonum leptopus* Hoot. Poligonácia trepadeira e gavinosa, de grande desenvolvimento. Fls róseas em cachos. Ornamental — para caramanchões. Sp. melifera.

MIMOSA — Esponjeira. Impreciso por saber a muitas Mimosáceas.

—**BARBA DE TIMAN** — Barbati-mão.

—**DA VEREDA** — *Cassia ursinoides* Harms. Leguminosa.

—**DOS JARDINS** — Norma.

MIMOSO DE CACHO — Graminha.

MINA DE OURO — Cipó cruz.

MINDUBI — Amendoim.

MINERINHA — Mate-me embora.

MINERVA DOS JARDINS — Norma.

MINHONETE — Resedá.

MINUI — Algodão.

MIOSOTA, MIOSOTIS — Não me esqueças.

—**DOS PANTANOS** — Não me esqueças.

—**DOS POETAS** — Não me esqueças.

MIQUELIA — Magnólia amarela.

MIRANTE — Bacupari.

MIRAQUITÁ — Pau ferro.

MIRINDIBA — Merendiba.

MIRITI — Murici.

MIRIUBA — Murici.

MIRIXI — Murici.

MIRORÓ — Unha de boi.

MIRRA — Almecêga (*P. leucarpia*).

MIRTO — Murta.

—**DE AFRODITE** — Murta.

MIRUÉ — Copaíba.

MISSARA — Banana de São Tomé.

MISSUTAIBA — Moçutalba.

MIUM — Capim comprido.

MOCAIUBA — Macauba.

MOCAJÁ — Macauba.

MOCAJUBA — Macauba.

MOÇAS E VELHAS — Ciumes de velha.

MOÇATAIBA — Moçataiba.

MOCAUBA — Macauba.

MOCHA — Banana (Especialmente a de São Tomé).

MOCETAIBA, MOCITAIBA — Moçataiba.

MOCÓ — Ipca bastarda (*R. bahiensis*) e a *Cassia argentina*.

MOCOCONA — *Inga fagifolia* Willd ou talvez *I. salzmanni*. Leguminosa robusta e inculta, com frs édules — vagens curtas e amarelas.

MOCONHA — Diamba.

MOÇOS E VELHOS — Ciumes de velha.

MOCUGÊ — Couma rigida M. e Arg. Apocinácia arbórea, inculta, com bagas saborosas, longo pedunculadas, e leitosas. Lenho de segundâ.

MOCUJO — Mocugê.

MOCUNO — Mucuna.

MOCUTAIBA — *Zollernia iliciflora* Vog. Leguminosa copuda e silvestre, com vagens comíveis. Árvore tanígera e elegante. Madeira de lei, muito dura, variando de cor, de acordo com as vars. Tem o mesmo apelido a *Swartzia crocea* Bent, também madeira de lei.

MOELA DE GALINHA — Arapoea.

MOFUMBO, MOFUMO — Cipó-baba.

MOGANGA, MOGANGO — Abóbora (Especialmente Gerimum e Menina).

MOGARIM — Bogari.

MOGNO BRANCO — Eucalipto (Algunas sps).

MOICA — Buranhem.

MOISÉS — Barbati-mão (Especialmente a *Stryphnodendron guianense* Aubl. Leguminosa arborea e inculta. Vld Barbatimão).

MOLIANA — Colher de vaqueiro.

MOLUNGÚ, MORUNGÚ — Mulungú (Indistintamente).

MOMBINA — Umbú.

MONCO DO PERU — Cauda de rato (*A. caudatus*).

MONDO — *Ophiopogon japonicum* Ker. Liliácia prolífica, erbácia e rizomatosa. Fls verde-escuras. Recidivamente, é chamada Grama da sombra.

MONDORORÓ — Mal me quer. (Injustificável pois é mais cabível ao Mundururú).

MONDUCURÚ, MONDURUCÓ — Mandacarú, Figueira de Berbária e as Cactáceas conhecidas por Palmatória do diabo.

MONDURURÚ — Mundurú.

MONESIA — Buranhem.

MONGUBA — Munguba.

MONJOLO, MONJOLEIRO — Jacaré (Denominação cabível a outras Leguminosas).

—ROXO — Jacaré.

MONÓRDICA — Melão de São Caetano.

MONSENHORES — Crisântemos.

—AMARELOS — Mal me quer (*C. carinatus*).

MORANGA — Abóbora (Especialmente Gerimum e menina).

MORANGO — *Fragaria vesca* L. Rosácea erbácea, com frs — bagas — encarnadas, piramidais e acre-doces. Sp adstringente. Pouco cultivado na Bahia.

MORCEGUEIRA — Angelim e spa afins.

MORECI — Murici.

MOREIRA — Amoreira (Indistintamente).

—**AMARELA** — Tatagiba.

MORELES EM CACHOS — Tintureira.

MÓRICI — Murici.

MORINDIBA — Merindiba.

MORINGA — Chuva de prata.

MORIRIÇÔ — Baririçô.

MORÓ — Angico branco.

MOROCOTÔ — Mandiocai.

MOROLÔ — Biriba de Pernambuco.

MORORÔ — Unha de boi e Limão do mato. Impreciso.

—**CIPÓ** — Cipó escada.

MOROSO CIGANO — Mundururu.

MOROTOTÔ — Mandiocai.

MORRE JOÃO — Sensitiva.

MORURÉ — Pau ferro.

—**DA FLOR ROXA** — Baroneza (*E. azurea*).

—**DE CANUDO** — Baroneza (*E. azurea*).

—**ORELHA DE VEADO** — Baroneza (*E. azurea*).

MOSCADEIRA DO BRASIL — Bicubita açaú.

MOSQUETA — Bogari.

MOSQUITEIRO — Sete casacas.

MOSSAMBÊ — Mussambé (Indistintamente).

MOSTARDA, MOSTARDEIRA — *Sinapis nigra* L. Crucifera erbácea e cultivada. Fos comíveis; fr — folículo — com sementes de mau cheiro, usadas em sinapismos.

—**BRANCA** — *Sinapis alba* L. Crucifera quasi com os caracteres da Mostarda (*S. nigra*).

—**DA CHINA** — Mostarda, indistintamente.

—**INGLEZA** — Mostarda branca.

—**NEGRA** — Mostarda.

—**ORDINÁRIA** — Mostarda.

—**Preta** — Mostarda.

MOSTARDÃO — Mostarda branca.

MOTAMBA, MOTAMBO — Mutamba.

MUCAIA, MUCAJA — Macauba.

MUCAJÉ — Mocugê.

MUÇAMBÊ — Mussambé (Indistintamente).

MACATÁIA — Louro bravo.

MUCERENGUE, MUCERERENGUE — *Clusia* sp. Guttifera arboreta, de fos coriáceas e com belas inflorescências róseas. Sp ainda não bem identificada, encontrada no Morro de S. Paulo.

MUCHOCO — Mulungú (Indistintamente).

—**VERMELHO** — Mulungú.

MUCUCURANA — Macucurana.

MUCUGÊ — Mocugê.

MUCUJÁ — Macauba.

MUCUMBE — Pau pombo.

MUCUNA, MUCUNA, MUCUNAM — *Mucuna pruriens* DC. Leguminosa sarmentosa e inculta. Frs — vagens — robustas, revestidos de pelos urentes — “pô de mico”. Sementes diacídicas — “coroa de fraude”. Excelente adubo verde.

—**AÇU ou UACU** — *Dioscorea violacea* M. Leguminosa trepadeira e robusta, bastante parecida com a Mucuna. Acredita-se ser a fornecedora do “pô de mico”.

—**BRANCA** — Vid Mucuna preta.

—**CIPÓ** — Mucuna.

—**RAJADA** — Mucuna preta.

—**Preta** — *Stizolobium aterrimum*. Leguminosa sarmentosa de grande desenvolvimento. Boa forragem e adubo verde, com as varas: *S. niveum*, a Mucuna branca e *S. durringianum*, a rajada.

MUCUNGO — Mutamba.

MUCURA, MUCURA-CAA — Tipi.

MUCURI — Bacupari.

MUCUTÁIA — Louro bravo.

MUÇUTAIBA — Mocutaiba.

MUFUMBA, MUFUMBO, MUFUNO — Cipó aba.

MUIRACOATIARA, MUIRACOTIARA — *Centrolobium paraense* Tul. Leguminosa de elevado porte e robusta. Vagens espinhosas; madeira de primeira, para marcenaria. O Gonçalo Alves tem o mesmo apelido.

MUIRACUTACA — Muçutalba (*S. crocea*).

MUIRAJUBA — Guarajuba.

MUIRAOBI — Pau ferro.

MUIRAPAGÉ — Cumaru verdadeiro. Vid Cumaru e Imburana de cheiro.

MUIRAPIRANGA — Pau Brasil e, menos propriamente, o Conduru (*B. parenthesis*).

MUIRAQUETECA, MUIRAQUETICA — Cipó caboclo.
MUIRAREMA — Visqueiro.
MURATETECA — Cipó caboclo.
MUIRAUNA — Barauna, Brauna.
MULATA, MULATEIRA — Grapac-punha.
MULATINHA SEM VERGONHA — Pingo de lacre.
MULEMBA — Gameleira, Gameleira branca.
MULULO — Araticum cortiça.
MULUNGÚ — *Erythrina mulungu* M. Leguminosa de bom crescimento, Cau armado; fls encarnadas; lenho, levíssimo; córtex peitoral e cal-mante. São do mesmo tipo, e com o mesmo apelido, a *E. corallodendron* L.; *E. crista-galli* L.; *E. fal-cata*.
MIRIM — Jequiritsi.
MUNDUBÍ — Amendoi.
MUNDURÚ, MUNDURURÚ — Mou-riria pusa Gard. Melastomácia ar-boreta e inculta. Grandes folhas elípticas; bagas pequenas e comíveis.
BRANCO — *Miconia prasinifolia* DC. Melastomácia arboreta e inculta, com folhas trinervias e fls albas, em paniculas.
VERMELHO — *Miconia calvescens* DC. Melastomácia do mesmo tipo das precedentes.
MUNDUTI GUAÇU — Pinhão de purga.
MUNGUBA — Mamorana. Impróprio pois cabe à *Bombax mungubu* M. e Zucc., que embora muito parecida com aquela, tem mais altura e envergadura.
MUNGUENGUE — Cajá.
MURAQUETICA — Cipó caboclo.
MURARIENA — Visqueiro.
MURECI — Murici.
MURERU — Baronza e outras Pontederiacias, conhecidas por Aguapé e Mururé. Impropiamente o Angelim pedra.
MURIANGOMES — Lingua de vaca.
MURICÍ — Murici.
MURICÍ — *Byrsinina sericea* DC. Malpigiácia arboreta e ornamental. Fls amarelas, em cachos eretcos; fr baga.
AÇU — Murici guaçu.
AMARELO — *Cassia verrucosa* Bent. Leguminosa arbórea. Tán-gera e ornamental.

BRANCO — Canela santa.
CASENDO — Murici guaçu.
DA FRUTA MIUDA — Murici.
DA MATA — Murici guaçu.
DE CANUDO — Lentilha d'água.
GRANDE — Murici guaçu e, im-propriamente, o Pau de tucano.
GUAÇU — *Malpighia verbascifolia* L. Malpigiácia de elevado porte e florestal. Fr drupa entável, madeira de lei para construções. Vars conhecidas: villosa, leiocarpa e intermédia.
PAGÉ — Lentilha d'água.
PENIMA ou PINIMA — Murici.
PEQUENO — Murici guaçu (Na-turalmente em alguma região onde não atinge seu natural evolu-men-to).
RASTEIRO — Murici guaçu (As mesmas considerações feitas a pro-pósito do M. pequeno).
VERMELHO — Pau de cortume.
MURIRI — Crulli.
MURITI, MURITIZEIRO — Buriti.
MURIUBA — Murici (Indistintamen-te).
MURIXI — Murici (Indistintamente).
MURTA (dos jardins) — *Myrtus communis* L. Mirtácia arboreta, robusta e copuda. Fls albas aro-máticas, simbolizando o amor. Or-namental.
CHEIROSA — Murta (Dos jar-dins).
CULTIVADA — Murta (Dos jar-dins).
DA FOLHA LARGA — Murta pi-menta.
DA PRAIA — *Eugenia rotundifo-lla*. Mirtácia arbórea e inculta.
DE PARIDA — Crulli.
DO CAMPO — Aglaia e Cambuí preto.
DO MATO — Quina do Brasil.
PIMENTA — *Pisonia campestris* Nett. (Não confundir com a Pi-menta da Jamaica). Nictaginácia arbórea, de folhas orbiculares e fls drupáceos pequenos, fusiformes e encarnados.
VERDADEIRA — Murta (Dos jar-dins).
MURU — Coquilho.
MURUBÚ — Capim guiné.
MURICI, MURUCHI — Murici.
MURUCUÍA, MURUCUJA — Mara-cuá (Indistintamente).
MURUMBÚ — Capim guiné.

MURUNGÓ — Mulungú.

MURURÉ DA FLOR ROXA — Barroneza.

— PAGÉ — Lentilha d'água.

MURURÉ — Mururé e Pau terra.

MURUTÍ — Buriti.

MURUXI — Murici.

MUSGO COMUM — *Polytrichum commune*. Muscínea de pequeno porte.

-- DA NOVA ORLEANS — Barba de velho (*T. recurvata*).

— ESPANHOL — Barba de velho (*T. recurvata*).

MUSQUIÉ — Quiabo de cheiro.

MUSSAMBÉ — Apelido de algumas Caparidácias do gê. Cleome. Com as mesmas características principais, diferem entre si pelo tamanho, número dos foliolos de suas folhas palmadas. Frs siliquas, com aspecto de vagens alongadas; fls albus, com 4 pétalos livres. Spas incultas.

— BRANCO — Mussambé de espinho.

— CATINGA — Catinga de negro.

— COR DE ROSA — Mussambé de cinco folhas.

— DE CINCO FOLHAS — *Cleome pentaphylla* L. Caparidácia arbustiva. Sp vesicante.

— DE ESPINHO — *Cleome spinosa* L. Caparidácia sub arbustiva, armada, com folhas palmadas e compostas de 7 foliolos; florescência em rácimo elegante.

— DE SETE FOLHAS — Mussambé de espinho.

— DE SINAPISMO — Mussambé de cinco folhas.

MUSSITAIBA, MUSSUTAIBA —

Moçutaiba.

MUSSURANDABA, MUSSURANDU-
VA — Maçaranduba.

MUSTARDA — Vid Mostarda.

MUTAMBA — *Gnázuma ulmifolia* S. H. Esterculiácia arboreta, ramosa e elegante. Fr — baga comível. Fibras para corduaria, lenho para carpintaria. Tida como diaforética e purgativa.

— PRETA — Ivitinga.

MUTAMBO — Mutamba.

MUTOMBO — Mutamba.

MUTUMUJU — Potumuju.

MUTUTI — Sangue de drago (*P. drago*).

MUXITAIBA — Moçutaiba.

N

NABICA — *Brassica napus* L. var. *rapinifera*. Crucifera erbácia e hortense. Nessa var de Nabo, as tuberas são longas.

NABO — *Brassica napus* L. Crucifera hortense e erbácia. Latifólios comíveis como a Couve; ra tuberosa, muito apreciada, alva ou roxa, chata ou redonda, segundo as varas.

—BRANCO — Vid Nabo, var muito encontradiça.

—DE COMER — Nabo.

—DE MILÃO — Nabo (Var chata).

—JAPONÊS — Rubiante.

NABOMBO — Mutamba.

NABORANDI — Jaborandi (Indistintamente).

NABO REDONDO — Vid Nabo.

—ROXO — Vid Nabo. Geralmente chatos — discóides — e roxos.

NADIAMBA — Diamba.

NAFÉ — Quiabo.

NAGUARANDI — Jaborandi (Indistintamente).

NAIA — Indaiá.

NAJURÚ — Ariú.

NAMBI — Coentro bravo.

NAMBORANDI — Jaborandi (Indistintamente).

NAMBU — Agríao do Brasil e Espinofre.

NANA — Ananáz e Impropiamente Carnica.

—DE RAPOBA — Ananáz pelado.

NANDI — Capeba e, especialmente, o Jaborandi (Indistintamente).

NANDIROBA, JANDIROBA — *Feuillea trilobata* L. Cucurbitácia trepadeira, de grande desenvolvimento. Cau gavinhoso; fos trilobadas; fr baga, com sementes, fornecendo óleo tido como emético, pectorativo, astringente e tônico.

NANDU — Capeba e Jaborandi falso.

NANDUVA — Esponjeira.

NANGONE — Noz de cola.

NAO ME ESQUEÇAS — *Myosotis palustris* L. Borraginácia erbácia e ornamental. Cau erecto; fls em elegantes rácimos, de cor azulada.

—ME OLVIDES — Não me esqueças.

—ME TOQUES — Beijo de frade e dois amigos.

—TE ESQUEÇAS DE MIM — Não me esqueças.

NAPOLEÃO — Lírio do brejo.

NARCISO — Lírio do brejo e Lírio eucarístico.

—BRANCO — Lírio do brejo.

NAVALHA — Capim navalheira e esp. afins, conhecidas por *Tiricium* (*Scleria*).

—DE MACACO — Capim navalheira e *Tiriricas* (*Scleria*).

—DE MICO — Capim navalheira e *Tiriricas* (*Scleria*).

NAVALHEIRA — Capim navalheira e *Tiriricas* (*Scleria*).

NENUFAR — *Nymphaea alba* L. Ninfácia erbácia e natante. Flos ovalares; fls vistosas e albas. Ornamental. N. lutes, do mesmo tipo, com fls amarelas.

—AMARELO — Nenufar (*N. lutes*).

NESPERA, NESPEREIRA DO JAPÃO — Ameixa do Japão.

NEVES — *Hyptris pectinata* Poit. Labiada sub arbustiva, piramidal e inculta. Cau quadrangular; fos ellipticas e denteadas; fls em cachos difusos. Sudorífica.

NHÁ — Castanha do Pará.

NIA — Castanha do Pará.

NICURÍ, também muito conhecida por **LICURÍ** — *Cocca coronata* M. Palmácia de média altura, selvática, proflífera, xerófita, do sertão e do litoral. Cau cilíndrico, fornecendo o "brô", farinha aproveitada nas secas; fos pinadas, do 2º grau, e verticiladas, fornecendo fibras para chapéus, abanais, estriadas etc. e a preciosa "cera de Nicurí", que constitui uma das riquezas da Bahia; frs apetecidos pelo gado e com sementes de óleo fluidíssimo. Dá também palmítio deles tudo se aproveita.

—DE CAROCLO — Nicurí.

NICURIJIBA — Nicurí.

NICURIOBA — *Cocca schizophylla* M. Palmácia rústica, do mesmo tí-

po do Nicurí e nem ter a mesma importância. As fós são mais eretas, os coquinhos maiores, amarelos-vermelhados, apenas aceitos pelo gado.

NICURIROBA — Nicurioba.

NIMBOJ — Carniça.

NINFEA — Lírio do brejo. Mais cabível às Ninfáceas.

NINGA — Aninga.

NISPERO — Sapoti. Mais cabível à Nêspora.

NOGUEIRA — *Aleurites moluccana* Wil. Euforbiácia arbórea de rápido desenvolvimento. Latifólios; fls alvas, em abundantes cachos; fr cápsula, com sementes que fornecem excelente óleo. Sp ornamental, usada para sombriar cauacuários. Lenho leve. Do mesmo Ge, as sps: *cordata*, *fordii*, *montana* e *trisperma*.

AMERICANA — Nogueira.

BRASILEIRA — Nogueira.

BRASILEIRA DO IGUAPE — Nogueira.

DA INDIA — Nogueira.

DA PRAIA — Nogueira.

DE BANCOUL — Nogueira.

DO BRASIL — Nogueira.

DO IGUAPE — Nogueira.

DO LITORAL — Nogueira.

DO MATO — Bilreiro. Além de impreciso, também é dado à Mamona.

TUNG — Tung.

NORMA — *Lagerstroemia flor-regina* Retz. Litrácia arboreta, de parques e jardins. Fls abundantes em cachos terminais e axilares, rosadas.

NOVELOS DA CHINA — Hortênsia.

NOZ DA PRAIA — Amendoeira da Índia.

DAS MOLUCAS — Nogueira.

DE BANCOUL — Nogueira.

DE BEN — Chuva de prata. O fr aliás é capsular.

DE BUGRE — Andá açu.

DE COBRA — Chapéu de Napoleão.

DE COLA — *Cola acuminata* Schot e Endl., ou *C. nitida* Vent. Esterculiácia arboreta, robusta e cultivada. Grandes fós longo ovalares, coriáceas e vernicosas; frs capsulares, com sementes ricas em cafeína e reputadas como estimulantes, tónicas e reconstituintes.

DE GONDJA — Noz de cola.

DE GURAN — Noz de cola.

DE MANTEIGA DE DEMERARA — Pequiá.

DE SUDAN — Noz de cola.

DO BRASIL — Castanha do Pará.

MOSCADA ou **MUSCADA DO BRASIL** — Bicuiba açu.

VÓMICA DO BRASIL — Jandiroba.

O

- OACAJU** — Caju, Cajueiro.
OAGERECU, OAGERU, OAJERUM — Ariú.
OAJURÚ — Carapicú.
OALANDI — Landim.
OASSACU — Assacu.
OASSOMA — Verbasco do Brasil.
OAUACU — Babaçu.
OBENE — Noz de cola.
OBI — Noz de cola.
OBRA — Quiabo (Hortense).
OCOEMBO — Tipi.
OCRA — Erva de passarinho.
OCTUBA — Blcuiba.
OFICIAL, OFICIAL DE SALA — Cega olho.
—DE GABINETE — Cega olho.
OGERVÃO — Gervão.
OIO — Quiôlo.
OIRANA — Salgueiro.
OITI, OITIZEIRO — *Moquilea sajzmanni*. Rosácia de elevado porte e robustíssima. Depois de muitos anos, dá volumosas drupas elipsóides, de mesocarro comível e de sabor adocicado.
—ACU — Oiti.
—BEBEDO — Oiticica.
—CAGAO — Oiticica.
OITICICA — *Licania rigida* Bent. ou *Pleragyna umbrosissima* A. Cam. Rosácia silvícola e frondosa. Madeira de lei. O óleo retirado das sementes, excelente secativo, serve para tintas e vernizes e constitue indústria promissora. Tem o mesmo apelido a *Chorisia racemosa* R. e Pav., Bombácia e a *Souresia nitida* F. All da Fa das Compostas.
—VERDADEIRA — Oiticica (*L. rigida*).
OITI CORÓ — *Couepia rufa* Duck. ou *Pleragyna rufa* A. Cam. Rosácia arbórea, com latifólios, fls em cachos e drupas comíveis. Sementes adstringentes.
—COROIA — Oiti coró.
—DA BAHIA — Oiti.
—DA BEIRA DO RIO — Oiticica.
—DA MATA — Oiti coró e Oiti (M. sajzmann).

- DA PRAIA** — Oiti mirim.
—DO PARA — Oiti mirim.
—GRANDE — Oiti e Oiti coró.
—MIRIM — *Moquilea tomentosa* Bth. Rosácia copuda e de grande respetância: flores tomentosas na pagina dorsal. O qualificativo mirim não se refere ao vc, que tem enorme desenvolvimento, e sim aos frs drupas — de menores importâncias. Ornamento das ruas e parques.
OJÉ — Gameleira (*Lombrigueria*).
OLANDI, OLANDIM — Landim.
—CARVALHO — Landim.
ÓLEO BRANCO — Copaiba e Amendoim.
—DE CABOREIBA — Óleo pardo.
—DE COPAIBA — Jatai.
—DE JATAI — Jatai.
—DE MACACO — Óleo pardo.
—PARDO — *Myrocarpus fastigiatus* F. All. Leguminosa arbórea. Pétalofílio do 1.º grau; fls em cachos; vagens. Lenho duro e compacto, dando óleo aromático, secativo e anti-reumatismal. *M. frondosus* F. All. Sp congénere do mesmo tipo e quasi com as mesmas propriedades. Lenho escuro, com manchas amarelas.
—VERMELHO — Copaiba vermelha.
OLERANA — Açafrôa.
OLHO DE BOI — Mucuna e Pitomba. Embora a primeira sp dela semente e a segunda pelo fr, guardem alguma semelhança com o Olho de boi, basta a dupla significação para tornar impreciso o apelido.
—DE BURRO — Mucuna.
—DE CABRA — Jequiriti.
—DE GATO — Carnica.
—DE PEIXE — Pimenta de cheiro.
—DE POMBO — Jequiriti.
—DE SANTA LUZIA — Marianinha.
OLÍMPIA — Lírio do brejo.
OLIVA, OLIVEIRA — Azeitona.
OMBENÉ — Noz de cola.
OMBÚ — Ombú.
OMOLU — Caçadinha.
ONZE HORAS — *Portulaca grandiflora* Hoot. Portulacácia erbácia, prolífera e ornamental. Cau e fog

carnudas, fisi geralmente encarnadas, singelas ou dobradas, consounate as vars, desabrochando aproximadamente às onze horas.

OPÓNCIA — Palmatória.

OPUNTA — Palmatória.

ORA PRO NORIS — *Prioclesia bahiensis* Guert. *P. aculeata* Mill. e outras ssp do mesmo Ge. Cactáceas arbustivas, lenhosas e esganhadas, apresentando fos comíveis e touceiras de longos espinhos caulinares. Fls róssas e decorativas. Serve para cercas vivas.

ORELANA — Açafrôa.

ORELHA DE ANTA — Casca de anta.

—**DE BURRO** — Casca de anta, Baroneza e o *Oncidium lanceolatum* Lind. Orquídacia muito ornamental.

—**DE COELHO** — Coração magoado e Não me esqueças.

—**DE JUDAS** — *Auricularia auricula-judae*. Cogumelo — proto basidiomiceto — do córtex das árvores, geralmente coriáceos e encarnados.

—**DE MACACO** — Tamboril.

—**DE MONGE** — Folha da Costa.

—**DE NEGRO** — Tamboril. Sua vagem, preta, tem a conformação auricular humana.

—**DE ONÇA** — *Cissampelus ovatifolia* DC. Menispermácia trepadeira e de ra tuberosa. Fos pilosas na parte dorsal. Tónica e febrifuga; ictiofagia. Tem o mesmo apelido as ssp *tanoide* e *andromorpha*, do mesmo Ge e a Moçutiba (*C. Tor.*)

—**DE ONÇA DA MIUDA** — Erva capitão da miuda.

—**DE ONÇA DA RASTEIRA** — Erva capitão da miuda.

—**DE PAU** — *Polyporus officinalis* Fr., *Fomes septifer* Cook. Cogu-

melos poliporáceos, dentre outros que proliferam na madeira em decomposição.

—**DE PAU VERMELHA** — *Boletus sanguineus* L. ou *Polyporus sanguineus* L. Cogumelo poliporáceo, achatado, de contorno arredondado e encarnado. Tido como febrifugo, cordial e digestivo.

—**DE PRETO** — Tamboril.

—**DE RATO** — Douradinha do campo, Capiçoba (*P. acre*) e Não me esqueças. Impreciso.

—**DE VEADO** — Baroneza e Taioba.

—**GIGANTE** — Bardana.

ORÉLIA — Flor de São João.

ORGEVÃO, ORGIBÃO, ORGIVÃO — Gervão.

ORICURI — Nicuri.

ORINDEUVA, ORINDIUVA — Crin-diúva.

OROBÓ — Noz de colá.

OROBUTAN — Pau brasil.

ORQUÍDEAS — Além das Chitas e de outras, referidas pelos nomes vulgares, merecem registo as seguintes: *Cattleya bicolor* Lind., *C. labiata* L., *C. aclandiae* Lind., *Laelia crispa* Reich., *L. purpurata* Lind, dentre inúmeras outras.

ORTELA — Hortelã.

ORTIGA — Urtiga.

ORTIGÃO — Cansanção (*U. sub peltata*).

ORUCÚ — Açafrôa.

OUBI — Noz de colá.

OUCUIBA, OUCUUBA — Bicuba.

OURICURI — Nicuri.

OURO EM PENCA — Pega rapáz.

OVO DE TICO-TICO — *Rodriguesia maculata*. Orquídea ornamental.

—**VEGETAL** — Cajimito e Sapoti (Em virtude da configuração dos frs.).

P

PACAPIÁ — Nandiroba.

PACARÁ — Tamboril.

PACARI — *Lafcensisia sensifolia* Koltz.

Litrácia arbórea e ornamental. Fls campanuladas; fr cápsula. Matéria corante; lenho para carpintaria. Apelido também da Rabugem de cachoço.

—DA MATA ou DO MATO — Pacari.

—SELVAGEM — Pacari.

PACAVIRA — *Heliconia pendula*

Bent. Musácia sub arbustiva, com latifólios peciolados e fls bracteadas. Fibras têxteis.

PACHAU — Pajau.

PACHIUBA — Castiçal.

PACOBA, PACOBÁ, PACOBEIRA,

PACOVA — Banana (Indistintamente). Tem o mesmo apelido, « Cardamomo: Pacová. »

PACOBUÇU — Banana de S. Tomé. Cabe melhor à Banana da terra.

PACO CATINGA — Cana de macaco (Costus).

PACO-PACO — *Pseudo-abutilon spicatum* HBK. ou *Wissandula spicata*. Malvácea arbustiva, valendo pelas fibras têxteis. Fls amarelas, em longas inflorescências.

PACORI, PACURIUVA — Bacuri.

PACORU — Bacuri.

PACO SEROSA — Cardamomo.

PACOTE — Butua de corvo.

PACOVA BRAVA — Bananeira do mato.

—CATINGA — Bananeirinha do mato (*H. psittacorum*).

—MIRIM — Banana ouro.

—SOROROCA — Árvore do viajante.

PACU — Pau pombo.

PACURI — Bacuri e Pacari.

PACURIUVA — Bacuri.

PADRE NOSSO — Jequiriti.

PAI DE FAMILIA — Feijão preto.

PAIERAIBA — Fedegoso.

PAIM — Diamba.

—PAINA, PAINEIRA — Denominação conferida a várias sps de Apocináceas, e, neste caso, o Cega olho, Asclepiadáceas e, especialmente às Bombacias.

—DE CUBA — Mamorana.

—DE FLECHA — Tabua.

—DE PENAS — *Echites peltata* V. Apocinácia longo sarmentosa, com longas siliquas, repletas de painas para colchoaria. Emoliente e ornamental.

—DE SANTA BÁRBARA — Algodão de seda.

—DE SAPO — Cega olho.

—DE SEDA — Algodão de seda.

—DO BREJO — Tabua.

—OFICIAL DE SALA — Cega olho.

PAINÇO GRANDE — Capim Guiné, e C. de Angola. Impreciso por caber ainda a outras sps.

PAINEIRA — Barrigudas (Indistintamente), diversas sps de Bombacias e Pachirus e, assim, as conhecidas por Embiratanhas e Sumumas. Todas as que fornecem painas.

—BRANCA — Barriguda (C. speciosa).

—DE CUBA — Mamorana.

—DE FLORES RÓSEAS — Barriguda (C. speciosa).

—DE EMBIRUÇU — Imbiruçu.

—LOURA — Cipó de penas.

PAIURA — Oiti corô.

PAJAMARIOBA, PAJOMARIOBA — Fedegoso.

PAJAU, PAJEU — *Triplaris pajahu* M. Poligonácia arbórea e florestal. Interessante inflorescência cor de palha. Fr cápsula. Ornamental.

PAJURÁ — Oiti corô.

PALANI — Parreira brava.

PALHA BRANCA — Capim milhar do brejo e Côco amargoso.

—DA GUINÉ — Capim Guiné.

—DE PENACHO — Capim dos pampas.

—DE SANTA FÉ — Capim gigante das baixas.

—MANSA — Capim gigante das baixas.

PALISSANDRA — Caroba guaçu.

PALMA — Designação impropriamente usada na Bahia para a Palmátria sem espinhos.

- BRANCA — Palma de Santa Rita. Imprópria, pois na sp ha vars com fls coradas.
- CRISTI — Mamona.
- DE CHICOTE — *Laelia purpurata* Lindl. Orquídea muito ornamental.
- DE SANTA RITA — *Gladiolus communis* L. Iridácia erbácia, notável pela beleza de suas fls, dispostas em longas clímacias.
- DE SAO JOAO — Pinheirinho dos campos.
- DE SÃO JORGE — Espada de ogum.

PALMADORA — Palmatória.

PALMA MATER — Palmeira imperial. Referência à primeira sp. plantada do Jardim Botânico por D. João VI.

SANTA — Palmatória sem espinhos.

PALMATÓRIA, PALMATÓRIA DO DIABO — Várias Cactúcias do Gé Opuntia. Cau articulado e fortemente armado. Áfilas; fls vistosas; frs bagas piróides. Servem de exemplo: *Opuntia brasiliensis* Haw, com o tronco cilíndrico; *O. bahiensis*; *O. vulgaris* Mill, registadas com outros nomes vulgares.

GRANDE — Palmatória (*O. brasiliensis*).

MIUDA — *Opuntia inamoena* K. Schum. Cactúcia com os artículos do cau menores que os da Palmatória. Sp arbórea com fls amarelas e encarnadas.

SEM ESPINHOS — *Opuntia tuna* Mill. ou *O. burbanki*. Cactúcia arbustiva, xerofita e inerme. Preciosa sp para o gado, nas fortes estiagens, em vista de sua abundante água de composição. Apresenta-se sob 2 varas: a "gigante", de rápido crescimento, e a "doce". Ambas muito resistentes.

PALMEIRA AFRICANA — *Caryota urens* L. Palmácia alta, robusta e ornamental. Fos longas e compostas com folíolos despedaçados. Frs pequenos em enormes cachos, fortemente urentes. Merece o mesmo nome a *Caryota mitis* Lour., de menor porte. Ambas dão sagu.

BAMBU — Areca bambu.

CATOLÉ — Catolé.

CIPÓ — Titara.

DA GUINÉ — Dendê.

DE CERA — Carnauba.

DE SAGU — Sagu. Aliás não é Palmácia.

IMPERIAL — Oreadoxa oléacea M. Palmácia altíssima ereta, ornamental e muito generalizada. Fos compostas, pinadas e verticiladas.

REAL — Palmeira imperial. É mais real que, propriamente, imperial.

PALMEIRIM — Catolé.

PALMEIRINHA D'ÁGUA — *Cyperus alternifolius* L. Ciperácia sub arbustiva, cespitosa, hidrófila, com fos lineares e fls em curtas espigas.

DE PETRÓPOLIS — *Coccus weddelliana* Wendl., ou *Glaziovia martiana*. Palmácia sub arbustiva, ornamental, para interiores. Fos compostas pinadas, com delgados e longos pectíolos.

DE SAGU — Sagu.

DE VENUS — Coqueiro de Venus.

PALMIRA — Borasso.

PALMITEIRO — Assai e, naturalmente, outras Palmácias.

PALMITO AMARGOSO — Catolé e Coqueiro amargoso.

DOCE, ou simplesmente **PALMITO** — *Euterpe edulis* M. Palmácia elegante, parecida com o Assai a qual, como o Pati, fornece palmito adocicado.

GERIBA ou **GERIVÁ** — Pati.

JUSSARA — Assai.

PANACÉIA — Braço de preguiça e outras sps.

ANTÁRTICA — Fumo.

PANAN — *Araticum de Brejo*.

PANASCO — Capim mimoso (*E. articulata*).

DO TABOLEIRO — Capim rabo de raposa (*S. geniculata*).

PANCAGA — Cairuçu.

PANCRAZIO MARÍTIMO — Raio de Jupiter.

PÂNDANO — *Pandanus utilis* Bor. Pandanácia arbórea, ramificada e ornamental. Fos coriáceas e verticiladas. Apresenta fibras texteis.

PANGO — Diamba.

PANI — Parrira brava (*A. rufescens*).

PAO DE CUZO — Azedinha.

DO CHILE — Mandioca.

PAPA — Batata ingleza. Apelido preferível a este, segundo Eoehne,

PAPACONHA — Ipecacoanha (Indistintamente).

PAPAGAIO — *Euphorbia pulcherrima* Willd. Euforbiácia arboreta de ramificação difusa. As fós mais próximas das fls tomam, durante o inverno, a pigmentação sanguínea — são brácteas de belo efeito decorativo. Outras sps, como o Cáldio (*bicolor*), tem o mesmo apelido.

PAPAI NICOLAU — Féi da terra (*C. apicata*).

PAPAIO — Mamão.

PAPARAUBA — Pau paraiba.

PAPATERRA — Açucena do mato, Douradinha (*L. diffusa*) e Limão do mato. Impreciso pela múltipla significação.

PAPEAGAÇU — Ivitinga.

PAPIRO BRASILEIRO — Pirí-pirí.

PAPO DE ANJO — Sapucainha.

—**DE GALO** — Milhomens (Indistintamente).

—**DE PERU** — Denominação vulgaríssima do Milhomens.

PAPOULA, PAPOILA — *Papaver somniferum* L. Papaverácia exótica, de cujas cápsulas retira-se o ópio.

—**BRANCA** — Papoula.

—**DE DUAS CORES**, ou melhor,
—**DE TRES CORES** — *Hibiscus mutabilis* Car. Malvácia arboreta e muito ornamental, pela beleza de suas fls — albas pela manhã, róseas ao meio dia, escarlates ao entardecer.

—**DE ESPINHO** — Cardo santo.

—**DE ÓPIO** — Papoula.

—**DO MÉXICO** — Cardo santo.

—**DO ORIENTE** — Papoula.

—**DQ SÃO FRANCISCO** — *Hibiscus cannabinus* L. Malvácia arbustiva e aculeada. Fls alvas de centro encarnado. Fibras longas e flexíveis, substituindo a Juta, constitue o Câñhamo brasileiro. Frs oleosos.

—**ESPINHOSA** — Cardo santo.

—**ÓPIFERA** — Papoula.

PAPOULO — Papouia (Indistintamente).

PAPUÁ, PAPUAN — Capim papuan.

—**VERDADEIRO** — Capim papuan.

PAPUIRA — Capim papuan.

PARÁ — Conambi.

PARAACACÁ — Tipi.

PARACARI — Rabugem de cachorro.

PARACOCA — Tipi.

PARACURI — Rabugem de cachorro.

PARAFUSO — Sacarolha.

PARAGUAIA — Cipó suma.

PARAIBA — Pau paraiba.

PARAIZO — Sabonete de soldado.

PARAJU — Maçaranduba.

PARAMARIOBA — Fedegoso.

PARA-PARA — Caroba e Mandiocai.

PARAPARAIBA — Umbuba (Indistintamente). Impróprio por ser mais cabível ao Pau paraiba.

PARA-RAIO — Sabonete de soldado. Pela crença de afastar raios e trovões.

PARARAUBA — Pau paraiba.

PARASSÓL — Astrácea.

PARA TUDO — *Piptocarpha rotundifolia* Bak. Composta arbustiva, conhecida por Candeia e como anti luética. Muitas outras sps desfrutam o mesmo título: Casca de anta, Coração da Índia, Casca para tudo, Erva moura do sertão etc.

TUDO AROMÁTICO — Erva moura do sertão.

PARATURA — Carrapicho de cavalo.

PARECE MAS NÃO É' — *Euphorbia heterophylla* L. Euforbiácia sub arbustiva e prolífica. Lembra o Papagáio, porque as fós florais se apresentam encarnadas, na porção justa pectilar. Tida como mata pasto.

PARICA — Angico e Corticeira do campo (*A. sensitiva*).

—**GRANDE** — Visgueiro.

PARICARANA — Sucupira.

PARICASINHO — Corticeira do campo (*A. sensitiva*).

PARIMA — Ubá.

PARIPAROBA — Capeba.

PAROVA PRETA — Barauna e Bruna.

PAROVAUNA — Baroneza.

PARRA — Parreira.

PARREIRA — *Vitis vinifera* L. Vitácia sarmentosa, universalmente cultivada e que apresenta inúmeras sub sps e vars.

—**BRANCA** — Parreira brava.

—**BRAVA** — Por esse apelido, e por Abutua, identificam-se algumas Menispermáceas de Ges diversos. São sarmentos, com ras tuberosas e frs bacáceos, com o feitio da Uva: Clampeiros tomentosos V. ou Abutua rufescens Aubl.: *Chondodendron*

- platyphyllum** Miers; **Cocculus filipendula** M. Ras aconselhadas contra a lepra. Tidas como eupépticas, febrifugas e tónicas.
- CAPEBA** — Parreira brava (*C. tomentosa*).
- DE JARDIM** — Mimo do céu.
- DO MATO** — Parreira brava.
- SILVESTRE** — Parreira brava.
- PARTASANA** — Tabua.
- PASSARINHEIRA** — Erva de passarinho.
- PASSIFLORA** — Maracujá (Indistintamente).
- PASTA** — Nenúfar.
- PASTO BRANCO** — Capim Jaraguá.
- IMPERIAL** — Capim Venezuela.
- RASTEIRO** — *Cassia rotundifolia* Pres. Leguminosa.
- PATA DE BOI** — Unha de boi.
- DE CAVALO** — Cairussú.
- DE GALINHA** — Capim pé de galinha.
- DE VACA** — Unha de boi.
- PATAQUEIRA** — Vassourinha do braço.
- PATAQUINHA** — Pau de rato e Três Marias.
- PATERIOBA** — Fedegoso.
- PATI** — *Coccus hotriophora* M. Palmácia de pequeno porte e penífolia, inculta e armada. Cau fibroso e resistente; sementes oleosas.
- AMARGOSO** — Coqueiro amargoso.
- DOCE** — Pati.
- PATICHELLI**, **PATICHULÍ** — *Pogostemum patchouly* Trist. Labiada erbácia e cultivada. Flos recortadas. A "essência de Paticholi" é aromática e inseticida. O Capim cheiroso — Vetiver — tem o mesmo apelido.
- DO NORTE** — Capim cheiroso (Vetiver).
- PATINHO** — Milhomens.
- PATIOBA** — Pati.
- DA BAHIA** — *Diplothemium canescens* M. Palmácia de média altura, com penatifíolos de 5 metros de comprimento. Frs drupas com 5 centímetros de diâmetro.
- PATUARANA** — Bananeirinha de jardim.
- PATUMUJÚ** — Potumujú.
- PAU ALTO** — Pau roxo.
- AMARANTE** — Pau roxo.
- AMARELO** — Arapoca (*R. magnifica*), Ipê, Pau d'arco, Tatagiba e outros, donde a imprecisão do apelido.

- AMENDOIM** — Cassia ou Cana fistula (*C. multiflora*).
- ANZOL** — Pindaiba.
- BALA** — Bilreiro.
- BALSAMO** — Copalba vermelha. Impreciso, por se ajustar a muitas sps.
- BONITO** — Pegerecu.
- BRANCO** — *Auxemma oneocalyx* R. Al. Borraginácia arbustiva e das cutingas. Córtez branco; fls aromáticas. Adstringente. A Catanduba, e muitas sps, tem o mesmo apelido.
- BRASIL** — *Caesalpinia equinata* Lam. Leguminosa florestal, robusta e vidente. Flos compostas pinadas; fls em rácimos eretos, de corola amarela, com mancha encarnada; vagens eriçadas de picantes. Cau ramisque aculeatis e não com espinhos. Além de matéria corante, a preciosa essência fornece madeira prestante para obras de luxo. Raro cultivada e conhecida de poucos.
- BRASIL AMARELO** — Sebípiruna e Tatagiba. Cabe melhor à primeira sp.
- CABOCLO** — Peroba (*A. polyneuron*).
- CACHIMBO** — Cana fistula, ou Cássia fistula (*C. multiflora*).
- CACHORRO** — *Cordia chamissoniana* Steud. Borraginácia arbórea e madeira de lei.
- CAIXÃO** — Jequitibá.
- CAIXETA** — Pau de tucano.
- CANDEIA** — Candeia (Indistintamente).
- CANOÁ** — Guapuruvú.
- CANUDO** — Sapucaína.
- CARGA** — Jequitibá.
- CARRASCO** — Catanduba.
- CINZA** — Erva poça e, principalmente, Pau terra.
- CINZEIRO** — Pau terra.
- CONCHA** — Roupala brasiliensis Kl. Proteácia de muito desenvolvimento. Latifólios lanciolados; fls em espigas. Lenho para carpintaria — branco, amarelo e roxo — consoante as vars. Ornamento.
- CONSERVA** — Capianga.
- CORTIÇA** — Algodoeiro da praia. Outras sps estão mais no caso desse apelido.
- CRAVO** — Sebastião de Arruda.
- CRUZEIRO** — *Bananacantha spinosa* Schum. Rubiácia arbustiva e

- ornamental. Fos ovalares. Vid Li-
mão do mato.
- D'ALHO — *Galesia scoreododen- drum Cas.* ou *G. gorazema*. Fitolo-
gácia de grande desenvolvimento.
Fos inteiras; fr sâmara. Todo o
Ve tem cheiro de alho. A sp tem
sido incluida no Ge Seguiera. Ainda
com o mesmo apelido, a Capari-
dácia *Cerdania altodora* e a Oleá-
cia *Agonandra brasiliensis Miers*.
- D'ARCO — Ipê amarelo.
- D'ARCO AMARELO — Ipê (Ama-
relo).
- D'ARCO DA BAHIA — Ipê bran-
co.
- D'ARCO ROXO — Ipê, espe-
cialmente o amarelo.
- D'ARCO SERRA — Farinha seca.
- DE ANJO — Sapucainha.
- DE ARARA — Colher de vaqueiro
e Visquicirio.
- DE AZEITE — Landim.
- DE BALSA — Pau de jangada.
- DE BÓIA — Chichá. Cabe melhor
aos Araticuns e ao Pau de jan-
gada.
- DE BOLO — Pau Pereira.
- DE BRAGA — Cordão de frade.
- DE BREU — Almêcega (Indistin-
tamente).
- DE BRINCO — Pau de tucano.
- DE CACHIMBO — São João e, es-
pecialmente, a Sapucainha e o Gen-
ipapo bravo.
- DE CAIBRO — Marmejada brava.
- DE CAIXA — Pau de tucano. O
P. paraíba e várias sps merecem
igual denominação.
- DE CANDEIA — Candeia (Indis-
tintamente).
- DE CANOA — Guapuruvu.
- DE CARANGUEIJO — Mangue
(Sos hidrófilas).
- DE CERA — Genipapo bravo.
- DE CINZA — Pau de tucano e
Pau terra.
- DE CANOA — Guapuruvu.
- DE COLHER — *Maytenus rigidia*
M. Celastrácia arbustiva, com fos
lancioladas e fr capacular. Ainda
com o mesmo apelido: *Notopanax coelatum*, caraterizável pelas fos
fortemente côncavas da Fa das
Araliáciias; a Apocinácia aromática
e latifera — *Tabernaemontana echinata* Wild; Pau Pereira, dentre
outras sps.
- DE COLHER DE VAQUEIRO —
Colher de vaqueiro.

- DE CORTIÇA — Chichá. Vid Pau
de bôia.
- DE CORTIÇA DA ÍNDIA — Al-
godoeiro da praia.
- DE COTIA — Sapucainha.
- DE CUBA — Tatagiba.
- DE CUNANAN — Cunanã.
- DE CURTIR — Murici.
- DE CURTUME — *Byrsonia spi- cata Rich.* Malpigiácia arbórea,
com frs adstringentes. Todas as
spas taníferas, como essa, merecem
o mesmo apelido.
- DE DEDAL — Pacari.
- DE EMBIRA — Pinduiba e as sps
rегистadas a propósito de Embira.
- DE ESPETO — Pequiá.
- DE ESTALO — Baga da praia. A
fo, quando verde, estala ao fogo.
- DE ESTOPA — Baga da praia.
- DE FAVA — Cana fistula (*C.*
multijuga).
- DE FLECHA — Ubá. Inúmeras
Gramíneas estão no mesmo caso.
- DE FLOR — Quarossa.
- DE FOGO — Tatagiba. As Can-
deias merecem, muito mais, esse
título.
- DE FUSO — Sebastião de arruda
(*Dalbergia*).
- DE GUINÉ — Tipl. Impróprio
porque é um erbácio.
- DE JANGADA — Apeiba tibour-
bou Aubl. Tiliácia de bom desen-
volvimento. Fos pilosas e lanciola-
das; fr cápsula, revestida de cer-
das. Madeira leve, córtex fibroso.
Tido como vermicífugo.
- DE JUCÁ — Pau ferro.
- DE LACRE — Capianga.
- DE LAGARTA, ou de LAGARTO
— São Gonçalinho.
- DE LAGOA — Tabua. Sp muito
pouco lenhosas.
- DE LAGRIMA — Pau de tucano.
- DE LEITE — Cunanan. E' apeli-
do cabível a inúmeras sps, donde
sua imprecisão.
- DE LEPROA — Sapucainha.
- DE LIXA — *Lippia urticoides*
Steud. Verbenácia arbustiva com
fis em espinhos e aromáticas; fos,
ricas em silíca, servem de Lixa.
Tem o mesmo apelido o Cambará
branco e especialmente a Lixeira.
- DE MAMONA DO MATO — Au-
gelim doce.
- DE MARIA — Landim.
- DE MASTRO — Inhaiba, Pindoba
e outras sps.

- DE MAU CHEIRO — Pau d'alho.
- DE MOCÓ — Cássia argentina.
- DE MORCEGO — Angelim côco e A. de fo larga.
- DE MUTAMBA — Mutamba.
- DE ÓLEO — Copaiha e as sps denominadas Bálsmos.
- DE PENTE — Pau Pereira.
- DE PERNAMBUCO — Pau Brasil.
- DE PIRANHA — Laetia apetalia Jacq. Flacourtiácea arbórea. Resinifera.
- DE PITÔ — Sapucaninha e Cana fistula (C. bicapsularis).
- DE PÓLVORA — Crindeuva.
- DE PORCO — Catingueira e Pau de rato.
- DE PRAGA — Cordão de frade.
- DE PREGUIÇA — Umbuba (Indistintamente).
- DE RATO — Caesalpinia microphylla M. Leguminosa arboréta. Penífólios do 1º grau; fls amarelas e aromáticas. Ornamental. Ainda da mesma Fa: C. bracteosa Tul., de fls peitorais e córtex eupéptico e a C. pyramidalis Tul., registada como Maria preta e Catingueira.
- DE REMO — Buranhem.
- DE RESPOSTA — Catuaba.
- DE ROSA — Sebastião de Arruda (Dalbergia).
- DE ROSETA — Tres Marias.
- DE SABÃO — Bilreiro e Saboeiro.
- DE SANGUE — Pterocarpus zehntneri Harms. Leguminosa de grande porte. Tronco ramoso; madeira de lei encarnada.
- DE SANTA MARIA — Landim.
- DE SANTANA — Canela preta e Louro amargoso.
- DE SANTO — Cangerana.
- DE SASSAFRÁZ — Canela sassafráz.
- DE SEBO — Sapium sebiferum Koxb. Euforbiácia arbustiva, com fls esverdiadas e fr capsular, que fornece óleo doce, para sabão e velas.
- DE SEMANA — Murici.
- DE SERRA — Farinha seca.
- DE TAMANCO — Pau de tucano, Pau paraiba, dos melhores para esse mistér e as Tabebuyas — Bignoníacias — dentre as quais a T. leucoxila DC.
- DE TANHO — Sebastião de arruda (Dalbergia) e Pau marfim.
- DE TINTA — Caneja poca.
- DE TINTA DE SAPATEIRO — Pau de rato.
- DE TUCANO — Vochysia tucanorum M. Voquisíacia silvestre. Foz coriáceas; fls amarelas com espôrão. Madeira para caixões; selva produzindo bebida vinhosca. Com o mesmo apelido as sps do mesmo Ge, como a V. thyrsoides, que dá uma resina sucedânea da "Goma arábica".
- DE VACA — Maçaranduba.
- DE VEADO — São Gonçalinho.
- DE VINHO — Vinhálico.
- DE VINTEM — Guapuruvú.
- DE VIOLA — Pau de tucano.
- DOCE — Alcaçuz, Buranhem e Pau de tucano. Várias sps merecem esse apelido, donde sua imprecisão.
- DOCE DA FOLHA LARGA — Vochysia elliptica M. Var de Pau de tucano.
- DO PARANÁ — Saboeiro.
- DURO — Laranjeira do mato.
- EXCELSO — Pau roxo.
- FAVA — Vid Pau de fava.
- FEDORENTO — Pau d'alho e outras essências, como a Gustavia angustifolia L. Lecitidácia.
- FERRO — Caesalpinia ferrea M. e não Apulea ferrea. Leguminosa de grande desenvolvimento e ornamental. Foz compostas pinadas do 2º grau. Lenho para carpintaria. Das 4 vars — glabrescens, leostachya, parvifolia e typica, somente a primeira, encontrada na Bahia, não revelou eficiência na cura do diabetes, segundo Leal Costa.
- FERRO BRANCO — Pau ferro.
- FERRO DO CEARÁ — Pau ferro.
- FÔFO — Pau de jangada.
- FORQUILHA — Pau pereira.
- FUNCHO — Canela sassafráz.
- GONÇALO — Gonçalo Alves.
- IMORTAL — Mulungu.
- INGLÊS — Landim.
- JACARÉ — Jacaré (*P. communis*).
- JUDEU — João mole.
- LACRE — Contraerva.
- LAGOA — Vid Pau de lagoa.
- LARANJA — Tatagiba.
- LEPRA — João mole.
- LISO — Pau marfim. Impreciso, porque tanto se refere à superfície do caule ou ao lenho trabalhado.
- PAULISTA — Andá açu.
- PAU MACACO — Macuco e Macucurana.

- MAMONA DO MATO — Angelim doce.
- MANGERIOBA — Fedegoso.
- MARFIM — Balfourodendron riedelianum Engl. Rutácia de média altura. Fls em pequenos rácimos terminais. Lenho para obras de luxo. Sp elegante.
- MOEDA — Seringueira.
- MORCEGO — Angelim côco.
- MURTA — Maiteno.
- PARAIBA, ou PRAIRA — Simuruba versicolor S. H. Simarubácia florestal, de rápido desenvolvimento e elegante. Fos compostas pinadas. Córtez aromático e amargo. Preciosa madeira, alva, leve e mole.
- PARA TUDO — Casca de anta. Vid Para tudo.
- PARAUBA — Pau pariba.
- PAUNA — Coração da Índia.
- PENTE — Pau Percira.
- PEREIRA — Tabernaemontana isensis V. ou Geissospermum velosii F. All. Apocinácia de grande porte. Fls pardacentas: fr baga; córtex tónico e succédâneo da quinina.
- PIASSAVA, ou ainda melhor PIAÇAVA — Piçava.
- PIMENTA — Erva moura do sertão.
- PINTADO — Angelim côco.
- PÓLVORA — Crindeva.
- POMBO — Tapirira guianensis Aubl. Anacardiácia arbórea é florestal. Fos compostas pinadas; fls em belos rácimos. Lenho para carpintaria; córtex tanífero. Preconizado contra a lepra.
- POHOROCA — Capororoça.
- PRETO — Brauna e, especialmente, o Jacarandá preto.
- PRETO DÓ SERTÃO — Brauna.
- QUE BÓIA — Pau de jangada.
- RAINHA — Condurú, Gonçalo Alves e Muiracoatiara.
- ROSA — Sebastião de Arruda (*Dalbergia*) e muitas sps em vista da coloração do Lenho. Flamboian.
- ROSA DO NORTE — Sebastião de Arruda (*Physocalymnia floribunda*).
- ROSADO — Pau Brasil.
- ROXO — Pelogyne discoïde Vog. Leguminosa robusta. Fos pinadas; vagens chatas e tortas. Lenho pesado e duro, para obras de luxo: adstringente e matéria corante.
- SANDALO — Bileiro e Lanilim.
- SANTO — Zollernia parsonis Hub. Leguminosa de elevado porte e ma-

- deira de lei. Apelido consignado ainda a muitas sps, dentre as quais a Cangerana e a Janauba.
- SASSAFRÁZ DA SERRA — Crneia sassafráz e C. sassafráz da serra.
- SERINGA — Seringueira.
- SETIM (CETIM) — *Aspidosperma eburneum* F. All. Apocinácia de grande altura. Fos coriáceas: fls em cimeiras. Madeira de luxo — amarela esbranquiçada.
- TAMBOR — Guapuruvú.
- TERRA — *Qualea cordata* Spreng. Voquistácia floröstal. Fos vernicosas: frs cápsulas com sementes aladas. Lenho para carpintaria. Figuram com o mesmo nome: a *Qualea parviflora* M., a *Q. grandiflora* M. e a *Q. multiflora*.
- TERRA DO CAMPO — Pau terra (*Q. grandiflora*).
- TERRA DO CERRADO — Pau terra.
- TERRA MIUDO — Pau terra (*Q. parviflora*).
- TERRA PEQUENO — Pau terra (*Q. parviflora*).
- TINTA — Canela poca.
- TROMBETA — Umbauba (Indumentário).
- UVA DO CAMPO — Pau terra.
- VERMELHO — Mulungú. Apelido cabível a inúmeras sps. O Mulungú apenas apresenta fls e sementes dessa cor.
- VIOLA — Pau roxo.
- VIOLETA — Pau roxo.
- ZEBRA — Gongalo Alves.
- PAVOA — Baroneza.
- PAXIUBA — Castiçal.
- MAGERONA — *Martinesia caryotifolia*. Palmácia de médio porte, fortemente armada. Fos compostas pinadas; frs encarnados ou alvos. Sp esbelta e elegante.
- PECACUANHA, PECACUEM — Ipe-cucuanha.
- PEGO — *Prunus persica* Bai. Rosácia arboreta, com frs — drupas — apreciadas cruas ou em compota. De fácil aclimação, poderá dar melhor rendimento na Bahia.
- DE SÃO DOMINGOS — Abricô.
- PÉ DE BEZERRO — Tinhorão.
- DE BOI — Unha de boi.
- DE CABRA — Salsa da praia.
- DE CAVALO — Caiuruçú.
- DE CHUMBO — Pinga de lacre.
- DE ELEFANTE — Caiuruçú e Fumo bravo.

- DE EMA — Caneia de ema (Indistintamente).
 —DE GALINHA — Capim pé de galinha.
 —DE MACACO — Pinheirinho dos campos.
 —DE PAPAGAIO — Capim pé de galinha. Ajusta-se mais ao Gericó roxo.
 —DE PERDIZ — Pau paraiba, porém mais cabível à Curralcira.
 —DE PERIQUITO — Capim andré-quieto.
 —DE POMBO — Azedinha (*O. corniculata*).
PEGAMAÇO, PEGAMASSA — Baranda menor (Carrapicho de carneiro).

PEGA-PEGA — Erva tortão, os Carrapichos do Ge *Desmodium* e especialmente a Rabugem de cachorro e o Carrapicho beiço de boi.
 —PINTO — Erva tortão.

—PINTO DO MIUDO — *Drymaria cordata*. Caryofilácia estiolhosa. Has-te delgadíssima, fos labelliformes. Resistentes à sombra.

—RAPAZ — *Pilea grossierenata* Mig. Morácia erbácia, rasteira e prolifíca. Ramos pendulos. Fos opostas, crenadas, de um verde claro. Para canteiros e balcões.

PEGEREÇU, PEGEREÇUM — *Xylopia frutescens* Aubl. Anonácia parecida com a Embira e a Pindaiba. As sementes — tónicas, aromáticas e excitantes — da culinária africana, substituem a *X. aethiopica* genuina, Pimenta da Costa, um dos apelidos aliás da sp em causa.

PEIPEIÇABA — Vassourinha mosfina.

PEIPETABA — Vassourinha mosfina.
PEIRESCIA — Ora pro nobis.

PEITO DE MOÇA — *Solanum mammosum* L. Solanácia arbustiva e armada. Os curiosos frs, tâmbélos, lembram a mama de certos animais. Fos sucedâneas do Fumo.

PELARGONIO — Gerânio.
PELEGO DE VELHA — Borla de bispo (Var Santi Pauli Bak.).

PELO DE URSO — Mondo.

PENACHINHO — Cana brava.
PENACHO BRANCO — Capim dos pampas.

—DE CAPIM — Capim dos pampas.

PENAIBA — Andiroba.
PENAO, PENAU — *Cnidoscolus maregravii* Poll ou *C. oligandrus* M. Arg. Euforbiácia arboreta, inculta e fortemente armada, por isso chamada "arre-diabo". Fos lobadas; fr cápsula triocular, também armada, com sementes oleosas — "novo recurso oleífero da Bahia" segundo Bondar.

PENTE DE MACACO — *Pithecoctenium echinatum* K. Ch. Bignoniacia florestal. Frs cápsulas chatas eriçadas de picantes e com sementes aladas.

—DO DIABO — Pente de macaco.

PENTIEIRA — Lixeira.

PEPI — Tipi.

PEPINO — *Cucumis sativus* L. Cucurbitácia rasteira e cultivada. Suas bagas, com eminentes epínfimes, podem ser comidas crusas, crusas ou em saladas.

—DE BURRO — Maxixe bravo.

—DE COBRA — Abóbora serpente.

—DE SANTO INÁCIO — Melão de S. Caetano.

PEQUI, PEQUI — *Caryocar barbinerve* Mig. ou *C. villosum*. Caryacácia de grande desenvolvimento e tortuosa. Fos coriáceas; fr cápsula de epicarpo lenhoso, com sementes oleosas e comíveis. Madeira de lei. Suas vars, como a própria sp, são conhecidas também por Pequiú.

PEQUIA — *Macoubea guianensis* Aubl. Apocinácia arbórea. Fos inteiros; fr baga lenhosa, com polpa "desfeita em melão", muito apreciada. Lenho amarelo de qualidade.

—BRANCO — Pau setim (cetim).

—BRAVO — Pequi e Pequiá.

—CETIM — Pau setim.

—DE PEDRA — Sete casacas.

—MARFIM — Pau marfim.

—TANHO — Pau marfim.

PERA, PEREIRA — *Pyrus communis* L. Rosácia arbórea e mal aclimada na Bahia.

—ABACATE — Abacate.

PERÉ — Mangue branco.

PEREBI — Ipê branco.

PEREIRA DA NOVA ESPANHA — Abacate.

—DE AFRODITE — Péra.

—DE VÉNUS — Péra.

—ERÓTICA — Péra.

PEREIRO — Pau Pereira.

PEREIROA — Pau Perelra e mais impropriamente a Casca preciosa.

- PEREIRUAR** — Cipó suma.
PEREREMA — Côco amargoso.
PERIROA — Casca preciosa.
PEREXI — Onze horas.
PEREXIL — Salsa.
PERI — Piri-piri.
PERINA — Cana de macaco (*C. splendens*).
PERIPAROBA — Capeba.
PERI-PERI — Piri-piri.
PERIQUITEIRA DO CAMPO — Buita de corvo.
PERIQUITI — Jequiriti.
PERIQUITO — *Achyranthes ficoidea* Lam. Amarantácea erbácia e angustiada. Cau e fos encarnadas. Litorânea e cultivada. Diurética.
PERNA DE SARACURA — *Euphorbia brasiliensis* Lam. Euforbiácea erbácia e erecta, lactífera e de haste articulada. Fos elípticas e râcimos axilares. Inculta. Tem o mesmo apelido a Sete sangrias.
PERROBA — Designação de várias esp. de Apocináceas do gê. *Aspidopetra*. São árvores linheiras, com folhas coriáceas, fls em cimeiras. Seu lenho constitue "inxextimável riqueza" (T. da Fonseca). Servem de exemplo a *Aspidopetra camporum* M. Arg., a *A. polyneuron* M. Arg. e o Pau cetim.
—AMARELA — Pau setim (cetim).
—DA BAHIA — Sweetia nitens. Leguminosa arbórea, com os caracteres da Perobinha.
—DE SANTA CATARINA — Quina de Camamu.
—DE SÃO PAULO — Peroba (*A. polyneuron*).
—DOS CAMPOS — Peroba (*A. camporum*).
—MIRIM — Peroba (*A. polyneuron*).
—MIUDA — Peroba (*A. polyneuron*).
—ROSA — Peroba (*A. polyneuron*).
PEROBINHA — *Sweetia elegans* Bth. Leguminosa arboreta, com penatífolios e vagens lancioladas. Córtez anti asmático, contra a epilepsia e a dismenorréia. Madeira de lei.
—DO CAMPO — Peroba da Bahia.
PEROVAUNA, PEROVAUINA — Barauna e Brauna.
PERPÉTUA — Suspiro.
—BRANCA — Suspiro branco.
—DO MATO — Macela (*T. ramosissima*) e Periquito.

- ENCARNADA — Suspiro (roxo).
—ROXA — Suspiro (roxo).
PERSICARIA, PERSICÁRIA DO BRASIL — Capiçoba (*P. acre*).
PERVINCA — Boa noite e Boa tarde (*Vinca*).
PESSEGUEIRO BRAVO (Peceguero) — Pau de curtume e Gingreira.
—DO MATO — Gingreira.
PETECA — Jaborandi falso.
PETI — Fumo.
PETIA — Pequiá.
PETIGMA, PETIM — Fumo.
PETUM — Fumo.
PETUMBA — São Gonçalinho.
PETUME — Fumo.
PETÔNIA — *Petunia nyctagineiflora* Juss. Solanácea erbácia, esgalhada e pilosa. Sp *semper florens*, simplices ou dobradas e de várias cores. Ornamental.
—BRANCA — Petúnia.
—VERMELHA — *Petunia violacea* Lind. Var de Petúnia.
PEUVA — Ipê (T. Ipe).
—ROXA — Ipê (T. ipe).
PIAÇA, PIAÇABA, PIAÇAVA — Piaçava.
PIAÇABOCU — *Attalea piassabocu* Rond. Palmeira de médio porte, diferindo da Piaçava pelas fibras — mais friáveis, embora mais duras e grossas.
PIAÇAVA, menos frequentemente
PIASSAVA — *Attalea funifera* M. Palmeira robusta, de médio porte e com penatífolios. Drupas oleosas e édules em abundância. Suas fibras — das bordas peciolares — apresentam grande valor industrial. Segundo Bondar, a sp nos solos sáfarios torna-se acáule — *Attalea acaulis* Bur. Existe a Piassaba do Pará — a Leopoldina piaçaba e outras do Norte.
—DA BAHIA — Piaçaba (*A. funifera*).
—RASTEIRA — Piassaba (Naturalmente falsa).
PIÃO — Pinhão de purga.
PICACOANHA — Ipecacoanha.
PIÇANDÓ — *Diplothemium campestre* M. var genuina. Palmeira elegante do tipo do Cachandó, embora menor. Suas drupas lembram Avelãs, até no sabor. Fos com revestimento cirosa.
PICÃO — Designação de certas esp. com frs munidos de picantes. Al-

- gumas são Carrapichos e da Fa das Compostas.
- AÇU** — *Cosmos (C. caudatus)*.
- BRANCO** — Picão da Praia, Carrapicho de Agulha.
- DA FLOR GRANDE** — *Cosmos*.
- DA PRAIA** — Carrapicho de agulha, *C. rasteiro*, *Cosmos* e *C. da Praia*, com frs cujos picantes são temidos pelos que andam descalços.
- DO CAMPO** — Carrapicho de agulha. Impreciso. Muitos merecem este apelido.
- DO GRANDE** — *Cosmos*.
- PRETO** — Carrapicho de agulha.
- PICHERECUM, PICHERICUM** — Pegerecu.
- PICO-PICO** — Carrapicho de agulha.
- PIJERECU** — Pegerecu.
- PIJERICA, PIJERICU** — Pegerecu.
- PIMENTA APUÁ ou APUAN** — Pimenta cumari.
- AQUÁTICA** — Capiçoba.
- CEREJA** — Pimenta de cheiro.
- CUMARI ou CUMARIM** — *Capsicum baccatum* L. Solanácia sub arbustiva. Fls csbranquiçadas e bagas até 8 cents., servindo para tempero e sinapismo.
- CUMARI VERDADEIRA** — Pimenta cumari.
- DA COSTA** — Agrião do Brasil e Pegerecu, mormente por ser usada pelos africanos. Tem o mesmo apelido a *Xylopia aethiopica*.
- D'AGUA** — Capiçoba.
- DA GUINÉ** — Pimentão.
- DA ÍNDIA** — Pimenta do reino.
- DA JAMAICA** — *Pimenta officinalis* Lindl. Mirtácia arbustiva, ramosa e aromática. Os frs — bagas secas — são oleosos e de sabor picante; carminativos e excitantes. Produz muito na Bahia.
- DA TERRA** — Pimenta malagueta. Talvez porque é a mais comum na Bahia.
- DE CACHORRO** — Pimenta de galinha.
- DE CHEIRO** — *Capsicum odoriferum* V. Solanácia do mesmo tipo da *P. malagueta*, porém menor e com frs ovóides — *Capsicum ovatum* — como também é a sp conhecida — muito odorantes e picantes.
- DE COROA** — Pimenta da Jamaica.
- DE FRUTO GANCHOSO** — Aperta ruão.

- DE GALINHA** — *Solanum nigrum* L. Solanácia arbustiva e inculta. Fls albas; bagas pequenas e esferóides. Tida por anti reumática.
- DE MACACO** — Mussambé de espinho.
- DE RATO** — Pimenta de galinha.
- DO MATO** — Capeba. Impreciso por ser conferido a outras sps como o Pegerecu.
- DO PARÁ** — Agrião do Brasil e Espinafre.
- DO REINO** — *Piper nigrum* L. Piperácia sarmentosa de cau articulado. Fr — baga, do tamanho da Cereja, cuja semente, a "Pimenta do reino", usada em culinária, é tônica e estimulante.
- DO SERTÃO** — Pegerecu.
- DOS ÍNDIOS** — Aperta ruão e Capeba.
- DOS MONGES** — Alfazema (*A. castus*).
- GRANDE** — Pimentão.
- LONGA** — Capeba. Impróprio, cabendo à Pimenta malagueta, ao Mussambé de espinho e a outras sps.
- MAÇA** — *Capsicum umbellatum* V. ou *C. annuum* var *cordiformis*. Var de Pimentão — *grossum* — de fr maior e umbilicado.
- MALAGUETA** — *Capsicum frutescens* L. Solanácia arbustiva, ramosa e policarpa. Fr — cápsula — cônica e longa, picante e aromática. Entre suas vars a "Maria gorda" apresenta frs mais curtos e grossos.
- PIMENTÃO** — *Capsicum annuum* L. Solanácia sub arbustiva. Difere das sps congêneres, pelo maior volume de suas cápsulas aromáticas. Apresenta vars.
- COMPRIDO** — *Capsicum annuum* L. var *longum*. Var de Pimentão.
- DOCE** — *Capsicum annuum* L. var *tetragonum*. Diverge do Pimentão apenas quanto aos frs não serem ácres.
- MIUDO** — *Capsicum luteum* Lam. Var de Pimentão com frs menores.
- PIMENTA PEGERECU** — Pegerecu.
- PRETA** — Pimenta do reino.
- SELVAGEM** — Alfazema (*A. castus*).
- PIMENTEIRA DO PERU** — Aroeira.
- DO SERTÃO** — Pindaiba.
- PIMENTINHA** — Pimenta cumari.

PIMPINELA — Erva doce.

PINÁ — Assai.

PINÃO — Cansanção de leite. Cabe melhor ao Penão.

PINA-PINA — Cansanção de leite.

PINAU — Penão.

PINCEL — *Centratherium violaceum*

Gleia. Composta erbácia, ereta e inculta. Cau piloso. Fls em capítulos violáceos, semelhantes a pequeno pincel.

—**DE ESTUDANTE** — *Centratherium sp.* Composta erbácia, com o feitio do Pincel, porém com os capítulos encarnados. Cultivada como ornamento.

PINDÁ — Pindoba.

PINDABUNA — Pindaiba.

PINDAIBA — *Xylopia emarginata* M. Anonácea florestal. Fos lúzidins; fls solitárias; fr nôz com sementes aromáticas e estimulantes. Córtez com fibras para cordaria. Lenho leve. A sp é também conhecida por Embira. Da mesma Fa e do Ge Gautteria há outras Pindaibas, como a *G. villosissima* S. H.

—**BRANCA** — Pegerecú.

—**DA FOLHA PEQUENA** — Embira.

—**DO RIO SÃO FRANCISCO** — Pindaiba.

—**MIUDA** — Pindaiba.

PINDAIBINHA — Pindaiba.

PINDAIUÁ — Pindoba.

PINDAUBA, PINDAUVA — Pindaiba.

PINDAURUNA — Estoracheiro (*P. ferruginea*).

PINDÓ — Pindoba.

PINDOBA — *Attalea compta* M.

Palmeira inculta, de rápido desenvolvimento, e muito pouco exigente. Penatífolios longos; nozes, em cachos abundantes de albumem oleoso e comívicos. Palmito apreciável. É estimada como do Ge *Orbynia* e denominada Catolé por Bondar. Este descreve, como sp nova, a *A. borgesiana*, que se caracteriza pelas inflorescências e frs maiores.

PINDOBACU — *Attalea pindobassu* Bond. Palmácia diferindo da Pindoba e outras *Attaleas* "pelos fjs masculinas mais longas e drupas mais envoltas em perianto". Bondar.

PINDOBA DAS MATAS — Indáia.

PINDOBA DO SUL — Baba de boi (*C. romanzoffiana*).

PINDOVA — Pindoba e Indáia.

PINDUIBA — Cúia de brejo.

PINGO DE LACRE — *Salvia splendens* Schleb. Labiada sub arbustiva, ramosa e ornamental. Cau quadrangular; fls de cálice encarnado e longas corolas da mesma cor, em abundantes rácimos.

—**DE OURO** — Chuva de Ouro (*C. fistula*) e as Orquídáceas — *Oncidium flexuosum*, *O. varicosum*.

PINGUACIBA, PINGUASSIBA — Pau Pereira.

OURUBAÇU — Pau Pereira.

PINHA, PINHEIRA, — *Annona squamosa* L. Anonácea arbórea, cagaihada e cultivada. Fr — baga — globóide, de pericarpo bosculado e polpa alva e saborosa, segmentada em bagos com sementes. É a "Fruta de conde" do sul do País.

—**DA BAHIA** — Pinha.

—**QUEIMADEIRA** — Cansanção de leite.

PINHÃO BRANCO — Pinhão de purga.

—**BRAVO** — Pinhão de purga.

—**CROÁ** — Pinhão de purga.

—**DA ÍNDIA** — Pinhão de purga.

—**DAS BARBADAS** — Pinhão de purga.

—**DAS MOLUCAS** — Nogueira.

—**DE CANDELABRO** — Pândano.

—**DE CERCA** — Pinhão de purga.

—**DE PURGA** — *Jatropha curcas* L. Euforbiácea arbustiva. Fos palmatilobadas; fr capsular trilocular, com sementes contendo óleo acredoce e purgativo. Sp lactifera e tóxica.

—**DO MATO** — Angelim doce, e especialmente, Pinhão de purga.

—**DO PARAGUAI** — Pinhão de purga.

—**PURGA** — Pinhão de purga.

—**ROXO** — *Jatropha gossipifolium* Muell. Euforbiácea do mesmo feitio do Pinhão de purga, porém sendo arboreta e encarnada ou roxa em seus elementos aéreos. Sp tóxica, das catinhas e cultivada como ornamento.

PINHEIRINHO, PINHEIRINHO DOS

CAMPOS — *Lycopodium cernuum* L. Lycopodiácea sub arbustiva, ramosa e rizomatosa. Seus espórios substituem o Lycopódio das farmá-

elas. Impropiamente a Embira tem o mesmo apelido.

PINHEIRO BRANCO — Pinho do Paraná.

—DO BRASIL — Pinho do Paraná.

—DO CAMPO — Pau de tucano (*V. thyrsoides*).

—DO LITORAL — Casuarina.

—NACIONAL — Pinho do Paraná.

—VERMELHO — Pinho do Paraná.

PINHO, PINHEIRO DO PARANÁ — Araucaria brasiliiana Rich. Confera dos Estados sulinos, mas também encontrada na Bahia, aliás precariamente. Sp robusta e elegantíssima. Seus frs — Pinhões — são pequenas drupas secas e edúles. Lenho precioso e resinífero.

—BRASILEIRO — Pinho, Pinheiro do Paraná.

PINO — Penão.

PINÓ — Mamona.

PINOQUAÇU — Mamona. Impróprio, pois o Penão é maior, em todos os sentidos que a Mamona.

PINTAIBA — Pindaiba.

PIÓIA — Chá de bugre e São Gonçalinho.

PIOLEIRA — Pau paralba.

PIOLHO DE PADRE — Carrapicho de agulha.

PIPACOANHA — Ipecacoanha.

PIPERONA — Betis.

PIPI — Tipi.

PIPIRÍ — Piri-pirl.

PIQUI — Pequi.

PIQUIÁ — Pequiá.

PIQUICÉ — Pequiá.

PIRAGAIA, PIRAGUAIA — Cipó suma.

PIRAGUAIO — Babunha.

PIRAGUARA — Cipó suma.

PIRAJÃO — Babunha.

PIRANGA — Pitanga (*Indistinctamente*) e Carapicu.

PIRATANÇARA — Catuaba.

PIRA TAUCARA — Catuaba (*Anemopaegma*).

PIRI — Bananeirinha de jardim.

PIRIGUARA — Cipó suma.

PIRIJÃO — Babunha.

PIRI-PIRI — Rynchospora storea.

Ciperácia sub arbustiva, de cau triangular e deejgado; fls terminais e verticiladas. Para esteiras. Com o mesmo apelido: o Juñco de 3 quinas e o *Cyperus giganteus* Wahl. Ciperácia de tres metros de altura com umbellas até doze raios, no extremo do cau.

PIRIXI — Capotiraguá.

PIRONA — Orelha de pau vermelha.

PIRONGO — Orelha de pau.

PISSANDÓ, **PISSANDU** — Piçandô.

PISSANGO REAL — Banana de ouro.

PITA — Piteira, Vela da pureza e outras sps, donde a imprecisão do apelido.

—**CAROTÁ AÇU** — Piteira.

—**DA TERRA** — Piteira.

PITAIAIA — Mandacaru de boi.

PITANGA, PITANGUEIRA — *Myrsinthus brasiliiana* L., *Stenocalyx sulcatus* Berg., *Eugenia micheilli* etc. Mirtácia arboreta, ramosa de fos odorantes: frs — drupas — munidos de costelas e de agradável sabor acre-doce, adstringentes e febrífragos. Var encarnada e roxa.

—**BRANCA** — Groseicha.

—**COMUM** — Pitanga.

—**DE CACHORRO** — Cambul (*E. vellosissima*).

—**DO MATO** — Groseicha. Impróprio pois é somente cultivada.

—**MIUDA** — *Myrcia rubella* Cham. Var de Pitanga com frs menores.

—**UVAIA** — Uváia.

—**VERDADEIRA** — Pitanga.

PITEIRA, PITEIRO — *Fourcroya gigantea* Vent. ou *F. macrophylla* Bak. Amarilidácia de fos radicantes, até 2 metros de comprimento, emitindo longa fuste floral, de 10 metros, onde se formam os bulbilos reprodutores. As fos dão fibras longas, robustas e sedosas. Tem o mesmo apelido a Barrigudinha, o Canudo de pito (*M. fistulosa*) e outras sps.

—**DA TERRA** — Piteira (*F. gigantea*).

FEDORENTA — Piteira (*F. gigantea*).

GIGANTE — Piteira (*F. gigantea*).

IMPERIAL — *Fourcroya flavovividus* HK. Amarilidácia ornamental, com o aspecto da Piteira, porém com fos listradas longitudinalmente, de verde e amarelo.

PITIÁ — Pequiá.

PITIMA — Fumo.

PITOMBA, PITOMBEIRA — *Sapindus esculentus* SH. Sapindácia cultivada e de grande altura. Tri ou tetrafólios; fr drupáceo, de sabor acidulado. Lenho para carpintaria.

PITOMBO, PITOMBEIRO — *Phyllocayx luschnatianus* Berg. Mirtácia, incluída também no Ge *Eugenia*, robusta e elegante. Flos simples e com o dorso esbranquiçando; fr drupáceo, amarelo, de cálice persistente e saboroso. Madeira de lei.
— DA BAHIA — Pitombo.

PITUMBA — *Casuarina parvifolia* Willd. Flacourtiácia arbórea, com fos distínguis e frs bacáceos. Córtez secativo. Tida como anti reumática.

PIUNA — Mandioca.

PIUVA — Ipê (Indistintamente).

PIXAIM — Diamba.

PIXERICA — Laranja tangerina.

PIXIRICA — Folha de fogo.

PIXIRICÚCU — Taquari.

PLACENTA DE MULHER — Milhomens (Indistintamente).

PLANTA BOA — Catuaba (*Anemone-paeuma*).

— BÚSSULA — Gérbera.

— DA FELICIDADE — *Squizocassia portei*. Aracia ornamental. Flos radicantes — 3 a 4 — longo pecioladas e multilobadas, sem perjuízo da forma sagitada.

— DE CANTAGALO — Canela sassafráz.

— DO CLERO — Flor do paraíso.

PLANTAGEM — Tanchagem.

PLUMA, PLUMA DE CAPIM — Capim dos pampas.

— DE PRÍNCIPE — *Celosia pyramidalis* Burm. ou var plomosa da Crista de galo (*C. cristata*). Belas inflorescências erectas e piramidais.

PLUMBAGO — Emilia e dentre outras Plumbagináceas a *Plumbago auriculata* L.

— DOS JARDINS — Emilia.

POAIA — Ipecacoanha (Indistintamente).

— BRANCA — Ipecacoanha, especialmente as da Fa das Violáceas.

— CINZENTA — Ipecacoanha — (Evea).

— COMPRIDA — Vassoura de relógio.

— DA PRAIA — *Viola litoralis* A. Pinto. Violácea erbácea e litorânea. Flos ovalares; fls albas e fr capsular. Ras anti diarréicas. Ainda com o mesmo apelido a *Mannettia ignata* Schum. Rubiácea trepadeira. Flos opostos e cordiformes; fls encarnadas e fr capsular,

Ornamental e anti diarréica. Vld Ipecacoanha.

— DAS BOTICAS — Ipecacoanha e, impropriamente, o Cipó cruz.

— DE CIPÓ — Posia da praia e as Ipecas falsas.

— DE HASTE COMPRIDA — Ipeca falsa.

— DE MINAS — Posia da praia.

— DO BRASIL — Ipecacoanha (Evea).

— DO CAMPO — Ipecacoanha (Evea) e Purga do campo.

— DO CERRADO — Canela de judeu.

— DO MATO — Ipecacoanha (Indistintamente).

— DO RIO — Posia da praia (Mannettia).

— LEGITIMA — Ipecacoanha (Evea).

— PRETA — Ipecacoanha (Evea).

— PRETA Falsa — Cipó cruz.

— RASTEIRA — Vassoura de relógio (Borreria).

— ROSÁRIO — Vassoura de relógio (B. verticillata).

— RÓSEA — Ipeca falsa (*R. rosea*). Vld Ipeca.

— TREPADEIRA — Ipeca falsa.

— VERDADEIRA — Ipecacoanha (Evea).

PÓ DA BAHIA — Araroba.

— DE GÓA — Araroba.

— DE MICO — Mucuna.

— DE SANTANA — Canela preta.

PODOI — Copaiba vermelha.

POEJO DA PRAIA — Carrapicho rasteiro.

— DO BREJO — Neves.

— DO MATO — Posia da praia.

— RASTEIRO — Rabugem de cachorro.

POINSETIA — Papagáio.

POJO — Mutamba.

POJOMARIOBA — Fedegoso.

POMELO — *Citrus paradisi* Macf. Rutácia arbórea, do tipo das Laranjeiras, com enormes hispérídos comíveis e em grandes cachos. São menores que as Toranjas, com pericarpo mais delgado e polpa menos ácida.

POMO DA ASSIRIA — Limão de molho.

— DAS HISPÉRIDES — Laranja (Indistintamente).

— DE ADÃO — Banana (Indistintamente).

— DE BACHO — Laranja (Indistintamente).

- DE JUNO — Romã.
 — DE MÉDIA ou de MÍDIA — Cidra.
 — DE OURO — Laranja (Indistintamente).
 — DE VENUS — Cajá e Marmelo (P. cydonis).
 — DO AMOR — Tomate.
 — DO DIABO — Estramônio.
 — DO PARAIZO — Banana (Indistintamente).
 — DOS POETAS — Marmelo (P. cydonis).
 — ESPINHOSO — Estramônio.
 — MACA — Banana de São Tomé e especialmente Pomelo.
POMPELMO — Toranja.
POMPEU — Pega pinto do miudo.
PONTA DE LANÇA — Vid Capim vermelho.
POPAI — Mamão.
PORANGABA — *Cordia salicifolia* Cham. Borraginácia arboreta. Fos inteiras; fls em cimeiras; fr drupas. Conhecido por "Chá de bugre". Tido por tóxico e diurético.
PORONGO — Cabaça.
PORORANGA — Porangaba.
POROROCA — Azeitona do mato.
PORQUEIRA — Abóbora moganga.
PORRETE — Café do mato (C. caffeoidea).
PORUNGA — Cabaça (Indistintamente).
POTUMUJÓ — *Centrolobium robustum* M. Leguminosa de rápido e considerável desenvolvimento. Penífilo; vagens com degados e longos espinhos. Lenho muito durável, amarelo com veias claras.
— **AMARELO** — Araribá rosa.
— **ROSA** — Araribá rosa.
PRAGUÁ — Ipeca falsa. Vid Ipeca.
PRAÉ-CAA — Erva poca.
PRIMAVERA — *Ipomeea quamoclit* L. Convolvulácia sarmentina e ornamental. Cau com longos internos; fls encarnadas de longas corolas afuniladas. Tida por tóxica e anti reumatismal. As Tres Marias tem o mesmo apelido.
— **BRANCA** — Tres Marias (B. alba).
PRÍMULA — Primavera.
PRÍNCIPES DO REINO VEGETAL — Palmeiras (Indistintamente).
PRIPRI — Piri-piri.
PROCAXI — Visgueiro.
PUAIA — Ipecacoanha (Indistintamente).
PUARUCU — Folha da costa.

- PUCA** — Mundururú é uma sp não identificada, possivelmente Mirtácia; arboreta de fos elípticas e fras drupáceas, caulinares e édules.
PUCI — Cortina dos pobres.
PUIA — Cipó cruz.
PUMELO — Pomelo.
PURANAN — Cachandô.
PURGA DE AMARO LEITE — Batata de purga.
— **DE BATATA** — Batata de purga.
— **DE BUCHA** — Buchinha.
— **DE CABOCLO** — *Cayaponia pilosa* Cogn. Cucurbitácia rasteira. Latifólios lobados; bagas amargas. Ra diurética. A sp é do grupo dos Taluiás.
— **DE CAETITÉ** — Marinheiro da fo miuda.
— **DE CAJAPO** — Purga de caboclo.
— **DE CARIJÓ** — *Cayaponia espellina* Cogn. Cucurbitácia trepadeira. Fos ríjas e fra bagas. Ra tida como anti sifilítica, diurética, purgativa e tônica. E' também outro apelido da Purga de caboclo.
— **DE CAVALO** — Andá-açu.
— **DE GENTIO** — Andá-açu e Purga de caboclo.
— **DE JALAPA** — Buchinha.
— **DE JOÃO PAES** — Bucha de purga.
— **DE NABICA** — Bonina.
— **DE QUATRO PATACAS** — Quatro patacas.
— **DE SANTO INÁCIO** — Andiroba.
— **DE VEADO** — Ipecacoanha.
— **DO CAMPO** — *Viola ipecacuanha* L. Violácia rasteira e pilosa. Cau ramono e fos longo elípticas. Os mesmos atributos da Ipecacoanha, posto que em menor grau. A sp figura também nos Ges Ionidium, Hybanthes e outros, da mesma Fa.
— **DO SERTÃO** — Batata de purga.
— **DOS PAULISTAS** — Andá-açu e Buchinha.
— **PRETA** — Cipó cruz verdadeiro.
PURGUEIRA — Pinhão de purga.
PURUI — Açucena do mato e Goiaba. Impreciso portanto.
— **DA COSTA** — Genipapo bravo.
PURUMA — Tararanga (Indistintamente).
PURUNARA — Cipó suma.
PURUNGO — Cabaça (Indistintamente).
PUSA, PUSSÁ — Mundururú.
PUTUMUIÚ, PUTUMUJÓ — Potumujú.

Q

QUALÉ — Pau terra.

—**AZUL** — Pau terra.

QUAMOCLITO — Primavera (Ipomoea).

QUARANGO — Quina-quina.

QUARESMA, QUARESMEIRA — Não constando na Bahia a existência da Tibouchina mutabilis Cogn., tida como a genuína Quaresmeira, nela vegetam sps do mesmo Ge muito afins: *T. sulcata* Cogn., com flos lancioadas e belas violáceas, em pequenos grupos; *T. candolleana* Cogn.; *T. granulosa* Cogn.; *T. holoserica* C. Torr.; a Fl de Natal, dentre outras.

QUARIBÚ — Guarabu (Pau roxo).

QUARÓ — Resedá.

QUASSITUNGA — São Gonçalinho.

QUATELÉ — Sapucáia (Indistintamente).

QUATRO PATACAS — Allamanda cathartica L. Apocinácea trepadeira. Flos verticiladas; fls amarelas gamopétalas; fr capsular. Catártica e depurativa. Látex tóxico.

—**PATACAS AMARELAS** — Quatro patacas.

QUAXIMBA — Guaxima.

QUAXINDUBA — Gameleira.

QUEBRACHO — Brauna.

—**CORONILHO** — Brauna.

QUEBRA FOICE — Borla de bispo.

—**MACHADO** — Jatai (Indistintamente).

—**PEDRA** — Phyllanthus niruri L. Euforbiácia erbácia e inculta. Flos compostas com pequenas fls, dispostas em fileira ao longo da porção dorsal da raquo. *Euphorbia prostata* Ait. Euforbiácia rasteira e erbácia. Cau encarnado e, bem assim, suas pequeninas flos orbiculares e opostas; fls axilares. Sp lactífera. Ambos constituem reputados diuréticos.

QUECIMERIM, QUECIMIRIM — Pimenta cumari.

QUEIMADEIRA — Erva do diabo, Favela. Penau e muitas sps urticantes, donde a imprecisão do apelido.

—**DO DIABO** — Cansanção de leite.

QUERAIBA — Ipê, Pau d'arco.

QUERIMÓLIA — Graveola.

QUIÁ-AÇU — Pimentão.

QUIABENO — Quiabo.

QUIABENTO — Ora pro nobis.

QUIABO, QUIABEIRO — Hibiscus esculentus L. H. africanus. Malvácia sub arbustiva. Flos ásperas e palmadas; fls cor de enxofre; fr capsular, comido verde, muito usado em culinária, mormente africana.

—**AZEDO** — Rosela.

—**BRANCO** — Quiabo.

—**CHIFRE DE VEADO** — Hibiscus esculentus L. var longus. Malvácia com os caracteres do Quiabo, sendo porém os frs muito compridos e curvos.

—**COMPRIDO** — Quiabo chifre de veado.

—**DE ANGOLA** — Rosela.

—**DE CHEIRO** — Hibiscus abelmoschus L. Malvácia sub arbustiva. Flos palmatilobadas; fr capsular alongado, com espinhos e sementes aromáticas, empregadas em perfumaria.

—**DE CIPÓ** — Taiulá.

—**DE QUINA** — Chuva de prata.

—**DE TRES QUINAS** — Chuva de prata.

—**DO MANGUE** — Algodão da praia.

—**QUINGOMBÓ** — Quiabo de cheiro.

—**RÓSEO** — Rosela.

—**ROXO** — Rosela.

QUIABORANA — Algodão do brejo.

QUIARTA — Mucuna.

—**DE CHEIRO** — Quiabo de cheiro.

QUIÇABA, QUIÇAVA — Inhame (Indistintamente).

QUIGOMBÓ, QUINGOMBÓ — Quiabo e Quiabo de cheiro.

—**AZEDO** — Rosela.

—**DE CHEIRO** — Quiabo de cheiro.

—**GRANDE** — Bucha (*L. cylindrica*).

QUIAA PUÁ — Pimenta cumari.

QUIA-QUI — Pimenta malagueta.

QUILOBÓ — Quiabo.

QUIMICO — Quina do Brasil.

QUIMPURINGA, QUIMPURUNGA, QUIPURINGA — Pau ferro.

QUINA — A Quina vera é Rubiácia do Ge Cinchona que poderá ser cultivada no Brasil, pois tem sido espontaneamente encontrada em algumas zonas do Estado do Rio e de Minas (Hoehne). Além de outras Rubiácias, certas Apocináceas, Euforbiáceas, Gengianáceas, Litráceas, Loganiáceas, Ramnáceas, Rutáceas, Símerubáceas, Solanáceas etc., pelo fato de apresentarem fos, corteza e ras amargo-tônicas, até certo ponto febrifugas, são consideradas Quineiras. São antes faias Quinas.

AMARELA — *Cinchona calisaya* Weld. Uma das Quinas verdadeiras.

BRANCA — Agoniada — Var. *microphylla* da *P. lanceifolia*.

DA RAIZ PRETA — Cipó cruz.

DA SERRA — *Remigia ferruginea* DC. Rubiácea.

DA TERRA — Quina do Brasil.

DE CAMAMU — *Aspidosperma illustre*. Apocinácea arbórea, de longas fos coriáceas, a'ado. Lactífera e fr — folículo alado. Lactífera e febrifuga.

DE CONDAMINE — Carqueja.

DE CUMANA — Quina do Brasil.

DE ESPINHO — Laranjeira do mato.

DE PERNAMBUCO — Quina do Brasil.

DE RAIZ — *Dejanira erubescens* Cham. Gencianácea arbustiva. Trifólios carnosos; fls em cimeiras; fr pequeno e capsular. Sp decorativa, apresentando varia e tida por amargo-tônica, eupéptica e febrifuga.

DE REMÍGIO — Quina da serra.

DE SANTA CATARINA — Quina-quina.

DE SÃO DIOGO — *Exostema souzanum* M. Rubiácea arbórea, com fos ovalares, fls em cachos e fr capsular. Febrifuga.

DO BRASIL — *Coutarea hexandra* Schum. Rubiácia arbustiva, de fos longo elípticas, grandes fls encarnadas em panículas e fr capsular. Febrifuga.

DO MATO — Laranjeira do mato e Quina-quina.

DO PARANÁ — Quina-quina.

DO PIAUÍ — Quina de São Diogo e Q. do Brasil.

DO RIO — Quina do Brasil.

DOS POBRES — Erva Macacá.

LARANJEIRA — Laranjeira do mato. Preferível esse apelido ao de Laranjeira do mato e Quina do mato.

MOLE — Agoniada.

PEREIRA — Quina de Camamu.

PRETA — Cipó cruz.

QUINA — *Exostema australis* S H. Rubiácia arbustiva e ornamental. Latifólios ovalares; pequenas fls albas, em paniculas; fr capsular. Amargo-tônica e febrifuga. Tem o mesmo apelido a Q. do Brasil.

ROSA — *Landenbergia hexandra* Klotz. Rubiácia arboreta. Fos ovalares, fls albas e fr capsula. Tida como sucedânia da Quina verdadeira.

VERMELHA — *Cinchona succirubra* Pav. Uma das Quinas verdadeiras.

VERMELHA DO BRASIL — *Sickyngia rubescens* Schum. Rubiácia arbórea de grande desenvolvimento. Corteza espesso; fos coriáceas amplas e ovalares; fls aromáticas em cimeiras; fr capsula. Febrifuga.

QUINA VERMELHA DO MATO — Quina vermelha do Brasil.

QUIJOJO — *Ocimum guineense* Sch. Labiada sub arbustiva, de fos ovalares, fls em espigas erectas. Ambas muito aromáticas, usadas em culinária.

QUIRIJA-APUA — Pimenta malagueta.

QUIRIPIRANGA, QUIRIPIRINGA, QUIRIPIRUNGA — Pau ferro.

QUIRIVIA — Alcarávia.

QUITOCO — *Pluchea quitoco* DC. Composta erbácia e ruderal. Fos em que as estípulas, partindo do limbo se prolongam pela haste; fls em capítulos; fr aquênio. Anti-reumatismal, carminativo, eupéptico e peitoral.

QUITUL DE CEILÃO — Palmeira africana.

QUIXABA — Rompe gibão. Impreciso, por ser conferido ao Limoeiro do mato, à *Pisonia aculeata* L. (Nictaginácea) e a outras sps armadas.

BRANCA — Rompe gibão.

COMUM — Rompe gibão.

QUIXUM, QUIXIUME — Vid Crisiuma.

R

RABANETE, RABANETA — *Raphanus sativus* L., var *radicula*. Crucífera erbácia. Fos ásperas e espatuladas; fls em espigas; siliqua. Suas tuberas, longas e encarnadas, podem ser comidas cruas ou em saladas. E' o Rabanete longo.

—**REDONDO** — *Raphanus sativus* L., var *rotundus*. Difere do Rabanete pelas tuberas, que são esféricoides.

RÁBANO — *Raphanus sativus* L. Crucífera do mesmo tipo do Rabanete, com tuberas maiores. Passa por anti escorbútico, diurético e digestivo.

—**CURTO** — Rabanete.

—**DAS HORTAS** — Rábano.

RABAÓ — Rábano.

RABIÇA — Rabanete e mais cabível à Nabiça.

RABO DE ARARA — Canela santa, Papagáio, Pau de tucano e Visgueiro. Impreciso.

—**DE BUGIO** — Samambaia (*Alstrophiella*) e outras sps.

—**DE BURRO** — Capim peba e *C. rabo de burro*.

—**DE CAMELIAO** — Espada de ogum.

—**DE COTIA** — Cauda de raposa.

—**DE FOGUETE** — Paco-paco.

—**DE GATO** — Acalifa e Espada de ogum. Mais cabível à primeira sp.

—**DE GUARACHAIM** — Capim rabo de burro.

—**DE LAGARTO** — Espada de ogum.

—**DE MACACO** — *Acalypha hispida* Brum. Euforbiácia arbustiva e ornamental. Latifólios serrilhados; fls encarnadas, em espigas péndulas; fr capsular. Esse apelido cabe a muitas Acalifas e é também da Barauna.

—**DE MUCURA** — *Pennisetum nivale* Trin. Gramínea sub arbustiva. Longifólio linear, largo e acumulado; espigas no ápice de longa raque. Sp hidrófila, tida como diurética.

—**DE ONÇA** — Cauda de raposa.

—**DE PEIXE** — *Polypodium vulgaris*. Polipodiácia sub arbustiva, rizoma-

tosa e prolífica. Os foliolos das frondes bifurcam-se como a cauda dos peixes. Ornamento.

—**DE PERDIZ** — *Gomphrena scapigera* M. Amarantácia sub arbustiva.

—**DE RAPOSA** — Cauda de raposa. Impreciso o apelido, porque é comum ao Capim paíma, ao *C. tinga* e ao *C. rabo de burro*.

—**DE RATO** — *Oncidium cebolata*. Orquídacia ornamental.

—**DE ROJAO** — Coaré bravo, Cordão de ouro (*S. microglossa*) e Cravo de defunto.

—**DE TATU** — Sumaré.

—**DE TUCANO** — Pau de tucano e C. Canela Santa.

—**DE ZORRO** — Capim rabo de burro.

RABUGE, RABUGEM, RABUGO, RABUJO — Várias sps de Borrágincias, Escrofuláciias e Labiadadas. Além da Rabugem de cachorro, têm tais apelidos a Borrágincia — *Cordia vulneraria* — e a *Stemodia viscosa* — Escrofulácia.

—**DE CACHORRO** — *Petadons radians* Pohl. Labiada erbácia e inculta. Fos pilosas e viscosas; fls em espigas róseas. Contra as moléstias cutâneas e pulmonares e, bem assim, o "rabugo do cão".

RAINHA DÀ NOITE — *Cereus setaceus*. Cactácia do Nordeste, de caule cônico, recoberta de longas cerdas.

—**DAS ROSAS** — Rosa Amélia. Apelido injustificável.

—**DO LAGO** — *Pontederia cordifolia* M. Pontederiácia palustre. Fos radicantes de longo pecíolo; fls azuis, sobre longa fuste; fr capsular. Decorativa e uma das Baronezas.

—**DOS BOSQUES** — Orquídeas (Indistintamente).

—**MARGARIDA** — Margarida.

RAINÚNCULO (RAINÚNCULO) BRASILEIRO — *Ranunculus flagelliformis* Smit. Ranunculácia hidrófila. Fos orbiculares; fls amarelas e fr capsular. Tida como tóxica.

- Tem o mesmo apelido o Agriso do Brasil.
- RAIO DE JÚPITER** — *Pancratium maritimum* L. Amaríllidacia.
- RAIZ AMARGOSA** Cipó cruz verdadeiro. Quina de raiz, Fcl da terra e inúmeras sps, donde a impreciso do apelido.
- BRASILEIRA** — Ipecacoanha.
- DA CHINA** — Japecanga.
- DA CHINA BRANCA** — Japecanga.
- DAS FELIZINAS** — Contra erva.
- DE AÇAFRÃO** — Curcuma (Império).
- DE ANGÉLICA** — Angélica do mato.
- DE BUGRE** — Taiuiá.
- DE CHÁ** — Coqueiro de Venus.
- DE CHEIRO** — Capim cheiroso.
- DE CONGONHA** — Tipi.
- DE CORVO** — Boi gordo.
- DE CURCUMA** — Curcuma.
- DE FEL** — Quina de raiz.
- DE FRADE** — Cipó cruz verdadeiro.
- DE GAMBA** — Tipi.
- DE GUINÉ** — Tipi.
- DE JETICUÇU** — Batata de purga.
- DE JOSE' DOMINGUES** — Milhomens (Indistintamente).
- DE OURO** — Ipeca (Indistintamente).
- DE PEPI** — Tipi.
- DE QUINA** — Cipó cruz verdadeiro e Quina de raiz.
- DE QUINA BRANCA** — Japecanga.
- DE SERPENTARIA DO BRASIL** — Cipó cruz verdadeiro.
- DE TANGARACÁ** — Erva tostão.
- DO BRASIL** — Ipecacoanha.
- DOCE** — Alcaçuz.
- DO CONGO** — Tipi.
- DO ESPIRITO SANTO** — Angélica (Hortense).
- DO PARÁ** — Cipó cruz verdadeiro.
- FEDORENTA** — Cipó cruz verdadeiro.
- PRETA** — Boi gordo e Cipó cruz. Impreciso, porque além dessas, cabe a muitas sps diferentes.
- SANTA** — Azougue dos pobres.
- VOMITIVA** — Ipecacoanha.
- RAJA** — Milhomens (Indistintamente).
- RAJADEIRA** — Andira nitida M. Leguminosa do grupo dos Angelina.

- RAMA DE BEZERRO** — Catanduba.
- RAMO DE NOIVA** — Chuva de prata.
- RAMELA DE CACHORRO** — Grão de galo.
- RAMI, RAMIA, RAMIE** — Boehmeria nivea Gand. Urticácia arbustiva, formando touceiras. Latifólios: fr aquênio. Fibras téxteis do cau. Duas vars: branca e verde, sendo esta a preferida.
- BRANCO** — Vid Rami.
- VERDE** — Vid Rami.
- RAPADURA** — Caraipé verdadeiro (*L. utilis*).
- RAPHIA** — *Raphia excisa*, *Raphia flabelliformes* L Herit. Palmeira estolhosa e arbustiva. Fis flabelliformes e fendidas. Ornamental.
- RAPOCA** — Arapoca.
- RATAÍNHA, RATANIA** — *Krameria argentea* M. Leguminosa arbustiva. Fos compostas e tomentosas; fis solitárias; vagens. Ra adstringente, hemostática e anti diarréica.
- DA TERRA** — Ratâinha.
- DO CEARÁ** — Ratainha.
- DO PARÁ** — Ratainha.
- RATICUM** — *Aricum* (Indistintamente).
- RATIMBÓ** — Mangue branco e M. vermelho (Impreciso).
- RAVENALA** — Árvore do viajante.
- REALISTA** — Pingo de lacre.
- RELÓGIO** — Vassoura de relógio.
- DE PALMA** — Vassoura de relógio.
- DE VAQUEIRO** — Vassoura de relógio. Provavelmente alguma var em que as fis desabrocham às 11 horas.
- REMÉDIO DE GALICO** — Talutá e Azougue dos pobres.
- DE VAQUEIRO** — Alfavaca de cheiro.
- RENAGO** — Gameleira (*F. anthemintica*).
- RENDA DE OURO** — Barba de barata.
- REPOLHO** — *Brassica oleracea* L., var *capitata*. Crucífera que difere da Couve pela disposição das fos, que, embricadas, formam volumosa cabeça — esferoide, achatada ou alongada.
- BRANCO** — Repolho.
- CRESPO** — *Brassica oleracea* L., var *sambaua*. Difere essencialmente do Repolho, pela disposição balsulada das fos.

- DE BRUXELAS — Couve de Bruxelas.
- DINAMARQUÉS — Repolho. Var de cabeça esferóide ou oval e compacta.
- DOMÉSTICO — Repolho. Var de cabeça pouco compacta.
- HOLANDES — Repolho dinamarquês.
- PONTUDO — Repolho. Var de cabeça cônica ou ponteaguda.
- ROXO — *Brassica capitata* var rubra. Var de Repolho apresentando tal coloração em seus elementos.
- VERMELHO — Repolho roxo.
- RESEDA, RESEDÁ** — *Reseda odorata* L. Resedácia sub arbustiva e ornamental. Flos intoiras; fls amarelladas, perfumosas em cachos eretos; fr folicular.
- AMARELO — Tintureira (*G. brasiliensis*).
- DE CHEIRO — Resedá.
- ODORÍFICO — Resedá.
- RESEDAL** — Resedá.
- RIAMBÁ** — Diamba.
- RICINO** — Mamona.
- RIMA** — Fruta pão (sem sementes).
- RITA** — Saboeiro.
- RIZOMA DOS ÍNDIOS** — Curcuma.
- RODA DA FORTUNA** — Folha da Costa.
- ROJÃO** — Coará bravo.
- ROMA, ROMAN, ROMEIRA, ROMANZEIRA** — *Punica granatum* L. Mirtácea arbustiva. Flos simples e vernicosas; fls encarnadas; fr — cárcerulas — var de baga — encarnada e provida de coroa. A se vale mais como ornamento que pelos frs, muito adstringentes.
- DE FLORES DOBRADAS — *Punica granatum* L., var floraplena. Difere da Romã, pelas fls de corola dobrada.
- ROMPE GIBÃO** — *Bumelia sartorum* M. Sapotácia arbórea, ramosissima e armada de fortes espinhos. Flos coriáceas; fr — baga roxa e escura — édula.
- ROSA, ROSEIRA** — Denominação geralmente conferida às Rosáceas do Gé Rosa, apresentando sps, vars e híbridos, que se contam por milhares. Vale pela beleza e perfume de suas fls. As primitivas e poucas vars ainda conhecidas apresentavam fls apenas com 5 pétalas.

- ALMISCARADA — Quiabo de cheiro e especialmente a R. das quatro estações.
- AMÉLIA — *Rosa centifolia* L. Rosácea sub arbustiva, aculeada e ornamenta. De 5 a 7 foliolos; fls róreas; fr baga. Sp generalizada e com inúmeras vars.
- BRANCA — Rosa Amélia. Injustificável, pois se ajusta a inúmeras vars.
- CABOCLA — Ciumes de veija e Cravo de defunto.
- CAMBIANTE DE CAIENA — Papoula de três cores.
- CHA — *Rosa indica* L. Rosácia com fls cor de carne ou amarelo claro. Além das vars dessa sp, são sobrenomeadas Chá, as Rosas pálidas e com cheiro aproximadamente do Chá da Índia.
- DA CHINA — Papoula de três cores e, especialmente, a Graxa.
- DA INDIA — Cravo de defunto.
- DAMASCENA — Rosa chá.
- DA SÍRIA — Malva rosa.
- DAS QUATRO ESTAÇÕES — Sps e vars de Roseiras *semper florens*, que são numerosas.
- DA TURQUIA — *Parkinsonia aculeata* L. Leguminosa arborícola, de cau articulado e armado. Flos compostas, bi pinadas, com folíolos insignificantes; fls amarelas e aromáticas. Lenho para carpintaria. Febrífuga.
- DE ALEXANDRIA — Rosa moscatela L. Rosácia.
- DE BOBO — Cravo de defunto.
- DE CAIENA — Papoula de três cores.
- DE CEM FOLHAS — Rosa Amélia.
- DE CHEIRO — Rosa de Alexandria. Injustificável, porque numerosas estão no mesmo caso.
- DE DAMASCO — Rosa das quatro estações.
- DE DEFUNTO — Cravo de defunto.
- DE FRANÇA — Rosa rubra.
- DE OURO — Cravo de defunto.
- DE SANTA TEREZINHA — Onze horas.
- DE SÃO FRANCISCO — Papoula de três cores.
- DE TOUCAR — Rosa Amélia.
- DO CAMPO — Flor de São João. Impróprio, até para as sps congegneras e silvestres.

- DO JAPÃO — Hortênsia.
- DO MATO — Tres Marias.
- DOS ALPES — Azálea.
- DOS CAMPOS — Erva venenosa.
- FRANCESCA — Rosa rubra.
- GALICA — Rosa rubra.
- GRAXA — Graxa.
- JACUSTRE — Nenúfar.
- ROSÁLIA — Mimo do céu.
- ROSA LOUCA — Papoula de tres cores.
- ROSAMARINHA — Altéa.
- ROSA PAULISTA — Papoula de tres cores.
- ROSÁRIO — Lágrimas de Nossa Senhora.
- ROSA RUBRA — Rosa gallica L. Rosácea sub arbustiva, muito cultivada. Fls vermelho escuas, aromáticas, em cachos. Os pétalos encerram ac. gálico e tânilo. Adstringente.
- TREPADADEIRA — Rosa multiflora carnea Thunb. Rosácea sarmen- tosa e ornamental.
- VERDE — Caso teratológico — chorantia — verificado em certa Rosácea, em que os pétalos, sem a devida evolução, se apresentam como fog verdes.
- VERMELHIA — Rosa rubra.
- ROSCA — Gericó roxo, porém mais enxivel ao sacarolha.
- DE MULAS — Sacarolha.
- PARA MULAS — Sacarolha.

- ROSEDA — Resedá.
- ROSEIRA DO MATO — Tres Marias.
- ROSEIRO — Tres Marias.
- ROSELA — Hibiscus subdariffa L. Malvacia sub arbustiva. Fls pentada lobadas; fls axilares, de cálice encarnado e pétalos róseos, de base escura. Estes dois elementos constituem a parte mais importante da sp, servindo para a fabricação de doces e vinhos. Fls comíveis; fibras texteis do cau.
- SORREL — Rosela.
- ROSETA — Capim roseta, Tres Marias e outras sps, donde a imprecisão do apelido.
- ROSKUINHA DO CAMPO — Sacarolha.
- ROXINHO — Pau roxo.
- RUAO — Aperta ruão.
- RUBIM — Cordão de frade.
- RUCHUCHÚ — Sapucainha.
- RUCÔ — Açafrôa.
- RUDA — Arruda.
- RUIBARBO BRANCO — Batata de purga.
- DO BREJO — Baririçô.
- DO CAMPO — Butua de corvo e Batatinha do campo.
- DO MATO — Baririçô.
- DOS CAMPOS — Baririçô e Batatinha do campo.
- DOS CHARCOS — Baririçô.
- RUIM — Cambarú (Indistintamente).
- RUTI — Parreira brava.

S

- SABA** — Pimenta malagueta.
SABAMBAIA — Samambaia (Indistintamente).
SABÃO — Saboeiro.
SABIÚ — Visgueiro.
SABOEIRA — Saboeiro.
SABOEIRO — *Sapindus saponaria* L., ou *S. divaricatus* Willd. Sapindácia arbórea. Penífólio; fls em cachos terminais: drupa, cuja polpa esmagada espuma como o sabão. Córtez amargo-tônico.
—DO BRASIL — Saboeiro.
SABONETA, SABONETE — Saboeiro.
SABONETE DE SOLDADO — *Melia azedarach* L. Meliácia arbórea e ornamental. Penatifólios alternos; fls illás; drupas contendo saponina. Sp de rápido crescimento, servindo para sombrear cafezeiros e caueiros. Córtez inseticida; frs eméticos e purgativos.
SABONETEIRA, SABONETEIRO — Saboeiro.
SABUCAI, SABUCAIA — Sapucaia (Indistintamente).
SABUGUEIRO — *Sambucus australis* Cham. Caprifoliácia arbórea e ornamental. Penífólios opostos; fls em abundantes cimeiras, aíbas e aromáticas. Febrifugo e sudorífico.
—DO BRASIL — Sabugueiro.
—DO RIO-GRANDE — Sabugueiro.
—DOS PANTANOS — Bola de neve.
SACA-ROLHA — *Heilicetes saca-rolha* Sh. ou *H. ovata* Lam. Esterculiácia arbustiva. Fls amarelas ou encarnadas; frs folículos, em forma de saca-rolha. Ra tónica e adstringente. O apelido estende-se às sps do mesmo Ge.
SACO D'ÁGUA — Camapu.
—E COBRA — Cabeça de boi.
SACOPARI, SACOPARU — Bacupari (Indistintamente).
SAQUAIA — Fumo bravo.
SACUPIRA — Sucupira.
SACUTIABA — Rompe gibão.
SAGU, SAGUEIRO — *Cycas circinalis* L. e outra sp a *C. revoluta*

- Thum. Cicadácia robusta, arbórea, pouco ramosa e com o feitio de Palmeira. Longas fos compostas de foliolos coriációs; fr gálibula. A primeira sp cresce mais, tem fos mais longas e menos coriáciás. A "farinha de sagu", que seus caules fornecem, pode ser obtida das algumas Palmeiras.
SAGUARAGI — Areo de pipa.
SAGU DAS MOLUCAS — Sagu (*C. circinalis*).
—DE JARDIM — Sagu (Indistintamente).
—DO JAPAO — Sagu (*C. revoluta*).
SAGUM — Sagu (Indistintamente).
SAIA BRANCA — Trombeta branca.
SAIAO — Folha da Costa.
SAIMBAIBA, SAIMBEIBA — Lixelra.
SALADA DE TOUPEIRA — Dente de leão.
SALANGOR — Cana de açúcar. Var apreciada por ser tenra.
SAL DO BRASIL — Fedegoso.
SALGASSO — Sargasso (Indistintamente).
SALGUEIRO — *Baileya babylonica* L. Salicácia ornamental. Ramos pendulos e longos com pequenas fos lancioladas; fr capsular. Raro na Bahia.
—CHORAO — Salgueiro.
—DA BABLÔNIA — Salgueiro.
SALSA — *Petroselinum sativum* Hoff. Umbellifera sub arbustiva e cultivada. Fos pinadas; fls em umbelas; fr diaquênio. Toda a sp é aromática. Carminativa, diurética e menenagoga.
—AMERICANA — Salsaparrilha.
—BRANCA — Canudo.
—BRAVA — Cambará vermelho.
—CULTIVADA — Salsa.
—DA PRAIA — *Ipomoea pes-caprae* Sweet. Convolvulácia rasteira, longa, estolhosa e arenícola. Fos bilobadas; fls com vistosas coroas azuladas ou aíbas; fr capsular. Sucessária da Salsaparrilha e fixadora das areias litorâneas.
—DAS HORTAS — Salsa.

- DE CHEIRO — Salsa.
- DO BREJO — Japecanga.
- DO CAMPO — Japecanga.
- DO MATO — Salsaparrilha.
- DOS PÂNTANOS — Aipo.
- GORDA — Japecanga.
- GRANDE — Salsaparrilha.
- HORTENSE — Salsa.

SALSAPARRILHA — *Smilax salsaparrilha* M. Liliácia sarmentosa, gavinosa e aculeada. Fos invaginantes; fls dióicas e fr bacácio. Ras diuréticas, febrífrugas e depurativas. É tambem considerado do Ge Hererria — *H. salsaparrilha* M. — é equiparada à Japecanga e assim da Salsaparrilha verdadeira a *Smilax officinalis* Poir. Contam-se por muitas dezenas as sps do mesmo Ge.

- BRANCA — Salsaparrilha. Ape- lido impreciso, consignado tambem a outras sps do mesmo Ge, e uma Araliácia — *Aralia racemosa* L. — e à "Salsaparrilha dos pobres".
- DAS ANTILHAS — Taluia.
- DAS BOTICAS — Japecanga e Salsaparrilha.
- DO RIO — Japecanga.
- DOS POBRES — Caju. Devido à crença que o bagaço do Caju, após chupado e esfregado na pele, sara as lesões de fundo sifilítico. Tem idêntico apelido a Salsaparrilha branca (*S. racemosa*).

SALSA VULGAR — Salsa.

SALSO — Salgueiro.

CHORÃO — Salgueiro.

SALTA CAVALO — Ivinga (Corru- tela de Agoita cavalo).

SALVA, SALVA COMUM — Pingo de lacre.

DO BRASIL — Pingo de lacre.

DO MATO — Salsaparrilha.

LIMÃO — Erva cidreira (*Melissa*). **SAMAMBÁIA** — Inúmeras sps de Pteridófitos de haste delgada, polida e resistente, servindo à fabricação dos afamados "balões de samambáia"; frondes compostas e decompostas. Exemplos: Cheibantes radiata V., *Pteris candata* V., *Pterium aquilinum* L. Entre as Equisetáceas o *Lygodium polymorphum* HBK. No mesmo caso a Barba de velho.

ACU — Pteridófitos sub arbustivos, arbustivos ou arboretas, alguns dos quais com o feito de Palmeiras, momente pe'a configuração de suas longas frondes: Escada do

ceu; *Alsophilla aspera* B.R.; *A. microdonta* Desv.; *A. excelsa* M.; *Polypodium felixmas* L.; *Adiantum raddianum*, e muitas outras sps.

CHORONA — *Polypodium pendulum* SW. Polipodiácia ornamental pelas suas frondes, de desmesurado comprimento.

CONFETE — Confete.

DAS ROÇAS — Samambáia (*P. aquilinum*).

DAS TAPERAS — Samambáia (*P. aquilinum*).

DO BREJO — Escada do céu.

DO NORTE — Barba de velho.

DOURADINHA — Vid. Douradinha.

GRANDE — Samambáia (*P. aquilinum*).

IMPERIAL — *Dicksonia sellowiana* Hook. Pteridófito de 4 metros, com fos pinadas do 8º grau e muito longas.

PENDENTE — Samambáia chorona.

SAMAMBAINHA — Samambáia (As de pequeno porte).

SAMAUMA, SAMAUVA — Sumau- ma. Sumauma é a melhor grafia, todavia não é a mais generalizada.

SAMBACUIM — Matatauba e Um- bauba (Indistintamente).

SAMBAIBA — Lixeira.

DA BAHIA — *Trichospermum il- chen*. Tiliácea com sementes pilo- sas.

DE SERGIPE — Sambaiba da Bahia.

SAMBAIBINHA — Cipó caboclo.

SAMBAUBA, SAMBAUVA — Lixel- ra.

SAMBEIBA — Lixeira.

SANAMUNDA — Erva tostão.

SANANDU, SANANDUBA, SANAN- DUVA — Mulungú (Indistintamen- te).

SÂNDALO — Sps aromáticas de inú- meras Fas, dentre as quais as se- guentes: Bilreiro, Capim cheiroso, Casco preciosa, Landim.

DO BRASIL — Ameixa da Babia.

DO PARA — Bilreiro.

SANGOLOVÔ — Cana de macaco.

SANGUE D'AGUA — Sangue de dra- go.

DE ADÃO — Pingo de lacre.

DE ANDRADE — Sangue de dra- go.

DE DRAGÃO — Sangue de drago.

—DE DRAGO — Várias sps possuem esse apelido: *Dracaena draco* L. Liácia arbórea, dicotómica; folhas vermiculadas e frs bacáceos. O cau segregava resina hemostática. *Pterocarpus draco* L. Leguminosa, segregando resina concreta — "sangue de dragão" — adstringente e tóxica. *Cratun salutaris* Cas. Euforbiácia, fornecedora de resina encarnada, com as virtudes das mencionadas e suas congêneres — *C. paulistanus* Muel., *C. urucurana* Bail. A palmeira *Calamus draco* Will. Ha duvidas dessas sps na Bahia. As sps do Ge Creton são as mais encontradiças.

—DE PAU — Sangue de dragão.

SANGUINÁRIA — Curraleira.

SANGUINÁRIO — Sangue de dragão.

SANSEVIERA, SANSEVIERIA — Espada de ogum.

SANTA BARBARA — Sabonete de sôdado. Devido à suposição da sps evitar trovoadas.

—CRUZ — Pinheirinho.

—FÉ — Capim gigante das baixas.

—LÓCIA — Lentilhu d'água.

—LUZIA — Curraleira.

—MARIA — Alfavaça (*O. fluminensis*) e Quatro patacas.

—RITA — Tres Marias.

—TEREZINHA — Onze horas.

SAO CAETANO — Melão de São Caetano.

—GONÇALINHO — *Cassearia sylvestre* Sw., *C. brasiliensis*. Flacurtiácia arboreta, ramosa e inculta. Folhas simples; fls em umbelas, no longo dos ramos; baga. Sp melifera. É conhecida a var *lingua* Camb.

—JOÃO — *Cassia bicapsularis* L. Leguminosa arboreta, parecida com o Mata pasto (*C. sericea*). Ornamental, pelas vistosas fls amarelas. Seus ramos — fistulosos — lhe permitem o apelido de Canudo de pito.

—PEDRO — Timbó manbo.

—PEDRO CAA — Rabugem de cachorro (Impróprio).

SAPATEIRA — Graxa.

SAPATEIRO — Mangue vermelho.

SAPATINHO DE IAIA — Chaga.

—DE JUDEU — Mulungu (Indistintamente). Mais generalizado ao Sapatinho do diabo.

—DE NOSSA SENHORA — Viúvina (*Z. pendula*).

—DE VENUS — Orquidácia do Ge *Cypripedium*.

—DO DIABO — *Pedilanthus tithymaloides* Poit. Euforbiácia sub arbustiva, formando touceiras. Cau verdoso e geniculado e fls encarnadas. Sp lactifera, servindo para ceras nativas. Tida por anti-huética e cordial.

—DOS JARDINS — Sapatinho do diabo.

SAPÉ — Capim sapé (*I. brasiliensis*).

—GIGANTE — Capim jaraguá.

—MACHO — Capim sapé e Cordão de ouro (*S. microglossa*).

—VERDADEIRO — Capim sapé (*I. brasiliensis*).

SAPINHO — Pega pinto do miúdo.

SAPIPURA — Sucupira.

SAPIPO E COBRA — Cabeça de boi.

SAPONÁRIA — Saboeiro.

SAPOTA, SAPOTEIRO — *Achras sapota* L., var *sphaerica*. Sapotácia do mesmo tipo do Sapoti, porém com frs globoides e menos saborosos.

SAPOTE — Sapota e Sapoti.

—GRANDE — Mamorana.

SAPOTI, SAPOTIZEIRO — *Achras sapota* L. Sapotácia alta e cultivada. Flos coriácia e lustrosas. Recomenda-se pelas saborosas bagas, elipsóides, de polpa alva ou encarnada. Sp lactifera. Córtez adstringente.

SAPOTILHA — Sapoti.

SAPUCAI — Sapucáia.

SAPUCÁIA — *Lecythis pisonis* Camb. Lecitidácia de bom desenvolvimento e ornamental para ruas e parques. Facilmente caracteriza-se pelas cápsulas lenhosas — pixídio — conhecida por "marmita de macaco", encerrando sementes oleosas e comestíveis. Madeira de lei. Sps congêneres têm o mesmo apelido.

—AQU — Sapucaia.

—BRANCA — Matá-matá ou Sapucáia pequena.

—DE CASTANHA — Sapucáia.

—GRANDE — Sapucáia.

—MIRIM — Matá-matá e a Lecitidácia *Lecythis angustifolia* Endl., do mesmo tipo da Sapucáia.

—PEQUENA — Matá-matá.

—VERMELHA — Inhaiba.

SAPUCAINHA — *Carpotroche brasiliensis* Endl. Flacurtiácia arbórea. Fls alvas e aromáticas. Fr baga que, depois de seca, representa

cúspulas indecisa e volumosa e com membranas longitudinais. Sementes oleaginosas, dando o "carpotran", importante princípio ativo, em voga na cura da lepra. Kuhlmann apresenta sp nova — *C. bahiensis* — de frs maiores — onze cent. — que se caracterizam pela orientação de suas asas, sempre para a esquerda.

SAPUCAIRANA — *Lecythis elliptica*. Lecitífera que se aproxima da Sapucáin, com fls e frs maiores.

SAPUCAIÚ — Matá-matá.

SAPUCAJA — Sapucáia (Indistintamente).

SAPUPERNA — Sapucairana.

SAPUPIRA — Sucupira.

DO CAMPO — Sucupira.

SAPUTÁ — Bacupari.

SAQUARAJI — Arco de pipa.

SARACURA — Erva azeda.

SARAGAÇA — Sargasso (Indistintamente).

SARAMAGO — Rabanete.

SARANGÓ — Salangor. Vid. Cana de açucar.

SARDINHEIRA — Gerânia.

SARGASSO — Algas pardas que as marés acumulam nas praias: Carvalhinho do mar; Alface do mar; *Sargassum baciferum* Ag.; *S. natans* V.; *Zonarium pavonina* sp lamínosa que lembra a cauda do peixe.

COMUM — Carvalhinho do mar.

VESICULOSO — Carvalhinho do mar.

SARITA — São Gonçalinho.

SARROIA — Fumo bravo.

SASSAFRÃO — Curcuma.

SASSAFRÁZ — Canela sassafráz.

AMARELO — Canela sassafráz.

DE CANTAGALO — Caneja sassafráz.

DO BRASIL — Canela sassafráz.

DO PARANÁ — Canela sassafráz.

DO RIO — Canela sassafráz.

SASSAFRAZINHO — Canela sassafráz.

DO CAMPO — Canela sassafráz.

SASSOIA — Fumo bravo.

SAUDADES — Scabiosa atro-purpurea Def. Dipsácia erbácia e decorativa. Fls em capítulos, roxas, sobre longa raque; fr aquênio. Béquica. Vars albas, lilás e róseas.

BRANCAS — Saudades. Var alba da *S. atro-purpurea*.

DE CAMPINA — Cega olho.

DO INVERNO — Crisântemo.

PERPÉTUAS — Sempre viva.

ROXAS — Saudades.

SAUIN — Avaremótomo.

SEBASTIÃO DE ARRUDA — Dalbergia sp. Leguminosa cuja sp ainda não foi apurada. Madeira de lei preciosa para obras de luxo. É também conhecido com o mesmo apelido o *Physocalymma florida* Pohl. Litracia florestal, com fls encarnadas e cápsulas globoides. Igualmente madeira de lei.

SEBAPIRA, SEBIPIRA, SEBUPIRA

-- Sucupira.

SEBEPIRA AÇU — Sucupira açu.

SEBIPIRUNA — *Caesalpinia peltophoroides* Bent. Leguminosa arbórea, ornamental, que passa por Pau Brasil, com o qual bastante se parece. Penifólio; fls em belíssimos cachos amarelos e eretos; vagens chatas.

SEDA DE LINHO — Cipó chumbo.

VEGETAL — Linho da Nova Zelândia.

SEGURELA — Quiôô.

SEIBO — Mulungú (Indistintamente).

SEJAGAM — Espanódia.

SELGA — Aceiga.

SEMENTE DE CARVALHO — Melão casca de Carvalho.

DE EMBIRA — Embira.

SEMPRE BELA — Sempre viva.

LUSTROSA — Tres Marias.

VERDE — Sempre viva e, especialmente, o Capim sempre verde.

VIVA — *Xeranthemum annum* L. Composta erbácia e ornamento. Fls em capítulos áureos, com seus elementos dispostos em forma de escamas lenhificadas e juzidias, resistindo à ação do tempo.

VIVA SERRA — Capipointinga.

VIVA DO CAMPO — Capipointinga.

VIVA DOS GERAIS — Capipoatinga.

SENE DO CAMPO — Boi gordo, Fedegoso e algumas Cássias, donde a imprecisão do apelido.

NACIONAL — Sene do campo. As mesmas sps e a apreciação.

SENSITIVA — *Mimosa pudica* L. Leguminosa erbácia e armada. Penífólios articulados no vértice de longo peciolo apresentando movimentos curiosos de seismonastia e nict-

tinastia; flos em glomérulos avressados; vagens segmentadas. Colagozo. Adubo verde. Entre outras sps congêneres, com o mesmo apelido e do mesmo tipo a *Mimosa velloziana* M. Com 2 pares de penífolios, no extremo da raque.

—**MANSA** — Vários Carrapichos da Fa das Leguminosas dentre as quais a *Aeschynomene falcatifolia*, a Corticeira do campo. Vid Carrapicho.

SENSIVEL — Sensitiva (Indistintamente).

SEPEPIRA, SEPIPIRA, SEPÓPIRA — Sucupira.

SEPEPIRANA — Sebipiruna.

—**AMARELA** — Angelim pedra.

SEPIPIRAUNA — Sucupira.

SEREIBA — Mangue branco.

—**DO MANGUE** — Mangue branco.

—**TINGA** — Mangue branco.

SERENO — Fo de seda.

SERIGUELA — *Spindias rubra*. Anacardíacea do tipo da Cajá, porém com frs menores, menos ácidos e encarnados.

SERINGA — Chuva de prata e Seringueira. Ajustando-se às duas sps, não deixa todavia de ser impreciso.

SERINGUEIRA — *Hevea brasiliensis* Aubl. Euforbiácea alta e bem aclimada na Bahia. Trípala palmifólia, insertos na raque; cápsula tricoca, com sementes oleaginosas. De seu tronco extrai-se a borracha. Muitas vars.

—**BOA** — Seringueira.

—**BRANCA** — Seringueira.

—**FOLHA DE MANIVA** — Seringueira.

—**ROсадА** — Seringueira.

—**ROXA** — Seringueira.

SERIUVA — Crindeuva.

SERPENTÁRIA DO BRASIL — Contra erva.

SERPENTINA — Abóbora serpente.

SERRALHA — *Emilia sonchifolia*, D C. ou *Sonchus oleraceus* L. Composta erbácia e inculta. Cau geniculado; flos ensiformes, com auriculas basilares; flos em capítulos dispostos sobre longa fuste. Sp rundera.

—**DA ROCHA** — Costa branca.

—**DO BRASIL** — Serralha.

SERREIRO, SERRERO — Jacaré.

SERTAN — Mandioca (Indistintamente).

SERUAIA — Mari-mari.

SERUTINGA — Mangue branco.

SESSENTA E DOIS — Galinha choca.

—**FERIDAS** — Marieá.

SETE CAPOTES — Sobreiro.

—**CASACAS** — *Machaerium angustifolium* Vog. Leguminosa do grupo dos Jacarandás. Penífolio imparipinulado; flos roxos. Lenho de segunda. Ornamental.

—**CHAGAS** — *Phyllodendron pertusum*. Arácea epífita, sarmentosa, e de gavinhas grampiformes. Latifólio elíptico, longo peciolado e com fenestrações no limbo.

—**DORES** — Juiz de paz.

—**MARIAS** — Mussabé de espinho.

—**SAIAS** — Trombeta. Var de corola dobrada.

—**SANGRIAS** — *Cuphaea balsamona* Cham & Sch. Litracia erbácia, pilosa, de flos inteiras, flos rosas e fr capsular. Anti venérea, balsâmica e diaforética. Sp com o mesmo apelido: *C. pascrorum*; *C. aperata* Koelm.; *C. ingratia*.

SETIM (CETIM) DO MAR — Alfaca do mar.

SEVADILHA — Espirradeira.

SÉZANO — Gergelim.

—**DO ORIENTE** — Gergelim.

SHADDOCK — Toranja.

SIBIPIRA — Sucupira.

SIBIPIRUNA — Sebipiruna. A primeira grafia é mais certa.

SICOMORO BASTARDO — Sabonete de soldado.

SICOPIRA, SICUPIRA — Sucupira.

SILVA D'AGUA — Sensitiva.

—**DA PRAIA** — Carnicha.

SILVINA, SILVINIA — Erva silvinia.

SIMARUBA — Pau paraiba.

—**DO BRASIL** — Pau paraiba.

—**MIRIM** — Pau paraiba.

—**PARAIBA** — Pau paraiba.

SIMBAIBA — Cipó caboclo.

SINO DA TARDE — Trombeta branca.

SINTRO — Losna.

SIPIPIRUNA — Sebipiruna.

SIPOPIRA — Sucupira.

SIRIBA, SIREIBA, SIRIIBA, SIRIUBA, SIRIUVA — Mangue branco. Preferível grafar Siriiba — árvore do siri — (Iba significa árvore).

SISAL — *Agave americana* L. Var *sisalana* Perrine. Guarda muita semelhança com a Vela da pureza —

A. americana. Tem, porém, fôs mais estreitas. Muito cultivado na Bahia pelo valor de suas fibras em corduaria. Existe uma var sem espinhos foliares.

—**MEXICANO** — Sisal.

SOBRAGI, SOBRAGIL — Arco de pipa.

SOBRAJU, SOBRIAJU — Arco de pipa.

SOBREIRO — *Pithecellobium lusurium* Bth. Leguminosa arbórea e pouco ramosa, com folhas compostas pinadas. Singulariza-se pelo cau, fortemente gretado e pela espessíssima camada de corteça que o reveste. Pouco cultivado na Bahia. Lenho para carpintaria.

SOBRO — Capororoca, Carne de vaca, Lixeira e Sobreiro. Impreciso portanto o apelido.

—**NACIONAL** — Lixeira.

SOITA CAVALO — Açoita cavalo.

SOJA, SOJEIRA — *Dolichos soja* L. Leguminosa erbácia, apresentando centenas de vars e pouco cultivada ainda na Bahia. Trifólios; fls axilares; vagens curtas e hispidas, contendo até 5 sementes. Tão importante sp merece cultura intensa. É adubo verde e forragem. As sementes, de alto valor nutritivo, dão farinha e óleo que substitue a manteiga. Também considerada no G. glicine: *Glycine hispida*.

SOLANO — Pimenta de galinha.

SOLDANELA — Salsa da praia.

SOLIDÔNIA — Erva tostão.

SOMBRA DE TOURO — Maiteno.

SONHO DE VIRGEM — Sorriso de Maria.

SORGO — Capim massambará.

—**BRASILEIRO** — Capim massambará.

—**DE ALEPO** — Capim massambará.

SOROROCA — Árvore do viajante e Bananeirinha do mato (*Heliconia psittacorum*).

SOROROQUINHA — Bananeirinha do mato.

SORRISO DA VIRGEM — Sorriso de Maria.

—**DE MARIA** — *Aster alpinus*. Composta sub arbustiva muito ornamental. Flos filiformes; fls em pequenos capítulos, constituindo abundantes panículas compostas.

SORUMA — Diamba.

SOUARI — Pequiú.

SUACU AIA — Fumo bravo (*E. seaber*).

—**CAA** — Fumo bravo (*E. seaber*).

SACUPÉ — Capim peba e *C. espé* macho.

SUCENA — Angélica do mato.

SUQUAIA — Fumo bravo (*E. seaber*).

SUQUAIAJÁ — Fumo bravo (*E. seaber*).

SUCUBA, SUCUIBA — Agoniada.

SUCUPIRA — *Bowdichia virgilioides* HBK. Leguminosa florestal. Penífólio; fls roxas; vagens. Madeira de lei, parda, para carpintaria, "Tubérculos de Sucupira". radiculares, são tidos como depurativos. Vars: amarela, d'água, mirim e parda.

—**AÇU, SUCUPIRUÇU** — *Bowdichia virgilioides* HBK, var major. Os mesmos caracteres da Sucupira.

—**BRANCA** — Faveira (*C. pubescens*).

—**DA PRAIA** — Sucupira.

—**DO CAMPO** — Sucupira.

—**FALSA** — Angelim pedra.

—**LISA** — Faveira (*P. pubescens*).

—**MIRIM** — Sucupira.

—**MIUDA** — Sucupira.

—**PARDA** — Sucupira.

—**PRETA** — Sucupira e Angelim pedra.

SUCURUINHA — Erva tostão.

SUCURUJÁ — Maracujá (Indistintamente).

SUCURURA — Maracujá (Indistintamente).

SUCUUBA — Agonlada.

SUCUVA — Fumo bravo (*E. seaber*).

SUÉ — Pimenta de galinha.

SUINÁ, SUINA, SUINAN — Mulungú (Indistintamente).

SUINARA — Mulungú e especialmente a *E. collardendron*.

SULTARIA — Mariasinha sem vergonha.

SUMA — Cipó suma.

—**BRANCA** — Cipó suma.

SUMARÉ — *Cyrtopodium punctatum*

L. Orquídacia epífita ou terrestre, até metro de altura. Pseudo bulbos com fibras têxteis. Flos distícas; fls amarelas pintalgadas de chocolate, em abundantes cachos. Ornamental, biquíco, emoliente e purgativo.

SUMAUMA — *Ceiba pentandra* L. Bombácia de enorme crescimento.

Cau com raízes tabulares. Digitifólio sobre longo pecíolo; fr capsular com sementes envoltas em abundantes pêlos ou painas — setosas, leves, para colchões e salva-vidas. Lenho levíssimo. Tem também o nome de Barriguda; a *Sterculia excelsa* M., do Sul da Bahia. Sp multiflora, de lenho alvo e leve, parecida com o Chichá, tem o mesmo apelido.

— DA TERRA FIRME — Sumauma.

— DA VÁRGEA — Sumauma.

— DE MACACO — Sumauma.

— DO IGUAPÓ — Butua de corvo.

SUMAUVEIRA — Mulungu e especialmente a Sumauma.

SURINEA — Canela preta e Louro amargoso.

SURUCUCÚ — *Piptadenia bracteata*

Bent. Leguminosa cujas foé, de ramos recentemente cortados, matam o gado que as comem. Para C. Torr., trata-se da *P. zehntneri*. O Ora pro nobis, devido a seus abundantíssimos espinhos, tem o mesmo apelido.

SURUCUINA — Erva botão.

SUSPIRO — *Gomphrena globosa* L. Amarantácia erbácia, cultivada como ornamento. Fls em gluméculos, ou capítulos esféricos, de longa raque, roxas. Simbolizam a "saudade indelevel", por isso usada para coroas e palmas mortuárias.

— **BRANCO** — *Gomphrena globosa* L. var. *albiflora*. Varis do Suspiro, pelas inflorescências albas.

— **ROXO** — Suspiro.

SUSSAIA — Fumo bravo (*E. scaber*).

T

TABABUIA — Tabua e tambem corutela de Tabebuia.

TABACARANA — Quitoco.

TABACO — Fumo.

—**DA FOLHA LARGA** — Fumo.

—**DA INDIA** — Esponjera.

TABEBUIA — Pau de tucano.

—**DO BREJO** — Pau de tucano.

TÁBOA — Tabua.

TABOCA — Bambus, Taquaras e sps congêneres.

TABOQUINHA — *Laciella sorghoides* Hitch. Gramínia sub arbustiva e ramosa. Fos pilosas e cordiformes; cachos de espigas. Hidrófia e forragem de segunda. Outro apelido da Marianinha.

TABUA, TABU — *Typha domingensis* Kunt. Tifácia hidrófila e arbustiva. Fos até 4 metros de longa, ricas em celulose; servem para coxins e esteiras. Ras audorificas. Praga dos aqüdes.

TABUÁ — Cajá.

TACAA MACA — Almecega.

TACHIZEIRO BRANCO — Carvão de ferreiro.

TACOARA — Taquara, Taquari (Indistintamente).

—**DO REINO** — Taquara (*A. donax*).

TACOARE — Mamorana (Impróprio).

TACOARI — Taquari. Talvez melhor grafia que Taquari.

—**D'AGUA** — Canarana fina.

—**DE CAVALO** — Capim rabo de mucura.

—**UBÁ** — Taquara (*A. donax*).

TACOMARE — Cana de açucar (Indistintamente).

TACUERA — Abóbora d'agua.

TAGETES DO BRASIL — Cravo de defunto.

TAGETO — Cravo de defunto.

TAGIAUVA — Tatajiba.

TAGUAJIBA — Tatajiba.

TAGURA — Tinhorão.

TAIA, TAIAUVA — Taioba.

—**JARARACA** — Cipó imbé.

TAIABO — Tamboril.

TAIAÇU — Grão de galo e Mandioca.

TAIARANA — Taioba.

TAIAUBA, TAIAUVA — Taioba.

TAIAURANA — Mangará roxo.

TAIOBA — *Colocasia anticorum* Schot. Arácia erbácia, e hortense. Rizomas comíveis. Latifólios sagitados tambem comíveis; fls em espádices.

—**BRAVA** — *Colocasia antiquorum* Schot., var *acris*. Difere da Taioba pelo maior volume do rizoma e pelo desmesurado tamanho do pecíolo e no limbo folíparo. Fos não comíveis e extremamente ares.

—**DE SÃO TOMÉ** — Taioba.

—**ESCULENTA** — Taioba.

—**MANSA** — Taioba.

TAIOBUÇU — Taioba brava.

TAIOIÁ — Taiuiá.

TAIOVA — Taioba.

TAIUÍA — *Trianosperma tayui* M. Cucurbitácia trepadeira de fos lobadas, fls amarelas e campanuladas e frs bacáciios. Tida como anti luútica, cologoga, diurética e anti artrítica. Possue outras designações científicas e algumas vars.

—**DE FRUTO ENCARNADO** — Taiuiá.

—**ITACA** — Taiuiá.

—**MIUDO** — Abóbora do mato.

—**MIUDO CATINGUEIRO** — Taiuiá de quiabo.

—**PIMENTA** — Taiuiá.

—**QUIABO**, ou tambem **TAIUÍA** — *Wilbrandia verticillata* Cogn. Cucurbitácia sarmentosa de cau tortuoso, fos lobadas, fls albas e frs bacáciios. As mesmas virtudes do Taiuiá.

TAIUIÚ — Taiuiá.

TAIUVA — Tatajiba e Taioba, donde sua imprecisão.

TAJÁ, TAJAL, TAJAZ — Taioba.

TAJABUÇU — Taioba brava.

TAJACU, TAJACU-CARAPIA — Grão de galo.

TAJAS — Caladio (*C. bicolor*).

—**TAJAZ, TAJÁ DE COBRA** — Cipó imbé.

- TAJIBA** — Tatajiba.
- TAJIRA** — Tatajiba.
- TAJUBA** — Tatajiba.
- TAJUJA** — Taiuiá.
- DO MATO — Abóbora do mato.
- TAJURA** — Tinhorão.
- TAJUVA** — Tatajiba.
- TALA** — Borasso.
- TAMACOARÉ, TAMACOARI** — Cunassari.
- TAMANCAO** — Pau de tucano.
- TAMANQUAREMBO** — Camassari.
- TAMANQUEIRA, TAMANQUEIRO** — *Fagara rhoifolia*. Rutácia arbórea e armada. Penísolio, fls em rácimos e frs bacáceos. Lenho alvo e leve, para tamancos. Apelido impreciso, pois cabe a certas esp., inclusive o Espinho de vintem.
- DA VARZEA — Espinho de vintem.
- TAMAOTARANA** — Amendoi.
- TAMARA, TAMAREIRA** — *Phoenix dactylifera* L. Palmácia robusta de longas folhas pinadas e espinhosas; fls amarelas em abundantes cachos; fr drupa saborosa e nutritiva. Também é ornamental.
- DA TERRA — Baba de boi (*C. romanzoffiana*).
- TAMARINDA** — Tamarindo.
- TAMARINDO, TAMARINDEIRO** — *Tamarindus indica* L. Leguminosa de grande resistência e umbrosa; vagens indecisentes, com polpa amilo — acre-doce, servindo para geleias e refrigerantes. Emoliente, carminativo e laxativo.
- DA INDIA — Tamarindo.
- DE MEZA — Tamarindo japonês.
- JAPONÊS — *Phyllanthus pulcher* Wall. Euforbiácia erbácia, erecta e ornamental. Fols compostas, com foliolos intercalados de pequenas fls, pendulas e róseas.
- TAMARINHO** — Tamarindo.
- TAMAUACUARI** — Camaçari.
- TAMBAÍBA** — Jacarandá negro.
- TAMBARATUCA** — Espinho de vintem.
- TAMBATAJÁ** — Caládio (*C. bicolor*).
- TAMBATARUGA** — Espinho de vintem.
- TAMBETARU** — Espinho de vintem.
- DE ESPINHO — Espinho de vintem.
- TAMBOR, TAMBORI** — Tamboril.
- TAMBORÃO** — Vid Tinhorão.
- TAMBORIL, TAMBORIM, TAMBURIL** — *Enterolobium timbouva* L. ou *Mimosa contortissima* V. Leguminosa de elevado porte. Penísolios; fls albus; vagem espessa e negra — “orelha de negro” — como justamente é conhecida. Para C. Torr., o Tamboril é o *E. contortissimum* e a Timbauba, sp distinta, o *E. timbauba*. Caminhão, acreditando na distinção aludida, admite o mesmo Ge e a mesma sp para ambos, estabelecendo a var canescens para aquele. Córtez anti helminítico. Srs do grupo dos Tínguis e contendo saponina.
- BRAVO — Ibira puita.
- TAMBORIUVA** — Tamboril.
- TAMBRIM** — Tamboril.
- TAMBU** — Quina de Camamu.
- TAMBURIUVA** — Tamboril.
- TAMBUVI** — Tamboril.
- TAMIARAMA, TAMIRANA** — Cipó tripa de galinha.
- TANCHAGEM** — *Plantago major* L. Plantaginácia erbácia, latifólios elípticos, longos, peciolados e radicantes; fls em espigas; fr capsular. Conhece-se a *P. media* L. e outra ainda menor, a *P. lanciniata* L. Adstringente, febrífuga e emoliente.
- TANGARA** — Jacatirão.
- AÇU — Baga da praia e Gritadeira. Impreciso pela dupla significação.
- TANGARACÁ** — Erva tostão.
- TANGARÁ-CAA** — Erva de rato.
- TANGARACÁ-AÇU** — Gritadeira.
- AÇU CAA — Baga da praia.
- TANGARÁ GUAÇU** — Baga da praia.
- TANGERINA** — Laranja tangerina.
- CRAVO — Laranja tangerina.
- TANGE-TANGE** — Cascavel.
- TANHORÃO** — Vid Tinhorão.
- TANJA, TANJINHA** — Laranja tangerina.
- TANSAGEM** — O mesmo ou melhor que Tanchagem.
- TAPA BURACO** — *Acalypha communis* Muell. Euforbiácia sub arbustiva e ruderal. Fols deltoides e serrilhadas; fls em longas e delgadas espigas. Além de outras esp., o Aperta ruão — *P. aduncum* — possue o mesmo apelido.
- TAPAGIBA** — Tatajiba.
- TAPEIÇABA** — Vassourinha mofina.

TAPEREBÁ, TAPERIBÁ — Cajá.—**AÇU** — Cajá manga.—**DO SERTÃO** — Cajá.**TAPETE — Côleos (Indistintamente).**—**DE OXALÁ** — Peitodon sp. Labinda erbácia e inculta. Flos aromáticas, ovalares, carnosas e alternadas; cau piloso e ereto, anti neuralgico e digestivo.**TAPIÁ — Crataeva tapia L.** Caparidácia erbácia, com flos fendidas, fls solitárias o fr capsular comível.**TAPIBUIA — Mangue (Indistintamente).****TAPICURÚ — Bacupari do campo e mais ajustável ao Itapicurú.****TAPINHOÁ, TAPINHOAN — Silvia navalium F. Ali.** Laurácia arbórea. Madeira de lei. Córtez adstríngente.—**AMARELO** — Tapinhoá.**TAPIOCA DE PURGA — Batata de purga.****TAPIRA CAIENA, T. COANA, T. COINANA — Chuva de ouro (C. fustula).**—**PECU** — Costa branca.**TAPIRIBÁ — Cajá.****TAPIRICA — Tres Marias.****TAPIRIRÁ — Pau pombo.****TAPIRIRI — Pau pombo.****TAPIXABA — Vassourinha mofina.****TAPIXINGUI — Capichingui.****TAPIXIRICA — Vassourinha mofina.****TAPORÉ — Contra erva.****TAPOROROCA — Capororoca.****TAPUOCA — Agoniada.****TAQUARA —** Várias sps de Gramíneas de cau lenhoso, rizomatosas, em touceiras e com o feitio reduzido dos Bambus: Arundo donax L. Cau fistuloso, flexivel e resistente, servindo para caniço de pescaria; Chusquea gaudichaudii Kth e sps congêneres; Guadua angustifolia Kth., G. superba Hub e outras sps do mesmo Ge. Tem ainda o mesmo apelido certas sps do Ge Merostachys.—**AÇU — Taquara (C. gaudichaudii)** e os Bambus.—**DO REINO — Taquara (A. donax).**—**FINA — Vid Taquari.****TAQUARASINHA — Marianinha.****TAQUARI —** Gramíneas lenhosas, geralmente sarmcentosas ou sub sarmcentosas, arbustivas, fistulosas e delgadas. Podem ser consideradas como Taquaras trepadoras. Além das denominadas Crissiumas, existe

algumas Gramíneas dos Ge Arundinaria e Chusques, com esse apelido.

—**D'AGUA — Canarana fina.**—**DE CAVALO — Carim rabo de mucura.****TAQUARIL — Taquari (Indistintamente).****TAQUARINHA —** Os taquaris e, especialmente, a Taboquinha (*L. sorghoides*).—**ROXA — Viuvinha (Z. pendula).****TAQUARUÇU —** Taquara (*C. gaudichaudii* e *G. superba*).**TAQUEIRA —** Abóbora (Indistintamente).**TAQUERA —** Cabaça.—**TARA —** Taioba.**TARAITAIA —** Mussambé de espinho.**TARARACU —** Fedegoso e Mata pasto.**TARARAIA —** Mussambé de espinho.**TARARANGA BRANCA —** Pouruma guineensis Aubl. Morácia do tipo das Umbaubas (bravas), diferindo, no entanto, pelos seus frs édulis — drupas — com o sabor da Uva, dando bebida vinhosa. Fls trilobadas, frs esbranquiçados.—**PRETA —** Pouruma cecropiaeifolia M. Morácia, que difere da Tararanga branca especialmente pelas fcs de 7 lobos e frs pretos.—**VERMELHA —** Pouruma mollis Tre. Distingue-se das outras Tararangas pelos frs menores e pela cor carnada escura dêstes.**TARAREMA —** Tatajiba.**TARARUCU —** Fedegoso.**TARAXACO —** Dente de leão.**TAREREQUE, TAREROQUE, TAREQUI —** Fedegoso e Mata pasto.**TERERIAIA —** Mussambé de espinho.**TARO —** Inhame japonês.**TAROMA, TARUMA, TARUMA, TARUMEN —** Maria preta. Dentre outras sps de Vitex, com esse apelido, destaca-se a *V. taruma* M., ou *V. montivideensis* Cham. Verbenácia arbustiva, com flos pentalobadas, fls em cimeiras e fr báculo. Depurativa e diurética.—**DA VÁRZEA —** Maria preta (*V. cymosa*).—**DO ALAGADO —** Maria preta (*V. cymosa*).

— DO IGUAPÓ — Maria preta (*V. cymosa*).
TAROPÉ — Contra erva.
TARRO — Tinhorão.
TARUMEIRA — Taromã.
TASNEIRA — Catinga de mulata (*T. vularis*).
TASNEIRINHA — Cardo morto.
TATAGUBA — Tatajiba.
TATAIRA, TATAISBA, TATAIUBA, TATAIUVA — Tatajiba.
TATAJIBA ou melhor **TATAGIBA** — *Morus tatajiba* V. ou *Maclura tinctoria* Don. Morácia arbórea e armada. Fos ovalares e serrilhadas; fls axilares, produzindo pequenas infrutescências édulis. Córtez dá matéria corante.
— DE ESPINHO — Tatajiba.
— DE TINTA — Tataiba.
— DO BREJO — Tatajiba.
TATAJOBA, TATAJUBA — Tatajiba.
TATAJURA — Tatajiba.
— DE ESPINHO — Tatajiba.
— DO BREJO — Tatajiba.
TATAPIRIRICA — Pau pombo.
TATAUBA — Tatajiba e menos propriamente a Catuaba.
TATOJUBA — Tatajiba.
TATU — Cacto melão.
TAU — Bilreiro.
TAUBA, TAUVÁ — Bilreiro e Tatajiba (Impreciso).
TAVAJIBA, TAVAJUBA — Tatajiba.
TAXIZEIRO — Carvão de ferreiro.
TECLA — Papagaio.
TECOMARIA — *Tecomaria capensis* Apach. Bignoniácea semi escandente e ornamental. Tri ou tetrafólios serrilhados; fls alaranjadas, em belos cachos.
TECUM, TECUMA — Tucum (*B. setosa*).
TEI — Almecega (Indistintamente).
TEIA DE ARANHA — Aveloz.
TEIU — Contra erva.
TEJU — *Jatropha elliptica* M. Arg. Euforbiácea.
— AÇU — Contra erva.
TEJUCO — Taiuiá.
TEMBETARU — *Xanthoxylon tinquaeiba* S. H. Rutácia afim do Espinho de vintem, que tem o mesmo apelido.
— DE ESPINHO — Espinho de vintem.
TENGA — Coqueiro de Venus.
TENSAJA — Tansagem.

TENTO AZUL — Lágrimas de Nossa Senhora.
— DA AMÉRICA — Jequiriti.
— DOS MUDOS — Jequiriti.
— PEQUENO — Jequiriti.
TENTOS — Jequiriti.
TEOSINTE, TEOSINTO — *Euchleana mexicana* Schra. Gramínea cespitosa de muitos metros. Fos ensiformes; fls em espigas, parecidas com as do Milho — masculinas e femininas. Excelente forragem e também conhecida por Capim de Venezuela.
— DA GUATEMALA — Teosinte.
TERAPIA — Tapiá.
TEREZINA — Copaiá.
TERMINALIA — Amendoeira da India.
TERRA MERITA — Curcuma.
TETA DE PORCA — Espinho de vintem.
TETIPOTEIBA — Erva de passarinho (Indistintamente).
TETO DE CADELA — Espinho de vintem.
TI — Coqueiro de Venus e Sangue de drago (Impreciso).
TIBOIBA — Tamboril.
TIBORNA, TIBORNO — Janauba.
— DOS SERTANEJOS — Janauba.
TICUM — Tucum (*B. setosa*).
TIJAU — Banana (Indistintamente).
TIMBAIBA, TIMBAIVA — Tamboril.
TIMBAUBA, TIMBAUVA — Tamboril.
TIMBIUCATINGA — Mangaba.
TIMBIUCATU — Mangaba.
TIMBÓ — Tingui e, com muito menor propriedade, sps de várias Fas.
— **BOTICÁRIO** — Timbó de raiz.
— **CIPÓ** — Vid Cipó timbó.
— **DAS PIRANHAS** — Cipó de macaco.
— **DE PEIXE** — Vid Cipó timbó.
— **DE RAIZ** — *Piscidia erythrina* V. Leguminosa arbórea, com o aspetto do Mulungú. Trifólios; fls róseas; fr vagem. Tóxico, hipnótico e sedativo. Ras para tinguijar os peixes.
— **DO CAMPO** — Cipó d'água (*S. caracasana*).
— **DO RIO DE JANEIRO** — Camapu.
TIMBOIBA — Tamboril.
TIMBÓ LEGÍTIMO — Vid Cipó timbó.
— **MANSO** — *Monstera pertusa* De Vri. Arácia robusta e epífita. Fos deltoides, com fenesstrações no limbo e meio metro de comprimento.

- Ras antireumáticas; fos vesicantes.
Tóxico. A sp apresenta vars.
- MIRIM — Anil.
- PEBA — Tingui capeta.
- TIMBORA** — Tamboril.
- TIMBORANA** — Tamboril.
- TIMBORIL** — Tamboril.
- TIMBOUBA, TIMBOUVA** — Tambo-
ril.
- TIMBUIBA** — Jacarandá preto e,
especialmente o Tamboril.
- TIMBUVA** — Tamboril.
- TINGE OVOS** — Carurú bravo.
- TINGUA** — Tingui (Indistintamen-
te).
- TINGUACI, TINGUACIBA, TINGUA-
ÇU** — Espinho de vintem.
- TINGUI** — Diferentes sps conhecidas
por esse apelido, servindo para in-
toxicar os peixes e figuram com
vários apelidos: Anil bravo, Cipó
cururu, C. d'água (*S. caracasana*),
C. de macaco, C. timbó e o Conam-
bi, dos mais eficientes e encontra-
dos na Bahia.
- CAPETA — *Magonia glabata* SH.
Sapindácia com penífolios, fls ama-
relas e fr capsular, que serve de
sabão. Ictiotóxico.
- DA PRAIA — Verbaço do Brasil.
- DAS PIRANHAS — Cipó de ma-
caco.
- DE CAIENA — Anil bravo.
- DE COLA — Tingui capeta.
- DE PEIXE — Tingui (As sps
ictiotóxicas).
- TINGUIM** — Tingui (Indistintamen-
te).
- TINGUI PEBA** — Tingui capeta.
- TINHORAO** — Caládio. Os Tinho-
rões são Aráceas, Ge *Caladium*, ge-
ralmente ornamentais pelo colorido
de suas fos ou das espádices, com-
preendendo inúmeras vars. Serve
de exemplo o *Caladium bicolor* ou
o *C. picturatum* C. Koch.
- DE LOMBRIGA — Caládio (*C. bi-
color*).
- SARAPINTADO — Tinhorão (*C.
picturatum*).
- TINTA DE SAPATEIRO** — Pau de
rato.
- DOS GENTIOS — Anil e Cortina
dos pobres.
- TINTEIRA** — Mangue vermelho. Im-
preciso, pois o M. amarello e inú-
meras sps também fornecem maté-
ria corante. As sps conhecidas por
Sangue de drago têm o mesmo
apelido.

- TINTUREIRA** — *Phytolacca degan-
dra* L. Fitolaciá sub arbustiva.
Cau carnoso; fos lancioladas, opos-
tas às inflorescências; bagas acre-
doceas, enjolivas, dando a "baga-
dos tintureiros", cor de carmim;
ras purgativas; sp rica em ac. oxí-
tico. Além do Carurú bravo, tem
esse apelido a *Galphimia brasiliensis* Jus., *Malpighiácia* arbustiva, or-
namental e adstringente.
- VULGAR — Tintureira.
- TIPIA** — *Cássia argentina*.
- TIPI** — *Pithecellobium alliacea* L. Fitolaciá erbácia. Fos elípticas; fls
em longas espigas e fr capsular
insignificante. Tido por diurética
e usada para afastar os "maus
olhos". O cheiro das ras, justifica
o apelido — "Ra de gambá". Mu-
ito conhecido por Guiné.
- TIPIRI** — Araribá rosa.
- TIPITI** — Titara (*D. macrocan-*
thus).
- TIPI VERDADEIRO** — Tipi.
- TIPOLO** — Fruta pão. Var com se-
mentes.
- TIPOU, TIPOUANA** — Cássia argen-
tina.
- TIQUIM** — Jequiriti.
- TIRA TEIMA** — Laranjeira do
mato.
- TIRIRICA** — Algumas Ciperáceas,
erbárias ou sub arbustivas, silve-
stres e que se adaptam à sombra.
Fos hirsutas, lineares, de bordas
cortantes — "navalhas de maca-
co" — impregnadas de sílica. Fls
em espiguetas, formando cachos;
frs aquêniós, apetecidos pelos pá-
ssaros: *Cyperus brasiliensis*; *C. ra-
diatus* Vahl; *Scleria melaleuca*
Schl.; *S. mitis* Berg.; *S. paludosa*
Ktk.; *S. palustris* N. e E.; *S. te-
nacissima* dentre outras.
- COMUM — Tiririca (*C. brasiliens-
sis*).
- DE BABADO — Carqueja.
- DE MATO GROSSO — Tiririca
(Do Ge *Scleria*).
- DOS JARDINS — Capim dandá.
- TITARA** — Euterpe sarmentosa.
Palmácia trepadeira e da sombra.
Cau armado e ramoso; fos longo
elípticas; frs drupáceos, lembrando
semente de Arroz. *Desmoncus ne-
morosus* da mesma Fa, com dru-
pas albas de brilho porcelânico, en-
voltas por bracteas. *D. macrocan-*

- thus.** D. *polyacanthus* M. e outras sps sarmentosas.
- TITI** — Tipi.
- TIU** — Contra erva e São gonçalinho.
- TOCARI** — Castanha do Pará.
- TOCOM, TOCUM** — Tucum (B. setosa).
- TOE** — Trombeta branca.
- TOLONGA** — Cordão de frade.
- TOMATE, TOMATEIRO** — *Solanum lycopersicum* L. Solanácia muito cultivada e semi prostada, apresentando inúmeras vars, podendo ser erbáceas ou sub arbustivas; frs de forma e volumes diferentes, valendo pelo seu teor em vitaminas, ac. mágico e tartárico.
- CABACINHA** — Tomate comprido.
- CEREJA** — Tomate. Var com frs pequenos e esféricos. Vide T. redondo.
- COMPRIDO** — *Solanum lycopersicum* L. var *pyriformis* Poir. Vid Tomate.
- DE PRINCEZA** — Gilé.
- PERA** — Tomate comprido.
- REDONDO** — *Solanum lycopersicum* L. var *cerasiformis*. Vid Tomate.
- TOMBA** — Purga de caboclo e os Taiuiás, sps congêneres.
- TOPETE DE CARDIAL** — Borla de bispo.
- TOPINAMBO, TOPINAMBÁ, TOPINAMBOR** — *Helianthus tuberosus* L. Composta do tipo do Girasol. Excelente forragem, com tuberas úteis à alimentação dos animais.
- BATATA** — Topinambo.
- TOQUELHA** — Bombonaça.
- TORA** — Mata pasto (C. tora).
- TORANJA** — *Citrus grandis* Osb. Rutácia arboreta, do mesmo tipo das sps congêneres — Laranjeiras — com volumosos hispérídos — o maior dos frs cítricos, o que lhe valeu ser *Citrus maxima* Ber. Há vars, consoante a forma, volume e a coloração da polpa.
- MELANCIA** — Toranja. Var de polpa encarnada.
- TOREM, TORIM** — Umbauma (Indistintamente).
- TORTULHO** — Orelha de pau.
- TOTO MOLE** — Cega olho.
- TOUCA** — Castanha do Pará.
- TOUCA, TOUCADO DE VIUVA** — Capela de viuva.
- DO DIABO** — Milhomens (Indistintamente).
- TRABOEIRABA** — Marianinha.
- TRACOÁ, TRACOAM** — Cipó imbé.
- TRACOEIRABA, TRACOERABA** — Marianinha.
- TRANCA PORTEIRA** — Rompe galhão e algumas sps armadas.
- TRAPIÁ** — Tapiá.
- TRAPOEIRABA, TRAPOEIRAVA** — Marianinha.
- AQU** — *Rhoeo discolor* Hanc. Commelinácia erbácia, formando touceiras. Fos rijas e carnosas, purpúreas dorsalmente; fls albas dentro de espatas. Ornamental e peitoral.
- AZUL** — Marianinha (Erva miliona).
- COMUM** — Marianinha.
- RANA** — Marianinha.
- ROXA** — Viuvinha (*Z. pendula*).
- VERDADEIRA** — Marianinha.
- TRAPUCA** — Jatai (Indistintamente).
- TREME-TREME** — *Calliandra dasyntha* Bent. Leguminosa arbustiva. Penifólio; fls em glomérulos; fr vagem.
- TRES CORAÇÕES** — Azeda, Azedinha. Impreciso por se ajustar aos Trevos.
- FOLHAS** — Laranjeira do mato.
- FOLHAS BRANCAS** — Laranjeira do mato.
- FOLHAS VERMELHAS** — Laranjeira do mato. Injustificável, as fos são verdes.
- MARIAS** — Nictanginácia do Ge Bougainvilles. Geralmente semi escondentes e armadas. Há sps rústicas e as ornamentais recomendadas pelas suas brácteas coloridas e aderentes às fls, dispostas em grandes cachos: B. alba; B. arborea, sp erecta, de fls encarnadas, que esmaescendo tomam outros matizes até a cor de palha; B. coccinea; B. glabra, de brácteas sulfúricas e muito generalizada; B. pomacea Chois; B. spectabilis Willd. a mais vistosa dentre todas pelas brácteas sanguíneas.
- TREVINHO DO CAMPO** — *Meibomia trifolia* DC. Leguminosa minúscula, com trifólios, fls axilares e frs vagens. Carrapicho beijo de boi e outras sps do grupo dos Carrapichos, donde a imprecisão do apelido.
- TREVO** — Designação especialmente de certas Leguminosas e Oxaláciás,

- erbácia e com trifólios. Exemplo: *Trifolium polymorphum*. Leguminosa com trifólios cordiformes, no extremo de longa raque.
- AQUATICO — *Menyanthes trifoliata* L. Gencianácia vivaz e rizomatosa, trifólios alternos, de longa raque; fls albas e pilosas. Amurgotônico, emético, febrífugo e purgativo.
- AZEDO — Azeda e Azedinha.
- DE AGUA — Azedinha (*O. barrelieri*).
- DE CABRA — Trevo aquático.
- DE CASTOR — Trevo aquático.
- DO CAMPO — Carrapicho beijo de boi.
- DO CHARCO — Trevo de agua.
- DO JAPÃO — *Lespedeza striata*. Leguminosa erbácia e ornamental. Trifólios radicantes do longo pecíolo corado; fls azuis, também de longo pedúnculo.
- DOS PANTANOS — Trevo de aguas.
- INDIANO — Lágrimas de Nossa Senhora.
- TRIAGO** — Milhomens, especialmente a *A. cymbifera*.
- TRIDACIO** — Alfase.
- TRIFOLIO** — Alfava do norte.
- TRIGO** — *Triticum sativum* L. Gramínea universalmente cultivada, apresentando muitas vars. Sua exploração na Bahia tem sido feita com proveito.
- ADLAI — Lágrimas de Nossa Senhora.
- BRANCO — Trigo.
- COMUM — Trigo.
- CULTIVADO — Trigo.
- DA ESPANHA — Milho.
- DA INDIA — Milho.
- DA TURQUIA — Milho.
- DIAMANTE — Lágrimas de Nossa Senhora.
- DO INVERNO — Trigo.
- DOS TRÓPICOS — Lágrimas de Nossa Senhora.
- GRAMA — Grama comum.
- INGLÉS — Trigo.
- NACIONAL — Lágrimas de Nossa Senhora.
- RASTEIRO — Grama comum.
- REPTANTE — Grama comum.
- TENRO — Trigo.
- TRIPA DE GALINHA** — Caracol e Cipó tripa de galinha.
- TROMBETA** — Sps de Solanáceas do Ge *Datura*, arbóreas ou arbustivas. Fos lobadas; fls singularizando-se pelas enormes corolas em cartuchos; fr capsular. Vid Estramônio, que apresenta idênticas propriedades. Serve de exemplo a *Datura suaveolens* H. e B.
- ARBÓREA — Trombeta branca.
- BRANCA — *Datura arborea* L. ou talvez a var alba da *D. suaveolens*. Solanácia de grandes corolas alvas, em forma de corneta, envolvida parcialmente por longo cálice verdesco. Fr capsular espiniforme.
- CHEIROSA — Trombeta (*D. suaveolens*).
- DE JUIZ — Trombeta roxa.
- DO JUIZO FINAL — Trombeta roxa.
- TROMBETAO** — Trombeta roxa. Impreciso pois a var branca encontra-se nas mesmas condições.
- ROXO — Trombeta roxa.
- TROMBETA PEQUENA** — Trombeta roxa. Improprio pois o apelido cabe ao Zabumba.
- ROXA — *Datura fastuosa* L. Solanácia com os caracteres da Trombeta, arbustiva e de longas corolas roxas. De onde ser aceita como a var festuosa da *D. suaveolens*.
- TRUCUAS** — Cipó imbé.
- TUBEROSA** — Angélica dos jardins.
- TUCÁ** — Castanha do Pará.
- TUCAGÉ** — Carne de vaca e Pau concha.
- TUCARI** — Castanha do Pará.
- TUCI** — Castanha do Pará.
- TUCUM** — *Bactris setosa* M. e B. *acanthocarpa* M. Palmáceas de médio porte e armadas. Longas fos pinadas; fls em espigas e fr drupáceo, conhecido por "Mané velho" e comível. As fos dão boa e resistente fibra, de muita aplicação em redes de pescaaria. Tem o mesmo apelido outras Palmáceas do Ge *Acrocaryum* — *A. campestris* M. e o Cumari.
- BRAVO — Cumari.
- TUCUMA** — *Tuecum* (Indistintamente).
- TUCUMAN** — *Tucum* (Indistintamente).
- TUCUM BRAVO** — *Tucum* (B. setosa).
- DE CAÇADOR — Piassaba.
- DO AMAZONAS — Cumari.
- DO BREJO — *Tucum* (B. setosa).
- PIRANGA — Cumari.
- RASTEIRO — Piassava (Injustificável).

TUGURA — Tinhorão.

TÓIA — *Thuya orientalis* L. Fl. ou *T. pyramidalis*. Pinácia do grupo dos Ciprestes. Fos escamosos; fls unisexuadas; fr pinha seca. Sp ornamental, excelente madeira de lei. Vld Cipreste.

TUIJUBA, TULJURA — Tatajiba.

TUIUÍA QUIABO — Taiuiá de quia-
bo.

TUIUIU — Taiuiá.

TUJA — Tóia.

TULIPA DA ÁFRICA — Epatódia.

—DO CABO — Coroa de Moçam-
bique.

—DO CAMPO — Coroa de Moçam-
bique. Impróprio, pois a sp é cul-
tivada.

TUNA — Palmatória sem espinho.

TUNG, TUNGUE — *Aleurites fordii* Hems. Euforbiácia arbórea. Latí-
fólios lobados; fls unisexuadas; fr drupácia, cuja semente dá óleo su-
cedâneo da Oiticica. Cultivado ex-
perimentalmente na Bahia.

TUPEIÇABA, TUPIÇABA — Vas-
sourinha mofina e algumas Sidas
(Gc de Malváceas).

TUPINAMBOR — Topinambo.

TUPITICHA, TUPIXAVA — Vassou-
rinha mofina.

TURANJA — Toranja.

TURARÉ — Tingui (Indistintamen-
te).

TURBANTE — Gerimu.

TURCO — Rosa da Turquia.

TUREROQUE — Borragem brava
(Crista de galo).

TURIRI — Borragem bravâ (Crista
de galo).

TURNÉPO — Couve nabo.

TURQUIA — Rosa da Turquia.

TURUBÁ — *Lucuma chrysophillei*-
des. Sapotácia arbórea, com fos
ovalares, fls axilares e fr bacácia.

TURUMAN — Ipê.

TURURU-APÉ — Cipó cururú.

TUSSILAGEM — Lingua de vaca
(*T. patens*).

U

UABATIMÓ — Barbatimão.

UABATINGA — Ivitinga.

UACAU — Babaçu.

UACIMA — Guaxima (Indistintamente).

—**DA PRAIA** — Algodão da praia.

—**DO BREJO** — Algodão do brejo.

—**ROXA** — Guaxima (Indistintamente).

—**UAFÉ** — Cansanção de espinho (U. sub peltata).

UAIANDI — Landim.

UAISSIMA, UAICIMA — Guaxima (Indistintamente).

UAJARÁ — Buranhem.

UAJURU — Ariu.

UALANDI — Landim.

UAMBÉ — Cipó imbé.

UANA — Carnaça.

UANACU — Acafroa.

UANTA — Conduru.

UAPÉ — Baroneza, Aguapé.

UAPIUM AÇU — Gameleira (Lombrigueira).

UAPOIM AÇU — Gameleira (Branea e Lombrigueira).

UARANA — Guaraná.

UARIUBA, UARIUVA — Tatajiba.

UARUMÁ — Aruman.

UASSACU — Assacu.

UASSAJ — Assai (Indistintamente).

UASSATONGA — São Gonçalinho.

UUAÇU — Babaçu (Indistintamente).

UBÁ — *Gynerium parviflorum* Nees. Gramínea arbustiva, de longas folhas ensiformes e fls em abundantes paniculas. Rica em celulose e ornamental. A Cana frecha, a C. de macaco e outras, têm o mesmo apelido.

—**AÇU** — Pau percira (Despropositado).

UBACABA — Bacaba.

UBACAIA — Cana de macaco (*C. spicatus*).

UBACORI — Bacuri.

UBAETÉ — Pau d'álho.

UBAIA — Pitanga e Uvalha. Mais ajustada à cesta.

UBAREMA — Angelim côco.

UBATÁ, UBATAN, UBATAO —

Aderno e Gonçalo Alves.

UBATINGA — Ivitinga.

UBIPITANGA — Pitanga (Indistintamente).

UBIRACICA — Almécega.

UBIRAEM — Buranhem.

UBIRAJETA — Pau ferro.

UBIRAGARA — Barriguda.

UBIRARANA — Barauna e Brauna.

UBIRAREMA — Pau d'álho.

UBIRAUNA — Barauna e Brauna.

UBIXUMA — Mutamba.

UCAUBA — Bicuiba.

UCHIRANA — Angelim uquirana.

UCUUBA — Bicuiba.

UISSARA — Assat.

UITÍ — Oiti (Indistintamente).

ULÉ — Caúcho.

UMARI — Humari.

UMBARU — Papoula de São Francisco e Diamba.

UMBABA — *Cecropia peltata* V., C. Palmata Willd. Morácia silvestre, de escassa ramificação. Fos palmitilobadas, fls em espigas. Cau fistuloso servindo para palitos e pôlvora. Da mesma Fa e outros Ges, há algumas sps; vid Matauba e Tararanga. Registe-se ainda a *Cecropia carbonaria*, também muito encontração.

—**BRANCA** — Umbauba (*C. peltata*).

—**BRAVA** — Umbauba (*C. peltata*).

—**DE CHEIRO** — Tararanga.

—**DE VINHO** — Tararanga.

—**MANSA** — Tararanga.

—**PURUMA** — Tararanga (Indistintamente).

—**VERMELHA** — Umbauba (*C. peltata*).

UMBIGO DE TAINHA — Pimenta de cheiro.

UMBÚ, UMBUZEIRO — *Spondia purpurea* L. Anacardiácia frondosa, semper virens e xerófita. Ras com tuberas ricas de agua; frs, drupas, apreciadas como refrigerantes e peço sabor acre-doce. O cau dá farinha comível, nos tempos de seca. Apesar disso, o sertanejo o

- combure para ter o "sabão de coada".
- BRAVO — Ameixa da Bahia.
- CAJA — Cajá umbú.
- UMBURANA — Imburana, especialmente a L. de espinho.
- UMBURAPUANA Manacá.
- UNACU — Açafrôa.
- UNHA DE ANTA — Chichá.
- DE ASNO — Unha de boi e Cipó escada.
- DE BOI — *Bauhinia monandra* Kurz., B. *fornicata* Link. Leguminosa arbórea; ornamental pelas belas fls, com a semeiança das de Orquídeas. Fos simples e bilobadas. Também na Bahia existe a *B. cuiabensis*, com fos de lobos acuminados e fls de corolas lineares. Tem ainda o mesmo apelido o Cipó escada.
- DE GATO — *Acacia paniculata* Willd. Leguminosa arboreta. Cau tortuoso, com espinhos curvos. Penífilo do 1º grau; fls amarelas. Tem o mesmo apelido, o Cipó de gato.
- DE VACA — Unha de boi (Indistintamente).
- DE VACA BRANCA — Unha de boi (Indistintamente).
- DE VEADO — Unha de boi (Indistintamente).
- UPEUNA — Ipê (Indistintamente).
- URANDI — Landim.
- URANIA — Árvore dos viajantes.
- SOBERBA — Árvore dos viajantes.
- URAREMA — Angelim côco.
- URAUNA — Jacarandá negro.
- UREGÃO — Gervão.
- URGEVÃO, URGIBÃO — Gervão.
- URICANA — Urucurana.
- URICURI — Nicuri.
- URINÁRIA — *Zornia diaphylla* Pers. Leguminosa erbácia, ereta e inculta. Bifólios ou tetrafólios; fls amarelas; vagens articuladas, do tipo dos Carrapichos. Dentre as vars dessa boa forragem, destaca-se a latifolia, das mais encontradiças.
- URINDEUVA — Aderno.
- URIKI — Crulli.
- URIUNDEUVA — Aderno.
- URIUNDUBA — Aroeira (Indistintamente).
- URTIGA — Designação de sps urêntes da Fa das Urticáceas, também conhecidas por Cansanção. Urtiga urens L. Erbácia de cau piloso e

- fos com pelos urentes. Piles mucosa Lind. Também Urticácia, erbácia, de cau ramoso e carnoso; fos espalhadas assimétricas; fr capsular.
- BRANCA — Urtiga, Cansanção de espinho e Ramie.
- BRAVA — Cansanção de espinho e Cipó de fogo. Impreciso por encher a muitas sps urentes.
- CANSANÇAO — Cansanção, especialmente o de leite.
- DA MIUDA — Urtiga (U. urens).
- DE CIPÓ — Cipó tripa de galinha.
- DE MAMÃO — Cansanção de leite.
- DO REINO — Urtiga (U. urens).
- FOGO — Urtiga (U. urens).
- GRANDE — Cansanção de espinho.
- MANSA — Assa peixe (B. caudata).
- URTIGÃO — Cansanção de espinho.
- URTIGA PICANTE — Cansanção e Urtiga e outras sps congêneres, picantes ou urentes.
- QUEIMADEIRA — Cipó tripa de galinha.
- TAMIARANA — Cipó tripa de galinha.
- VERMELHA — Cansanção de espinho.
- URTIGUINHA — Urtiga (U. urens).
- DE CIPÓ — *Tragia volubilis* L. Euforbiácia trepadeira. Fos pilosas; fls unisexuadas e fr capsular. Pêlos urentes e picantes; diurética e sudorífica. Algumas vars.
- URUBAMBA — Titara (*D. macrocaanthus*).
- URUBÚ CAA — Milhomens (Indistintamente).
- URUCAQUE — Alcaçuz.
- URUCU, URUCUM — Açafrôa.
- URUCUBA — Bicuiba.
- URUCÚ BRAVO — Açafrôa.
- URUCUCA — Canela santa e Pau de tucano.
- URUCUF — Açafrôa.
- URUCURANA — *Croton urucurana* Baill. Euforbiácia arbórea. Fos pilosas; cápsula trilocular, com sementes purgativas e vermisfugas. Lenho para obras externas. O apelido estende-se a sps afins e outras, como o Garapicú e a Açafrôa.
- URUCURI — Castanha do Pará e, especialmente, o Nicuri.
- URUCUUBA, URUCUVVA — Açafrôa e Bicuiba.
- URUGUEIRA — Açafrôa.

URUMBEBA — Jurubeba. Impre-
cisão porque também é dado às Pal-
mátorias (Cactáceas).

URUNCUM — Açafrôa.

URUNDEUVA — Aroeira (Indistin-
tamente).

URUPÉ — Orelha de pau.

— **PIRANGA**, ou **PIRONGA** — Ora-
lha de pau vermelha.

URURICURI, **URURUCURI** — Ni-
curi.

URUBÚ — Açafrôa.

USUB — Açafrôa.

UTUABA, **UTUAMBA** — Bilreiro.

UTUAMBÉ — Bilreiro.

UTUAUBA — Bilreiro.

UUCUUBA — Bicuiba.

UVA (Videira) — Parreira.

— **BRAVA** — Baga da praia, Cipó de
fogo e Cortina dos pobres. Impre-
ciso portanto.

— **CRESPA** — Groseilha.

UVACUPARI — Bacupari.

UVA DA AMÉRICA — Tintureira.

— **DE GENTIO** — Parreira brava.

— **DO CAMPO** — Vitex campestris
Bak. Vitácia sarmentosa. Frs co-

mfveis. Também o Camapu.

— **DO CANADÁ** — Tintureira.

— **DO CÃO** — Maria preta (Vitex).

— **DO MATO** — Baga da praia e
Parreira brava.

— **DO RIO APÁ** — Parreira brava.

— **DOS TINTUREIROS** — Tintureira.

— **DOS TRÓPICOS** — Tintureira.

— **ESPINHOSA** — Groseilha.

UVAIA, **UVALHA**, **UVAEIRA**, **UVA-
LHEIRA** — Eugenia campestre V.
Mirtácia arboreta, robusta e ramo-
sa. Fis albas e solitárias; bagas
édules, áureas e acíduas. Possue
vars.

— **DO CAMPO** — Araçú mirim, sp;
congêneres e o Pitombo, donde a
imprecisão do apelido.

— **DOCE** — Uvaia.

UVA PURA DO CAMPO — Pau
terra.

— **SECA** — Parreira brava.

— **SILVESTRE** — Baga da praia.

UVATINGA — Ivitinga.

UZAIDELA — Mastruço (*C. ambro-
siodes*).

V

VACAPARI, VACOPARI — Macu-pari.

VACUÁ — Pandano.

VACUM — Fruta de pomba.

VALARAI — Cairuçú.

VAQUETA — *Combretum anfractuosum* M. Combretácia arbustiva de fós ovalares, fls insuladas e sámaras.

VARA DE FOGUETE — Coaré bravo.

WAREQUE — Algodão (Indistintamente).

VARÉTA — Alho do mato e Batatinha do campo (*C. herbettii*).

VASSATONGA, VASSATUNGA — São Gonçalinho e Verbasco.

VASSOURA — Algumas Malváceas do Gé Sida e também determinadas Escrofuláceas e Rubiáceas. No tocante às Malváceas, são elas também denominadas Malvas e Vassourinhas.

--**DA FLOR AMARELA** — *Sida ulmifolia* M. Vassoura do tipo da V. de relógio, com fós elípticas, fls maiores e solitárias. Apelido impreciso, pois algumas Sidas se encontram no mesmo caso.

--**DE BOTÃO** — Carqueja.

--**DE FERRO** — *Eupatorium dendroides* Spreng. Composta arbustiva e frondosa. Fls em capítulos, formando rácimos. Eupéptica e tóxica. Apresenta a var *xylophyloides*, de fós lineares.

--**DE FORNO** — Maricotinha.

--**DE RELÓGIO** — *Sida romboifolia* L. Malvácia erbácia e inculta. Fls amarelas e axilares; fr cápsula com pieantes. Tida por febrífuga e hemostática. Tem o mesmo apelido estas Rubiáceas: *Borreria verticillata* Meyer e *Amarantus acaber* L. Vid Ipeca e Ipecacoanha.

--**DE VARRER** — Vassourinha mosfina e outras sps de menor importância.

--**MINEIRA** — Paco-paco.

VASSOURÃO — Jacatirão e certas Malváceas do Gé Sida.

VASSOURINHA — Vid Verbasco.

--**ALEGRE** — Vassourinha mosfina.

--**BRANCA** — Vassourinha mosfina.

--**D'AGUA** — *Conobea aquatica* Aubl. Escrofulácea erbácia de fós opostas.

--**DE BOTÃO** — Vassoura de relógio (*B. verticillata*) e menos propriamente o Gervão.

--**DE NOSSA SENHORA** — Vassourinha mosfina.

--**DE RELÓGIO** — Vassoura de relógio (Indistintamente).

--**DE VARRER** — Vassourinha mosfina.

--**DE VARRER CASA** — Vassourinha mosfina.

--**DO BREJO** — *Conobea scoparioides* Bent. Escrofulácea erbácia, tida como anti berberíaca.

--**DO CAMPO** — Vassoura de relógio (Indistintamente).

--**DOCE** — Vassourinha mosfina.

--**MOFINA** — *Scoparia dulcis* L. Escrofulácea erbácia e urzeira. Fós serrilhadas; fls axilares e fr capsular cañeróide. Peitoral, febrífuga e emoliente.

VATINGA — Ivitinha.

VAZA MATERIA — *Kiejmeyera excelsa* Camb. Guttifera arbórea e inculta. Fós coriúcias e lancioladas; fls em bicas paniculas; fr cápsula lenhosas, volumosa e trilocular, com nementes aladas. Dá abundante lútex amarelo, tido como cicatrizante.

VELA DA PUREZA — Árvore da pureza e algumas Amarilidáceas, mormente a *Agave americana* L. Sp acaule, com longas fós rijas e radicantes no centro das quais alonga-se uma fuste floral, de muitos metros, dando bolinhos. Tem o mesmo apelido a Árvore da pureza.

VELAME — *Croton campestre* SH. Euforbiácea arbórea. Fós pilosas e lancioladas; fls em espigas e fr capsular pequenissimo. Tido como depurativo e eupéptico. Inúmeras são as sps congêneres, do mesmo tipo, que merecem o mesmo nome vulgar. Este ainda é conferido a

certas Apocináceas, Convulvuláceas e Solanáceas.

--**AMARELO** — Velame (Croton).
--**DE CHEIRO** — Curralcira (*C. antisifiticus*).

--**DE ESPIGA** — *Croton pseudo-popolus*. Euforbiácia do mesmo tipo do Velame (Croton).

--**DO CAMPO** — Velame (Croton).
—ou **VELAMINHO DO MATO** — Bucho de boi.

--**VERDADEIRO** — Velame (Croton).

VELÓSIA — Caneia de ema.

VELUDINHA, VELUDINHO — Guettarda uruguaiensis C. e Schl. Rubiácia arboreta, com fos opostas, fia em cimeiras e fr drupácia.

VELUDO — Muitas sps de Amarantáceas dos gêns *Amaranthus* e *Celosia*. Geralmente erbáceas ou subarbustos, são muito ornamentais, devido a suas curiosas inflorescências em espigas, escamasas e de várias cores. Impropiamente tem o mesmo apelido o Carvão de ferreiro.

--**BRANCO** — *Celosia argentea* L. Amarantácea notável pelas suas inflorescências erectas, abundantes e de brilho argénteo.

--**CAUDA DE RAPOSA** — Cauda de raposa.

--**CRISTA DE GALO** — Crista de gallo (*C. cristata*).

--**DE PENCA** — Cauda de raposa.

--**GRANDE E PONTUDO** — *Amaranthus speciosus* Sims. Amarantácea, que se distingue pelo desenvolvimento de suas inflorescências. Vid. Veludo.

--**VERMELHO** — *Amaranthus cruentus* L. Amarantácea adornativa, de vistosas inflorescências sanguíneas.

VERBASCO — Tingui e Timbó.

--**DO BRASIL** — *Buddleia brasiliensis* Jacq. Loganiácia arbustiva e ictiófaga, como os Tinguis. Fos abarcantes, fia campanuladas e fr capsular. Córtez amargo; fos e fia bêquicas, emolientes e sudoríferas.

VERBENA — *Verbena chamaedryfolia* Juss. Verbenácia erbácia dos jardins. Fig em umbelas, variando de coloração, consoante as varas e híbridos. Estes são tidos como falsos, pois a verdadeira é a *V. officinalis* L.

--**CIDRADA** — Cedron.

--**DOS JARDINS** — Vid Verbena.

--**FALSA** — Gerbão e Verbena.

--**HIBRIDA** — Vid Verbena.

--**MELINDRE** — Verbena.

--**ODORIFICA** — Cedron.

--**OFICINAL** — Gervão e mais propriamente a *Verbena officinalis*.

VERBERA — Gervão.

VERGA DE ANTA — Bucho de boi.

VERGAMOTA — *Mentha arvensis*.

Labiada erbácia e cultivada pelo aroma de suas fos; fos ovalares finamente serrilhadas e opostas. Algumas Rutáceas, como a Lima de umbigo, têm esse apelido e o de Bergamota.

VERGONHA — Sensitiva.

VERÓNICA — Capim cheiroso.

VETIVER — Capim cheiroso.

VIDEIRA — Parreira.

--**DE NOÉ** — Parreira.

--**SELVAGEM** — Parreira brava.

VILÃO — Pajau.

VINAGREIRA — Rosela. Na Bahia, ha preferência pelo primeiro apelido.

--**DO CAMPO** — Algodão do brejo.

VINCA — Boa noite e boa tarde.

--**PERVINCA** — Boa noite e Boa tarde.

VINHA — Parreira.

--**DE NOÉ** — Parreira.

VINHÁTICO — *Enterolobium ellipticum* Bth. Leguminosa altissima, fornecendo madeira para carpintaria e marcenaria. Ha sps afins com o mesmo apelido.

--**AMARELO** — *Echiopspurum balzazari* F All. Leguminosa do mesmo tipo do Vinhático.

--**DE ESPINHO** — *Pithecellobium tortum* M. Leguminosa de cau armado e do mesmo tipo do Vinhático.

--**DO CAMPO** — *Plathymenia foliosa* Bth. Leguminosa do mesmo tipo do Vinhático.

--**TESTA DE BOI** — Vinhático amarelado.

VINHEIRO DO CAMPO — Pau de tucano (*V. tucanorum* e *V. thyrsoides*).

VIOLA — Violeta.

VIOLETA — *Viola odorata* L. Violácia erbácia e cultivada. Fis roxas e odorantes, empregadas em perfumarias; ras eméticas e purgativas. A sp confunde-se com a

Amor perfeito e simboliza a modestia.
—CHEIROSA — Violeta.
—D'AGUA — Baroneza.
—DAS TRES CORES — Amor perfeito.
—DE MARÇO — Violeta.
—DE PETRÓPOLIS — Angelona hirta Scham. Escrofulácia arbustiva e ornamental.
—DO CAMPO — Feijão miúdo.
—TRICOLOR — Amor perfeito.
—VOMITIVA — Ipecacoanha (*Jonidium ipec.*) e spa congêneres.
VIOLETE — Pau roxo.
VIRARU — Gingeira.
VIROTE — *Quararibea turbinata* Pois. Bombácia.
—MIRIM — *Quararibea penduliflora*. Bombácia.
VISGUEIRO — *Parkia pendula* Bth. Leguminosa de grande desenvolvi-

mento. Penífólio do 2º grau; vagens grandes e onduladas. Dá matéria gomosa e adstringente. Tem o mesmo apelido, a Erva de passarinho.

VIUVA — Saudades.

VIUVINHA - Zebrina pendula Schm. Comelinácia erbácia e cultivada. Ramos péndulos; flos zebróides, de dorso roxo. Estimado diurético. Tem o mesmo apelido a Capela de viúva.

VIVAM — Sensitiva.

VUARAME — Sacarolha.

VULCANA ou **VOLCANA** — Clerodendron fragrans Ait. Verbenácia arbustiva e espontânea. Latifólios deltoides; fls albas em cachos umbeliformes, de perfume mais intenso durante a noite.

VULNERÁRIA DAS GUIANAS — Capitiú.

X

XALAPA — Batata de purga.
XANXIM, XAVIM — Samambaias-açu.
XAXIM, XAXUM — Samambaias-açu.
XILÓ — Algodão (Indistintamente).
XIMBIUVA — Tamboril.
XIMBÓ — Jacarandá (Indistintamente) e Tamboril.
XIMRUVA — Tamboril.
XINANE — Chique-Chique (Casca-vel).

XIQUE-XIQUE — Chique-Chique (Indistintamente).
— DO SERTÃO — Palmatória.
XIRIUBA, XIRIUBEIRA — Cipó chumbo (*C. umbellata*).
XIVANTE — Crisântemo.
XIXÁ — Chichá.
XUMBI — Cambará (Indistintamente).
XUQUIRI — Sensitiva.
XUXÚ — Chuchú.

Z

ZABELÊ — Capim milham branco.

ZABUCAL — Sapucáia.

ZABUMBA — Trombeta branca. É uma var dessa sp, sub arbustiva e de f/s menores.

—BRANCA — Trombeta branca.

—ROXA — Trombeta roxa.

ZABURRO — Milho (*Fartura*).

ZANZO — Vassoura de relógio.

ZAPUCAIA — Sapucáia (Indistintamente).

ZARZA — Salsa da praia.

ZEBRINA — Espada de ogum.


ZINA, ZINIA — Ciumes de velha.

ZOABA — Erva de São Martinho.

ZOMBI — Banana de São Tomé.

SEGUNDA PARTE

AS ESPÉCIES PELOS NOMES CIENTÍFICOS



A

ABBEVILEA KLOTSCHEANA — Guabiroba.

ABRUS PRECATORIUS — Jequiriti,* Jefinco, Jeriquiti, Jiquiriti, Juquiriti, Abogeru, Alcaçuz da América, A. Indiano, A. silvestre, Assacu mirim, Arvoeiro, Benito,* Bimbrito, Carolina miuda, Ervilha da América, E. de Pater noster, Fruta de conta, Gequiriti, Guequiri, Guequiri, Liana alcatez, Mulungú mitim, Olho de cabra, O. de pombo,* Pater noster, Tento da América, T. pequeno, Tentos, T. dos mudos.

ABUTILON PAUCIFLORA — Malva branca, Guaxuma branca.

ABUTUA RUFESCENS — Parreira brava,* P. branca, P. do mato, P. silvestre, Palani, Pani, Abutua, A. da terra, A. legítima, A. preta, Batata brava, B. de búti,* Búti, Butua, Cipó de cobra, Erva de Nossa Senhora.

ACACIA FARNESIANA — Esponjela, Esponja, Acácia, Aroma, Aromas, Aromo, Árvore de macaco, Caronha, Coronacris, Coronha, Espinilho, Flor de macaco, Mimoso, Nanduva, Tabaco da Índia.

JUREMA — Jurema,* J. preta, Jereum, Gerema, Gorema.

MARTII — Espinheiro bravo.

PANICULATA — Unha de gato,* Ancinho, Cadorna, Calumbi, Malícia dos homens.

PIAUJENSIS — Jurema branca.

ACALYPHA CAMMUNIS — Tapa buraco.*

HISPIDA — Rabo de macaco, Crista de Peru.

GODSEFFIANA — Rabo de gato.

GODSEFFIANA var **MARGINATA** — Acalifa,* Rabo de gato.

POIRETII — Chorão.

WILKESIANA — Acalifa,* A. dos jardins, Crista de Peru, Rabo de gato.

(*) os asteriscos assinalam os nomes populares mais usados, especialmente na Bahia.

—WILKESIANA var **ILLUSTRIS** — Acalifa.* Crista de Peru.

ACANTHOSPERMUM HISPIDUM — Carrapicho rasteiro,* C. da praia, C. de carneiro, Amor de negro, Poejo da praia.

—XANTHIOIDES — Juiz de paz,* Carrapicho cabeça chata, C. rasteiro, Empata carreira, Espinho cabeça de boi, Mata pasto, Sete dores.

ACHRAS SAPOTA — Sapoti,* Népero, Ovo vegetal, Pero, Sapote, Sapotilha, Sapotizeiro.

—SAPOTA var **SPHAERICA** — Sapota, Sapoteiro.

ACHYRANTES FICOIDEA — Periquito, Corrente, Perpétua do mato.

ACHYROCLINE SATUREOIDES — Macela,* Marcela.

ACICARPA SPATULATA — Carrapicho da praia, Espinho de roseta.

ACROCOMIA INTUMESCENS — Macauba,* Côco de catarro, Palmera barriguda e os mesmos apelidos da sp seguinte.

—SCLEROCARPA — Macauba,* Macaiba,* Macajá, Macaju, Macajuba, Macoiba, Mocaiuba, Mocajá, Mocajubá, Mocauba, Mucaina, Mucajá, Mucujá, Bocaiba, Bocaíuba, Bocauba, Côco de catalá, C. de catarro,* C. de espinho, Imbocála.

ACROSTICUM DANAEOFOLIUM — Feto arborecente.

ACTINOSTEMUM LANCEOLATUS — Canele de veado.

ADENOCALYMMMA GOMMOSUM — Cipó branco.

ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS — Avencéa,* A. comum, A. do Canadá, A. miuda, Adianto, Cabelo de Vénus,* Capilaria, C. de Montpellier.

—CUNEATUM — Avencéa,* A. da fo miuda, Adianto.

—FOVEATUM — Samambáia açú,* Camambáia, Feto arborecente, Xanvím, Xavim, Xaxim, Xaxum.

—LUNATUM — Avencéa,* Adianto.

—RHYSOPHYTUM — Avencéa, A. da Bahia.*

—TENERUM — Avencéa, A. de bicho.

AECHMEA BROMAELIEFOLIA —

Gravatá branco,* Abacaxi de tingir, A. de tinta amarela.

—NUDICARLIS — Gravatá de pedra. **AEGIPHILA SALUTARIS** — Contra cobras.

AESCHYNOCHLEA BRASILIENSIS —

Lentilha do campo.

—FALCATA — Carrapicho,* Carapicho, Alfavaca rasteira do campo, Sensitiva mansa.

—FILOSA — Corticeira do campo.

—HISPIDULA — Carrapicho,* Carapicho.

—SENSITIVA — Corticeira do campo, Corticeira, Cortiça do campo, Paricá, Paricazinho.

—VISCIDULA — Carrapicho.*

AGAPANTHUS UMBELLATUS —

Agapanto.

AGAVE AMERICANA — Vela, da purça,* Abecedária do México, Agáve, Agave, A. do México, Áloe dos cem anos, Baioneta, Cabuiá, Meti, Pita.

—AMERICANA var SISALANA — Sisal,* S. mexicano, Agave, Câñamo americano.

—FOURCROYA — Henequem.*

—VIVIFERA — Gravatá açu.*

AGERATUM CONYZOIDES — Menstrasto,* Agerato, Camará apeba, Catinga de barrão, C. de bode, Curia, Erva de São João, João, Macela de São João, M. francesa.

AGLAIA ODORATA — Agláia,* Murta do campo.

ACONANDRA BRASILIENSIS — Pau d'alho.**AIOUEA BRASILIENSIS** — Amajouva.

ALBIZZIA MOLUCANA — Albisila,* Acácia asiática, A. australiana.

ALEURITES CORDATA — Nogueira.

—FORDII — Tung,* Tungue,* Nogueira, N. tung.

—MOLUCANA — Nogueira,* N. americana, N. brasileira, N. da Índia, N. da praia, N. de Bancoul, N. do Brasil, N. do Iguape, N. do litoral, Noz das Molucas, N. de Bancoul, Crotón das Molucas, Pinhão das Molucas.

—MONTANA — Nogueira.*

ALLAMANDA BLANCHETII — Alamanda de Jacobina.

—CATHARTICA — Quatro patacas,* Q. patacas amarelas, Alamanda da fl grande, Comandaré, Dedal de

dama, Purga de quatro patacas, Santa Maria.

—NORILIS — Flor de S. o João,* Fl amarela, Acapociba, Alamanda, Ca-jado de São José, Orélia, Rosa do campo.

—OENOTHERIFOLIA — Alamanda.

—PUBERULA — Alamanda.

—SCHOTII — Flor de São João, Acapociba, Alamanda.

ALLIUM AESCALONICUM — Cebo-la branca,* Cebolete, Cebolinha branca,* Chalota das cozinhas.

—CEPA — Cebola,* C. comum,* C. hortense.

—FISTULOSUM — Cebolinha,* Ce-bola de todo ano.

—PORRUM — Alho poró,* A. grosso da Espanha, A. macho, A. poaro, A. porrão, A. porro,* A. porru.

—SATIVUM — Alho, A. ordinário.

—SCORODOPRASUM — Alho gros-so da Espanha,* A. espanhol, A. grande, A. mourisco, A. rocambole.

ALOCASIA LOWII — Alocásia.

—METALICA — Alocásia, Inhame roxo.

—ZEBRINA — Alocásia.

ALOE VERA — Babosa,* Aloe, Aloes, Azcre, Erva azedra, E. azebra, E. babosa, Lenho áloe.

ALSOMITRA BRASILIENSIS — Ci-pó de boi.*

ALSOPHYLLA ASPERA — Samambáia açu, Samambáia, Feto arbo-recente, Rabo de búlio, Xanxim, Xavim, Xaxim, Xaxum.

—EXCELSA — Samambáia açu e os outros apelidos da sp precedente.

—MICRODONTE — Samambáia açu e os outros apelidos da primeira sp do mesmo Ge citada.

ALTERNANTHERA FICOIDEA — Perpétua do mato.

—PILOSA — Espumeira.

ALTHEA OFFICINALIS — Altea.* Rosamarina.

ALYSSUM MARITIMUM — Alice, Açafrate de prata.

AMANJOUA GUIANENSIS — Mar-melada brava, Pau de cáibro.

AMANOA GLAUCOPHYLLA — Ma-moninha, Mamoninho.

AMARANTHUS BLITUM — Bredo, B. macho, B. malabar, B. rabaca, B. verdadeiro, Bledo, Fl de amor, Fl de ciúme.

- CAUDATUS — Cauda de raposa,* Amaranto cauda de raposa, Chorão dos jardins, Disciplina de freira, D. de religiosa, Monco do Peru, Rabo de cotia, R. de onça, R. de raposa, Veludo cauda de raposa, V. de penca.
- CRUENTUS — Veludo vermelho,* Bredo vermelho,* Carurú vermelho, Chorão, Chorona, Crista de galo chorona, Fl de ciumes.
- DEFLEXUS — Carurú.*
- GANGETICUS — Crista de galo,* Bredo roxo.
- GANGETICUS var MELANCOLICUS — Crista de galo, Carurú da mata, C. do mato, Bredo imperial.
- GRACILIS — Bredo grande,* B. de espiga, B. de porco,* B. graudo, Marianinha vermelha.
- MAJOR — Bredo grande,* Carurú de espiga.
- RETROFLEXUS — Carurú.
- SPECIOSUS — Veludo grande e pontudo,* Amaranto gigantesco, A. monstro, A. piramidal.
- SPINOSUS — Bredo de Santo Antonio, B. de espinho, B. do Chile, B. vermelho, Jequirioba.
- TRISTIS — Carurú.
- VIRIDES — Bredo,* B. carurú, B. do Peru, B. verdadeiro, Bledo, Amaranto verde, Carirú, Carurú, C. da Bahia,* C. de soldado, C. mirim, C. miúdo, C. verde, Fl de amor, Fl de ciumes.
- AMARYLLIS BELLADONA** — Cebola cecém,* C. barrão, C. brava, C. cencém, C. do mato, Açucena d'água, Fl de janeiro.
- CANDIDA — Carapitáia, Açucena do rio, Cebola luana.
- AMBROSIA ARTEMISAEFOLIA** — Ambrosia americana, Carprimeira, Cravo da roça, Cravorana.
- HUMILIS — Artemigem da praia,* Absinto marítimo, Artemigem marítima.
- AMPHILOPHIUM VAUTHERI** — Cipó d'água.
- ANACARDIUM GIGANTEUM** — Caju açu,* Acaju açu, Airú, Mairú.
- HUMILE — Cajui,* Caju branco, Cajueiro do campo, C. rasteiro, Cajull, Cajum, Caju mirim, Cajurana, Acaju mirim.
- OCCIDENTALE — Caju*, Caju manso, Cajueiro, C. manso, Casca

- anti diabética, Acaiuiba, Acajuiba, Acaju, Acajuba, Fruta de macaco, Oacaju, Salaparrilha dos pobres.
- OCCIDENTALE var GIGANTEUM — Caju açu,* C. banana,* C. da mata, C. da praia.
- OCCIDENTALE var NANUM — Cajurano anão, Cajurana.
- ANANASSA SATIVA** — Ananás,* A. manso, Naná.
- SATIVA var BRACTEATA — Ananás do mato,* A. vermelho do mato, Curauá.
- SATIVA var PIRAMIDALIS — Abacaxi,* A. manso.
- SATIVA var PIRAMIDALIS-ALBA — Abacaxi,* A. branco.
- SATIVA var PIRAMIDALIS-AUREA — Abacaxi,* A. amarelo.
- SATIVA var SINE CORUNA — Ananás pelado,* A. de rede, A. prolífico, A. sem coroa, Abacaxi açu, Carangueijo, Chupa-chupa,* C. mel,* Coriango, Gravatá de rede, G. de rolo, Naná de raposa.
- ANCHIETEA SALUTARIS** — Cipó suma,* C. carneiro, C. paraguáio, C. trindade, Cura tombo, Paraguáia, Pereiruar, Pitagáia, Piraguái, Piriguara, Piriguara, Purumara, Suma, S. branca.
- ANDIRA ANTHELMINTICA** — Angelim amargo,* A. amargo, A. da fo grande, A. do campo, A. macho, A. preto, A. vermelho, Andira, A. iba, A. uchi, Andura, Aracai, Araçuf, Aracuim, Avinheira, Cumacurana, Moregueira.
- ARAROBA — Araroba,* Andira, A. uchi, Andura, Angelim amarelo, A. araroba, Aracti, Araroba amarela, Cumacurana, Pô da Bahia, P. de Goa.
- EXCELSA — Angelim da fo larga,* A. da fo grande, A. preto, Arielina, Moregueira, Pau de morginho.
- FRAXINIFOLIA — Angelim doce,* A. araroba, A. do mato, Jorgelim, Mata baratas, Pau de mamona do mato, Pinhão do mato.
- FRAXINIFOLIA var ROSEA — Angelim cor de rosa,* A. rosa.
- NITIDA — Rajadeira, Jorgelim.
- PISONIS — Angelim penima,* A. pintado, Jorgeim.
- RETUSA — Angelim uquirana, Uchirana.
- STIPULACEA — Angelim cêdo,*

- A. de côco, Mata baratas, Pau de morcego, P. moreego, P. pintado, Urarema.
- STIPULACEA var BAHIENSIS — Angelim côco.*
- ANDROPOGON BICORNIS** — Capim peba,* C. peiba, C. de bezerro, C. mole, C. puba, C. rabo de burro, C. vassoura, C. vassoura verdadeira, Rabo de burro, Sucapé.
- BICORNIS var GENUINA — Capim peba,* C. vassoura, C. vassoura, C. vassoura verdadeira, Capupuna.
- CONDENSATUS — Capim rabo de burro,* C. rabo de boi, C. barba de bode, C. de zorro, chichilaca, Cola de zorro, Rabo de zorro, R. de guarachaim, R. de raposa.
- HALEPENSIS — Capim maçarambá,* C. maçambará,* C. aveia, C. cevada, C. da Guiné, C. de Cuba, C. de Johnson, C. do Egito, C. mexicano, Arroz bravo, Maçambará, M. do Piauí, Milho bravo, Sorgo,* S. brasileiro, S. de Alepo.
- NARDUS — Capim de cheiro,* Junça, Ra de cheiro.
- NUTANS — Capim maçarambá mirim,* Massambari.
- RIEDELLII — Capim barbado.*
- RUFUS — Capim jaraguá.*
- SCHOENANTHUS — Capim limão,* C. cidreira, C. cidrilho, C. siri, Incenso de caboclo.
- VIRGINICUS — Capim membeca,* Membeca.
- ANEMOPAEGMA ARVENSIS** — Catuaba,* Catuiba.
- GLAUCUM — Catuaba,* Catuiba.
- HILARIANUM — Cipó cruz.
- MIRANTUM — Catuaba,* Caatalba, Caatuba, Catuiba, Fo boa, Marapuama, Pau de resposta,* Planta boa, Piratanga, Tataba.
- ANGELICA ARCHANGELICA** — Angélica hortense,* A. de Boêmia, Ra do Espírito Santo.
- ANGELONIA BLANCHETTI** — Angelónia.*
- HIRTA — Violeta de Petrópolis.
- ANIBA CANELILLA** — Casca preciosa,* C. do Maranhão, Amapaima, Pereiroá, Periroá.
- ANISOSPERMA PASSIFLORA** — Fruto amargoso,* Fava de Santo Inácio do Brasil, Andiroba,* Castanha de bugre, C. de jatobá, C. milneira, Chipotá, Cipó de jatobá, Ci-

- podó, Cipotá, Guapeba, Jabotá verdeiro, Japotá, Maracujá do perquito, Nandiroba.
- ANONA CHERIMOLIA** — Graveola,* Grabiola, Graviola,* G. do norte, Anona de espinho mole, A. doce, A. do Chile, A. grande, Ata de lima,* Beribá, Chirimólia, Coração de rainha, Fruta do Peru, Guanabano, Jaca do Pará, Jerimoia, Jérimoia, Querimólia.
- CORIACIA — Cabeça de negro, Marmolinho.
- CORNIFOLIA — Araticum do campo, A. mirim.
- CRASSIFLORA — Araticum cortiça,* A. da praia, A. de boia,* A. jangada, Cabeça de negro, Cortiça, Marioia, Mululo.
- FOETIDA — Araticum catinga.*
- GLABRA — Araticum do brejo,* A. cacá, A. cagão, A. da lagoa, A. do mangue, A. passa, Araticurana, Birba, Jaca da Índia, J. de pobre, Panan, Raticum.
- MARCGRAVII — Araticum ponhê,* A. paca, A. panâ, A. panan.
- MURICATA — Graveola* e os mesmos apelidos da Anona cherimolia.
- PALUSTRE — Araticum do brejo,* Pinha do brejo, Raticum.
- PISONIS — Araticum apé.
- RETICULATA — Fruta de conde.* Araticum manso, A. pente, Condesa,* Coração de boi, Fruta da condessa, Miiloí, Miolo.
- SERICIA — Beribá,* Araticum Pará.
- SPINESCENS — Araticum de espinho,* A. da beira do rio, A. do rio, A. do sertão.
- SQUAMOSA — Pinha,* P. da Bahia, Araticum cheiroso, Araticupitais, Araticutitaja, Ata, Atl, Pinheira.
- ZSALZMANNII — Araticum bravo, A. liso, A. dos lisos.
- ANTHEMIS NOBILIS** — Camomila romana.*
- NOBILIS var AUREA — Camomila, C. romana, Macela galega.
- ANTHEPHORA HERMAPHRODITA** — Capim mimoso do Ceará.*
- ANTHURIUM BELLUM** — Antúrio.*
- CRASSINERVIUM — Antúrio, Babosa do mato.
- LANCIOLATUM — Antúrio.
- RADICANS — Antúrio.
- SCANDENS — Antúrio.

ANTIGONUM LEPTOPUS — Mimo do céu,* Amores agarrados, A. agarradinhas, A. entrelaçadas, Antígona, Beijos, Clematite, Corália, Entrada de bálie, Georgina, Parreira de jardim, Rosália, Trepadeira cor de rosa.

ANTIRRHINUM MAJOR — Boca de leão,* B. de bezerra, B. de lobo, Epidendro.

APEIBA TIBOURBOU — Pau de jangada,* Escova de macaco, Jangada, J. branca, Jangadeira, Pau de balsa, P. fôfo, P. que boia.

APIUM GRAVEOLENS — Áipo,* A. d'água, A. do Rio Grande, A. de Montividéu, A. odorante, A. dos pântanos, A. tronchudo, Áipo, Céleri, Salsa dos pântanos.

APODANTHERA SMILACIFOLIA — Azougue dos pobres, Chá de boubas, Cipó santo, Ra Santa, Remédio de gálico.

APULEA FERREA — Pau ferro.

PRAECOX — Grapeapunha,* G. branca, Grapiapunha, Garupa amarela, Garapeapunha, Gema de ovo, Gramiamunha, Guarapiraca, Guarapí, Ibira pérê, Jataí amarelo, Mulata, Mulateira.

ARACHIS HYPOGEA — Amendoi,* A. comum, A. verdadeiro, Amendobi, Amendui,* Amendoiom*, Araquida, Gingibá, Irré, Mandobi, Mundubí*, Maní, Manobi, Mendobi, Mendoin, Mendiú, Mundubi,* Tamactara.

PROSTATA — Amendoiom rasteiro, A. do Maranhão, A. rajado, A. roxo.

ARALIA RACEMOSA — Salsaparilha branca,* S. dos pobres.

ARAUCARIA BRASILIANA — Pinho ou Pinheiro do Paraná,* Araucária do Paraná, Curi, Ibá, Pinheiro branco, P. do Brasil, P. nacional, P. vermelho, Pinho do Brasil.

EXCELSA — Araucária.

ARCTICUM LAPPA — Bardana,* B. menor, Erva dos tinhosos, Labaça, Orelha gigante.

MINUS — Carrapicho grande, Bar-dana.

ARGEMONE MEXICANA — Cardo santo,* C. santo da América, C. Amarelo, C. do México, C. mariano,* C. Santa Maria, Erva de cardo, E. de cardo amarelo, Papoula de espinho, P. do México, P. espinhosa.

ARIKURYROBA CAPANEMA - Ari-curiroba.*

ARISTIDES PALLE — Capim barba de bode,* Barba de bode,* Capim de bode.

SETIFOLIA — Capim panasco.*

ARISTOLOCHIA ALLEMANII — Milhomens,* Ambuaembo, Angelicó, Aristolóquia milhomens, Bom parto, Cassau, Cipó mata cobra, Jarrinha,* Jarrinho, Mata porco, Melombe, Placenta de mulher, Touca do diabo.

BIROSTRIS — Capivara,* Jarrinha.*

BRASILIENSIS — Milhomens,* Anhangaputurú, Capa homem, Cipó do diabo, C. milhomens, Coifa do diabo, Galinho do campo, Jarra, J. capacete, Jarina, Jarrinha,* Mata porco, Melombe, Papo de perú, Ra de José Domingues, Raja, Triago, Urubú caá.

CYMBIFERA — Milhomens,* Cassau, Jarrinho* e os apelidos da sp. congênere precedente.

ERIANTHA — Milhomens,* Cassau, Jarrinha*.

GIGANTEA — Milhomens,* Cassau, Jarrinha,* Papo de gallo, P. de peru,* Patinho e alguns outros apelidos da A. brasiliensis.

PUBESCENS — Milhomens,* Cassau, Jarrinha*.

TRILOBATA — Milhomens,* Calunga, Cassau, Contra erva, bastarda, Jarrinha.*

ARRABIDAEA AGNUS-CASTUS — Cipó de rego,* C. camarão, C. d'álio, C. de tres quinas, Bengala de camarão.

CHICA — Carajurú,* Chica, Coapiranga, Guajurú, Guarajá piranga, Guarajuru piranga.

ARTEMISIA ABSINTHIUM — Losna,* L. de Diocórides, L. maior, L. ordinária, Absíntio, Absinto, A. maior, A. vulgar, Acinto, Aluina, Erva dos vermes, Grande absinto, Sintro.

SCOPARIA — Artemisia,* Aurora dos campos.

VULGARIS — Artemige,* Artemigem,* A. do campo, A. selvagem, A. verdadeira, Artemija, Aurora dos campos.

ARTHOCARPUS INCISA — Fruta pão,* F. do pão, Árvore do pão, Rima,

- INCISA var SEMINIFERA — Fruta pão.* F. pão de massa, F. pão com sementes. Tipolo.
- INTEGRIFOLIA — Juca,* J. da Bahia,* Jaqueira.*
- ARUNDINELLA BRASILIENSIS** — Capim machinde, Machiné.*
- ARUNDO DONAX** — Taquara,* T. do reino, T. ubá. Taquari,* Taquarecú, Cana de Espanha, C. de Provence, C. do reino, C. do reno, Caniço, Pixiricucú.
- ASCLEPIA CURASSAVICA** — Cega olho,* Cachem, Camarásinho de campina, Camará branco, C. bravo, Capitão de sala,* Cavaleiro de sala, Chibante, Algodão-sinho do campo, Asclépia, Dona Joana, Erva de palha, E. de rato caseira, Fl de sapo, Ipeca brava, I. das Antilhas, Mané mole, Mata olho, Oficial, G. de sala,* O. de gabinete, Paine de sapo, P. oficial de sala, Saudade da campina, S. do campo.
- MELLODORA — Cega olho.
- UMBELLATA — Cega olho.
- ASPARAGUS PLUMOSUS** — Bambu chinês,* B. japonês, B. verde. Espargo de jardim, E. plumoso, Melindre,* M. trepador.
- VERTICILATUS — Melindre,* Cabelo de moça.
- ASPIDOSPERMA CAMPORUM** — Peroba,* P. dos campos, João Correia.
- EBURNEUM — Pau setim* (cetim), Pequiá branco, P. cetim, P. marfim, Peroba amarela.
- ILLUSTRE — Quina de Camamu,* Q. Pereira, Guatambu, G. rosa, G. vermejho, Peroba de Santa Catarina, Tambu.
- POLYNEURON — Peroba,* P. açú, P. amarela, P. de São Paulo, P. dos campos, P. mirim, P. miuda, P. rosa, Amargoso, João Correia, Pau caboclo, Sobre.
- TOMENTOSA — João Correia.
- ASPILIA FOLIATA** — Margarida do Japão,* Mal-me-quer.
- ASPLENIUM ABCISSUM** — Douradinha.
- AURITUM — Douradinha.
- RADICANS — Douradinha.
- ASTER ALPINUS** — Sorriso de Maria,* S. da Virgem,* Sonho da virgem, Batissônia.
- SINENSIS — Margarida,* Bela Margarida,* Formosa Margarida, Mãe de família.
- ASTROCARIUM AYRI — Brejauva,* Brejauba, Bruiauva, Aíri,* Caco brejauva, C. de aíri, C. de aíri verde, Gerau, Irí, Irú.
- CAMPESTRIS — Tocum,* Tucum.*
- VULGARE — Cumari,* Curua, Aíara, Tucum,* T. bravo, T. do Amazonas, T. piranga, Tucuma.
- ASTRONIUM COMMUNE** — Aderno,* A. verdadeiro, Aderne, Aroeira do sertão, Chibatan,* Gibatão, Juruira, Jibatão, Jubatan, Jubatão, Ubatan, Ubatão, Urindeuva, Urundeuva.
- CONCINUM — Aderno preto.*
- FRAXINIFOLIUM var BRASILIENSIS — Gonçalo Alves,* Chibatan, Chibatão, Aroeira jesuira, Bataão, Gateado, Gejuira, Gibatão, Gomavel, Gonçalheiro, Guarabu batata, Guaratan moenda, Guaratá, Gurubo, Gurubú, Guzabu preto, Muiracatiara, Pau da rainha, P. Gonçalo, P. rainha, P. zebra, Ubatã, Ubatão.
- GRAVEOLENS — Gonçalo Alves.
- SPECIOSUS — Aderno vermelho.*
- ATTALEA ACAULIS** — Piaçava,* Piassava.*
- BORGESIANA — Vid spa seguites, pois têm os mesmos apeïdios.
- COMPTA — Pindoba,* Pindá, Pindafusa, Pindó, Pindova, Pau de embira, Caco de pindoba, Imbocai.
- CONCENTRISTA — Andaria.*
- FUNIFERA — Piaçava,* P. da Bahia,* P. Rasteira, Piassaba, Pau piassava, Piaça, Japeraçava, Tucum de caçador, T. rasteiro.
- HUMILIS — Indáia,* Anajá mirim,* Náia, Pindoba das matas, Pindova.
- OLEIFERA — Catolé,* Caco catolé, C. de pindoba, Anajá mirim, Palmeira catolé, Palmeira, Palmito amargoso.
- PIASSABUSSU — Piaçabuçu.*
- PINDOBASSU — Pindobaçu.*
- AURICULARIA AURICULA-JUDAÉ** — Ore'ha de Judas.*
- AUXEMMA ONCOCALYS** — Pau branco.*
- AVERRHOA BILIMBI** — Biribiri,* Bill-bili, Bilimbi, Bilimbino, Carambola amarela.
- CARAMBOLA — Carambola,* Camerunga.
- AVICENIA NITIDA** — Mangue hranco,* Mangorá, Árvore do caranguejo, Cereiba,* Cereibuna, Cereitinga,

Guapirú, Pau de carangueijo, Perê,
Serutinga, Siriba, Sereiba,* Siriuba,
Siriuva, Tapibuia.

AXONOPUS BARBATUS — Capim
cabeludo.*

--**PULCHER** — Espinha de peixe,*
Capim espinha do peixe.
--**SCOPARIUS** — Capim Venezuela,*
C. colombiano, C. de teso, Pasto im-
perial.

B

- BACCARIS ARTICULATA** — Carqueja doce,* C. ordinária, Carquejinha.
- CALVESCENS** — Alecrim do mato,* Carqueja.
- GENISTELLOIDES** — Carqueja,* C. amarga, C. do mato, Casália amarga, Condamina, Bacanta, Baccárida, Quina de condamina, Tiririça de babado, Vassoura de botão.
- LUNDII** — Carqueja, Bacanta, Baccárida.
- ROTUNDIFOLIA** — Carqueja.
- TENUIFOLIA** — Carqueja.
- PACOBA AQUATICA** — Bacopá.*
- BACTRIS ACANTOCARPA** — Tucum,* Tecum, Tecuma.
- MARAJA** — Maraiá, Marajá,* Marajaiha.
- SETOSA** — Tucum,* T. bravo, T. do brejo, Tecum, Tecuma, Tocom, Toicum, Tucuma, Tucuman, Majaraiha, Mané velho.*
- BALFOURODENDRUM RIEDELLIUM** — Pau marfim,* P. de tanho, Pequiá marfim, P. tanho, Grã-mixinga, Guratáia, Marfim.
- BAMBUSA ARUNDINACIA** — Bambu,* B. comum, B. da Índia, B. verdadeiro, Cana de bambu.
- MITIS** — Bambu chinês,* B. Bengal.
- VULGARIS** — Bambu,* B. verdadeiro.
- BANISTERIA EGLANDULOSA** — Cipó de São João,* Belas.
- BARBACENA FLAVA** — Canela de ema,* Ema.
- PURPUREA** — Canela de ema.*
- BARBOSA PSEUDOCOCUS** — Côco amargoso,* C. verde, Gariroba,* Guariroba, Palha branca, Pererema.
- BASANACANTHA SPINOSA** — Limão do mato,* Limoeiro bravo, L. do mato, Limão-rana, Fruta de jacaré, Jasmim do mato, Papa terra, Pau cruzeiro.
- SPINOSA** var **POLYANTHA** — Limão do mato,* Fruta de cachorro.
- BASELLA ALBA** — Bertalha branca,* Bretalha.*
- RUBRA** — Bertalha,* Bahiana, Bretalha.
- BATOCYDIA UNGUIS** — Cipó do gato,* C. de moreego, Erva de São Domingos.*
- BAUHINIA CUIABENSIS** — Unha de boi.*
- FORNICATA** — Unha de boi,* Cipó unha de boi.
- LANGSDORFFIANA** — Cipó escada,* C. escada de macaco, Escada de macaco, Mororó cipó, Unha de asno, U. de boi.
- LANGSDORFFIANA** var **BAHIENSIS** — Cipó escada.*
- MONANDRA** — Unha de boi,* U. de asno, U. de vaca, U. de vaca branca, U. de veado, Miroró, Mororó, Pata de boi, P. de vaca, Pé de boi.
- PULCHELLA** — Cipó florão.*
- RUBGINOSA** — Escada de jaboticati.*
- SPLENDENS** — Cipó escada,* C. escada de macaco, C. mororó, C. unha de boi, C. unha de gato, Linda-gua de boi.
- BEGONIA ACIDA** — Erva azeda,* E. de saracuru, E. saracura, Azeda do brejo, A. dos ourives, Saracura.
- BAHIENSIS** — Azedinha da Bahia,* A. do brejo, Azeda de tres fios, Aleluia.
- BIDENTATA** — Azeda de Ilhéus,* Erva de sapo.
- NECLETA** — Coração de estudante.
- REX** — Begônia,* B. real,* Coração de estudante.
- SANGUINEA** — Begônia sanguinea,* B. sangue, Coração de estudante, Erva de sapo vermelha.
- SCHUMBERIANA** — Coração de estudante.
- BELLIS PERENNIS** — Margaridinha,* M. rasteira, Margarita, Bela Margarida, Bonina dos campos, Estrela, Mal-me-quer branco.
- BERNARDINIA FLUMINENSIS** — Mata cachorro.*
- BERTHOLLETIA EXCELSA** — Castanha do Pará,* C. do Brasil, C. do Maranhão, C. verdadeira, Amendoeira,

ra da América, Eras, Inia, Juiratucá, Juiá, Nha, Nia, Noz do Brasil, Tocari, Tucari, Tuci, Urucuri.
BETA VULGARIS — Beterraba,* Betarraba, Betarrava, Acelga vermelha.

—**VULGARIS** var **ALBA** — Acelga,* Acelga branca, A. campestre, Acéllica, Beterraba branca, B. campestre, Celga.*

—**VULGARIS** var **HORTENSIS** — Beterraba.

BIDENS BIPINNATUS — Carrapicho de aguilha,* C. branco, C. de duas pontas, Coambu, Cosmos, Cuambi, Cuambu, Erva picão, Espinho de aguilha, Goambu, Guambu, Macela do campo, Picão da praia, P. do campo, P. preto, Pico-pico, Piolho de padre.

BILBERGIA MARMORATA — Gravatá.

—**PIRAMIDALIS** — Gravatá.

—**ZEBRINA** — Gravatá.

BIXA ORELLANA — Açafrão,* A. da Bahia, A. do Brasil, A. indígena, Açafrão bastardo, Achioite, Anoto, Armoto, Arnoté, Atolé, Bixa, Bixé, Detique, Olerana, Orucú, Rucú, Uanacu, Urucú, U. bravo, Urucuba, Urueul, Urucum, Urucurana, Urucuba, Urugueira, Ururú, Usub.

BLANCHETIA HETEROTRICHIA — Erva pré,* E. poca.

BLECHNUM BRASILIENSIS — Escada do céu.* Feto arbórescente, Samambája do brejo.

BLIGHIA SAPIDA — Castanha da África.*

BOEHMERIA CAUDATA — Assa peixe,* Urtiga mansa.

—**NIVEA** — Rami,* Ramia, Canganço branco, C. verde, Cânhamo da China, Urtiga branca.

BOERHAVIA DIFFUSA — Ipeca,* Ra do Brasil.

—**HURSUTA** — Erva tostão,* E. de tostão, Agarra pinto, Amarra pinto, Mela pinto, Pega-pega, Pega pinto, Ra de tangaracá, Sanamundo, Solidónia, Sucuruina, Tangaracá.

—**PANICULATA** — Barrigudinho,* Erva tostão.

BOLETUS SANGUINEUS — Oreilha de pau vermelha*, Pirona, Urupé piranga, U. pironga.

BOMBAREA EDULIS — Cebola cêm.*

—**SALSILLOIDES** — Cará de caboclo,* Jaranganha.

BOMBAX AFFINIS — Castanha do Pará,* Mamorana pequena.

—**MUNGUBA** — Munguba, Monguba, Embiriti.

—**PENTAPHYLLUM** — Imbiruçu, Imbiraguá, Imbiricá, Umburucú, Paineira de embiruçu.

—**PUBESCENS** — Imbiruçu e os mesmos apelidos da sp precedente.

BORASSUS FLABELLIFORMIS — Borasso, Côco do Pará, Dendê da Costa, Palmira, Tala.

BORRERIA CAPITATA — Ipecacoanha.

—**POAYA** — Canela de judeu, Poala do cerrado.

—**VERTICILATA** — Ipecacoanha, I. ondulada, Alcaçuz da terra, A. de Minas, A. do cerrado, Chá inglês, Erva do chá, E. do meio dia, Ipeca rasteira, I. relógio, Malva preta, M. relógio, M. relógio grande, Poala comprida, P. rasteira, P. rosário, Relógio, R. de palma, R. de vaqueiro, Vassoura de relógio, Vassourinha de relógio, V. de botão, V. do campo, Zanzo.

BOUCHEA LAETEVIREUS — Gervão.*

—**PSEUDO-GERVÃO** — Gervão falso.*

BOUGANVILLEA SPECTABILIS — Tres Marias,* Arranha gato, Buganvilea,* Ceboleiro, Cipó Santa-Na, Esporão de gallo, Fl de Santo Antônio, F. de Santana, Fataquinhá, Pau de roseta, Primavera, Rosa e Roseira do mato, Roseiro, Roseta, Santa Rita, Sempre lustrosa, Tapirica.

—vars **ALBA**, **ARBOREA**, **COCCINEA**, **GLABRA** e **POMACEA** — Tres Marias* e os mesmos apelidos da sp precedente.

BOUDICHIA VIRGILIOIDES — Sucupira,* S. açu, S. da praia, S. do campo, S. mirim, S. miuda, S. parda, S. preta, Sacupira, Sapipura, Sapupira, S. do campo, Sebapira, Sebipira, Sepupira, Sepapira, Sepépura, Sepipira, Sepipirauna, Sepopira, Sepupira, Acari, Choco-pires, Cutiuba, Fava de sucupira, Paracarana.

BRACHIARIA PLANTAGINA — Capim marmelada.*

BRASSICA CAPITATA — Repollo.*

—**CAPITATA** var **RUBRA** — Repollo roxo,* R. vermelho.

—**CAPITATA** var. **SAMBAUBA** — Repollo crespo.*

- NAPUS — Nabo,* N. branco, N. de comer, N. de Milão, N. redondo, Couve nabeira.
- NAPUS var RAPINIGERA — Nabiça.*
- OLERACEA — Couve,* C. folheada, C. das hortas, C. de cabra, C. verde singela. Brassica.
- OLERACEA var ARBUSTIVA — Couve de todo ano,* C. coqueiro, C. galega, C. mineira, C. palmeira. O. sergipana.
- OLERACEA var BOTRYTIS — Couve flor.*
- OLERACEA var CAPITATA — Repolho, R. branco, R. dinamarquês, R. doméstico, R. holandês, R. pontudo, Couve côco.
- OLERACEA var CRISPA — Couve crespa.*
- OLERACEA var GEMMIFERA — Couve de Bruxelas,* Repolho de Bruxelas.
- OLERACEA var GONGYLOIDES — Couve rabano,* C. de São, C. rabam, C. rabão.
- OLERACEA var NAPO-BRASSICA — Couve nabo,* C. caxeira, C. nabeira, Turnepo.
- OLERACEA var SUB-CAPITATA — Couve repolhuda,* C. de sabóia, C. repolho.
- OLERACEA var VIOLACEA — Couve lombarda.* C. de Milão ordinária, C. de Sabóia verde, C. repolho roxa, C. roxa, C. vermelha cabeça de negro, Couvinha.
- BROMELIA KARATAS** — Gravatá,* G. de gancho, G. de raposa, Garauatá, Garavatá, Guamará, Abacaxi bravo, Carauá, Caranata, Carauatá, Caravata, Cragoatá, Cravatá, Croá, Croatá, Curatá, Erva do gentio.
- LACINIOSA — Macambira,* Macambira, Massaembira.
- BROSIMUM CONDURU** — Conduru,* C. do Pará, C. vermelho, Amarraparana, Amoreira do mato, Conduru, Gongurú, Guarabu vermelho, Pau rainha.
- GAUDICHAUDII — Apé,* A. do sertão, Amoreira do mato, Araticum do mato, Conduri, Inharé, Mama

- de cadeia, Mamica de cachorra, M. de porca, Maminha de cadeia, M. de pores.
- PARAENSIS — Condurú,* C. de sangue, C. do Pará, Amapá doce, Muirapiranga.
- BRUNFELSIA HOPPEANA** — Manacá,* Manacan, Manajá, Mercúrio do pobre, M. vegetal, Cingaba, Gerataca, Guapurunga, Jaratacaca, Jeraticaca, Jasmim do Paraguai, J. manacá, Jerataca, Jeratacaca, Jera-tacaia, Jerotaca, Umburapuana.
- BRYOPHYLLUM PINNATUS** — Folha da Costa,* F. da fortuna, F. da vida, F. de pirarucú, F. grossa, Fortuna, Árvore da fortuna, Coirama, Courama, Diabinho, Erva da Costa, Milagre de São Joaquim,* Ore-lha de monge, Puarué, Roda da fortuna, Saião.
- TUBIFLORUM — Cacto japonês,* Fl. da Abissinia.
- BUCHNERA ROSEA** — Cangué,* C. preto.
- BUDDLEIA BRASILIENSIS** — Ver-basco do Brasil,* Calção de velho,* Calças de velha, Oassoma, Tingui da praia.
- BULBOSTYLIS CAPILLARIS** — Ale-crime da praia.*
- BUMELIA SARTORIUM** — Rompe gi-bão,* Quixaba,* Q. branca, Q. co-mum, Sacutiaba, Tranca portelra.
- SPECIOSA — Beijo de moça.
- BURSERA LEPTOPHLOCUS** — Imburana,* I. brava, I. de cambão,* I. de espinho, Imbereiro, Ambaura-na, Amburana, Ameixa silvestre, Cumaru da Bahia, Emburana, Jani-varana, Janivararaná, Umburana.
- BUXUS SEMPERVIRENS** — Buxo,* B. arborecente, B. grande.
- BYRSONINA SERICIA** — Murici,* M. da fo miuda, M. das capoeiras, M. penima, Mureci, Muriti, Muriuba, Murixi, Muruchi, Muruci, Mu-ruxi, Burici, Fruta de perdiz, Man-timento de pobre, Pau de curtir, P. de semana.
- SPICATA — Pau de curtume,* Mu-rici vermelho, Pessegueiro bravo.

C

- CABRALEA CANGERANA** — Can-
gerana,* C. açu, Cainrana, Cairana,
Cajá espúrea, Canarana, Canhara-
na, Canherana, Canjaraana, Cedro
cangerana, C. ná, Pau de santo,
P. santo.
- CACALIA QUADRIFLORA** — Cipó
de fígado,* C. icica, C. issica.
- CACONAPEA GRACILIOIDES** —
Alicrim do brejo,* A. do campo.
- CACTUS MELOCACTUS** — Cacto
nêlão,* Tatu.
- **TRIANGULARIS** — Cardo ananá,*
Mandacaru de tres quinas.*
- CAESALPINEA ACINACIFORMES**
— Carrancuda,* Caranguda.
- **BONDUCELLA** — Carniça,* Carni-
cúla, Arriozes, Inimbó, Juquirio-
mano,* Juquirirana, Lágrimas de
Santa Maria, Naná, Nimboi, Olho
de gato, Silva da praia, Uaná, Ue-
riomam.
- **BRACTEOSA** — Pau de rato.
- **ECHINATA** — Pau Brasi,* P. de
Pernambuco, P. rosado, Arabutan,
Araputã, Araputan,* Árvore do
Brasil, Brasil, Brasileto, Cuura-
quam, Ibirapitanga, Ibiripitanga,*
Imira, Itanga, Orobutan, Muirapi-
ranga.
- **FERREA** — Pau ferro,* P. ferro
branco, P. ferro do Ceará, Itú, Ju-
cá,* Jucaina, Muiraobi, Quimpurin-
ga, Ubiracta.
- **FERREA** var **GLABRESCENS** —
Pau ferro.*
- **FERREA** var **LEIOSTACHYA** —
Pau ferro.*
- **FERREA** var **PARVIFLORA** —
Pau ferro.*
- **FERREA** var **TYPICA** — Pau fer-
ro,* Pau de jucá, Ibira obi, Imira
ítá, Miraquitá, Moruré.
- **MICROPHYLLA** — Pau de rato,*
P. de porco, P. de sapateiro, Ca-
tinga de porco, Catingueira, Ca-
tingueiro, C. da fo miuda, Erva
de rato, Tinta de sapateiro, Pata-
quinha.
- **PELTOPHOROIDES** — Sebipiru-
na,* Sibipiruna,* Sepipiruna, Pau
Brasi amarelo.
- **PULCHERRIMA** — Barba de ba-
rata,* Brio de estudante, Árvore da
ave do paraizo, Chagas de Jesus,
Fla ave do paraizo, F. de pavão,
F. do paraizo, Flamboiansinho,
Renda de ouro.
- **PYRAMIDALIS** — Pau de rato,*
P. de porco, Catinga de porco, C.
de rato, Maria preta.
- CAJANUS INDICUS** — Andu,* Co-
andu, Coendu, Ervilha da Índia, E.
de Angola, E. de árvore, E. de sete
anos, E. do Congo, Fava larga,
Guando,* Guandu,* Guandciro,
Goendu.
- CALADIUM BICOLOR** — Caládio,*
Ará, Papagaio, Pé de bezerro, Ta-
jás, Tajura, Tambataja, Tarro, Ti-
nhorão,* T. de lombriga, T. sara-
pintado.
- **PICTURATUM** — Tinhorão,* Tam-
borão, Tanhorão, Tugura, Pé de be-
zerro.
- **POECILE*** — Mangará branco.*
- **STRIATIPES** — Banana de brejo.*
- CALAMUS DRACO** — Sangue de
drago.*
- CALLIANDRA DASYNTHA** — Tre-
me-treme,* Cipó de caboclo.
- **CHAPADAE** — Borla de bispo,*
Quebra foice, Topete de cardial.
- **TWEEDIEI** — Borla de bispo,* Ca-
belo de anjo, Cabelinho da Jesus,
Caliandra dos jardins, Pelego de
velha, Quebra foice, Topete de car-
dial.
- **TWEEDIEI** var **SANCTI-PAULI**
— Pelego de velha,* Borla de
bispo.
- CALLISTEPHUS CHINENSIS** — Mar-
garida,* Mãe de família, Margarida
amarela, Rainha Margarida.*
- CALLOPHYLLUM BRASILIENSIS**
— Landim,* L. do brejo, L. jac-
aré, Landi, Lantim, Bálsmo a-
carioba, Goändi, Guanambi, G. car-
valho, G. cedro, G. de leite, G. lan-
dim, G. verme'ho, Guanandi, Guan-
antim, Gulande, Gulandi, Gulan-
dim, G. carvalho, Inglês, Iraírandi-
ra, Jacarciba, Jararioba, Jacuandi,
Olandi, O. carvalho, Olandim. Pau
de azeite, Pau de Maria, P. de San-
ta Maria, P. sândalo, Uaiandi, Ua-
landi, Urandi.

CAMBESSEDESIA UMBELICATA —

Carasco.*

CAMPANULA GLOMERULATA —

Campainha.*

MEDIUM — Chicara e pires,* Cam-

painha dos jardins.

CAMPOMANESIA RETICULATA —

Guabiroba.*

CAMPRIANDRA LAURIFOLIA —

Acapurana,* Acapu do Iguapó, Co-

mandaçu, Manaiara.

CANAVALIA ENSIFORMIS — Fei-

jho de porco,* F. de cabra, F. de

cavalo, F. de Windsor, F. espada,

F. holandês,* Fava branca.

CANNA ANGUSTIFOLIA — Alba-

rã.*

CANNABIS SATIVA — Djamba.*

Aliamba, Atchi, Birra alva, Cabelo

de negro, Câñhamo, C. da Índia,

C. verdadeiro, Dirijo, Durijo, Erva

da morte, E. do sonho, E. por ex-

celência, Fininha, Fumo de An-

gola, F. do mato, Líamba,* Maco-

nha,* Maragoa, Marajaira, Mari-

ana, Meconha, Moconho, Nadiamba,

Paim, Pango, Pixaim, Riamba, So-

rumá, Umbaru.

CANNA GLAUCA — Coquinho,* Ca-

té imbirí, Albará, Imbirí, Maracá,

Murá.

INDICA — Bananeirinha de jar-

dim,* B. da Índia, B. de fl., Bana-

neira da Índia, Batata de biri, B.

de embiri, Bengaleira, Beri, Biri,

Caeté dos jardins, Cana da Índia,*

Erva conteira, Patuaraña, Piri.

INDICA var. **COCCINEA** — Bana-

neirinha do mato, de cor vermelha.

CAPERONIA CASTANEIFOLIA —

Cantanhá do brejo.*

CAPPARIS ANGUSTIFOLIUS — Icô

preto,* Icô.

ICO — Icô,* I. branco,* Icô.**JACOBINAE** — Icô preto.***NECTAREA** — Girú,* G. limão.**CAPRARIA BIFLORA** — Chá pre-

to,* C. bravo, C. da América, C.

da Martinica, C. da terra, C. das

Antilhas, C. de Lima, C. de Mara-

já, C. do Maranhão, C. do México,

Balsaminha.

CAPSELLA BURSA-PASTORIS —

Bolsa de pastor.*

CAPSICUM ANNUUM — Pimentão,*

Pimenta da Guiné, P. grande, Fun-

do de lima, Guia-á-çú.

ANNUUM var. **CORDIFORMIS** —

Pimenta maçã* Pimentão.*

ANNUUM var. **LONGUM** — Pi-

mentão comprido.*

ANNUUM var. **TETRAGONUM** —

Pimentão doce.*

BACCATUM — Pimenta cumari,*

P. cumari verdadeira, P. cumarim,*

P. apuá, P. apuan, Pimentinha,

Comari, Comarim, Cumari, Que-

cimirim.

FRUTESCENS — Pimenta malas-

gueta,* P. da Terra, P. longa, P.

verde, Malagueta, Maria gorda,

Quia-qui, Quirija-apuá, Sabá.

LUTEUM — Pimentão miúdo.***ODORIFERUM** — Pimenta de

cheiro,* P. cereja, Olho de peixe,

Umbigo de tainha.*

OVATUM — Pimenta de cheiro.**UMBELICATUM** — Pimenta maçã,

Pimentão.

CARAIPA FASCICULATA — Cama-

çari,* C. da Bahia,* C. do carun-

cho, C. vermelho, Camassari,* Ta-

macoaré, Tamacoari, Tamacuacoari,

Tamanquarombo, Tamaquari.

CARAPA GUIANENSIS — Andiro-

ba,* A. aruba, A. saruba, Angiro-

ba, Carapá, Carapinha, Gendiroba,

Jandiroba,* Penaiba, Purga de San-

to Inácio.

CARDIOSPERMUM GRANDIFLO-**RUM** — Chumbinho,* Ensacadinha.**HALICACABUM** — Coração da Ín-

dia,* Cheque-cheque, Patuquinha,

Para tudo, Pan pauna.

INTEGERRIMUM — Balosinho.**CARICA DIGITATA** — Jacaratá,*

Jaracatiá.

MICROCARPA — Mamoeiro de

corda,* M. macho.

PAPAYA — Mamão,* Mamoeiro,*

M. de corda, M. macho, Amabapaia,

Árvore do mamão, A. dos meios,

Chamburé, Chamburi, Popá, Po-

pao.

PAPAYA var. **PIRIFORMIS** — Ma-

mão melão,* M. da Índia,* M. de

Caena, M. de Tonkim, M. do Chile,

M. príncipe.

CARINIANA BRASILIENSIS — Je-

quitibá rosa,* J. vermelho.

CARLUDOVICA CHELIDONURA —

Carludovica brasiliensis.

PALMATA — Bombonassa,* Bom-

bonaça,* Bombonacha, Bombeira,

Iracá, Jejijapa, Jepijapa, Jipijapa,

Lucativa, Toquilha.

CARPOTROCHE BAHIENSIS — Sa-

pucainha.

BRASILIENSIS — Sapucainha,*

Canudeira, Canudo de pita,* C. do

pito, Castanha de cotia, Comona, Cumana, Fruta de árvore, F. de babado, F. de comona, F. de cotia, F. de lepra,* F. de macaco, F. de paco, F. de sapucaína, Mata pio-lho, Papo de anjo, Pau de anjo, P. de cachimbo, P. de cotia, P. de lepra, P. de pito, Ruchuchú.

CARUM CALVI — Alcarávia,* Alquirfvia, Cominho arménio, C. dos prados, C. romano, Quirfvia.

CARYOCAR BARBINERVE — Pequi,* Pequiú, Pequij, Guatambá.

—**NUCIFERUM** — Pequiú,* Pequi, Petiá, Piqui, Piquiá,* Améndoá de espinho, A. do Peru, Náz de manteiga de Demerara, Souari, Surava.

—**VILLOSUM** — Pequi,* Ameixe do Peru, Grão de cavalo e os mesmos apelidos da sp precedente.

CARYOPHYLLUS AROMATICUS — Cravo da Índia,* Craveiro da Índia,* Cravo das Molucas, C. de cabecinha, C. de tempero, C. fétido, C. girofle, Girofle.

CARYOTA MITIS — Palmeira africana.*

—**URENS** — Palmeira africana,* Banda de sargento, Cariota, Coca-coça,* Quintul de Ceilão.

CASEARIA BRASILIENSIS — São Gonçalinho.*

—**GRANDIFLORA** — Cascaria.

—**GUINEENSIS** — Café do diabo, Porrete.

—**PARVIFOLIA** — Pitumba.*

—**SYLVESTRE** — São Gonçalinho,* Café do diabo, C. do mato, Cafzeiro bravo, Erva da pontada, E. de titú, Fo de carne, Fruta de snira, Lingua de lagarta, L. de teiú, L. de tiú, Marmelada vermelha, Marmelinho do campo, Pau de lagarta, P. de vradio, Petumba, Guaçatunga, Quaçatonga, Quaçatunga, Sarita, Vassatonga, Vassatunga, Uassatonga.

—**SYLVESTRE** — var **LINGUA** — São Gonçalinho

CASSIA ALATA — Mata pastão,* Mata, pasto, Café do mato,* Dartinal, Fedegoso grande, Mangerioba grande, Mangerona grande

—**BACCILARES** — Manduirana.

—**BICAPSULARES** — São João,* Caaqueira, C. fémea, Caquera, Can. João, Canudeiro, Canudo de cachimbo, C. de pito, Cariura, Carruiba, Caruiba, Mata pastinho, M. pasto, Pau de cachimbo, P. de pito.

—**BLANCHETTI** — Jatobá do campo.

—**FERRUGINEA** — Cana fistula.*

—**FISTULA** — Chuva de ouro,* Choco de ouro, Cana fistula, C. fistula amarela, C. fistula de São Tomé, Cássia fistula amarela, C. fistula imperial, C. fistula verdadeira, C. imperial, Amarelinho, Alelúia, Pinga de ouro, Tapira caiena, T. coana, T. coinana.

—**FLORIBUNDA** — Canudo de pito.*

—**GRANDIS** — Geneuna,* Gecuma, Jencuna,* Mali-mari, Maré-mari, Mari-mari,* M.-mari grande, M.-mari preto, M.-mari-rana, Marizel-ro, Sarro, Seruáia.

—**LEIANDRA** — Mari-mari, Seruáia.

—**MULTIJUGA** — Cana fistula,* Alelúia, Amarelinho, Copalba angelim, Faveirinha branca, Manduirana da fo mole, Pau amendoim, P. cachimbo, P. de favu.

—**OCCIDENTALIS** — Fedegoso,* F. de capoeira, F. legitimo,* F. veradeiro,* Feiticeira, Balambáia, Café negro, Cássia mansa, C. miuda, Crista de gallo fedorenta, C. de peru, Cajamarioba, Erva fedorenta, Fo de pagé, Ibixuma, Lava pratos, Mangerioba, Mamanguá, Pajamarioba, Pajomarioba, Paramarioba, Paterioba, Pau mangerioba, Sal do Brasil, Sene do campo, Taroreque, Tarerique, Tareroque, Tararucú.

—**ROTUNDIFOLIA** — Pasto rasteiro.*

—**RUGOSA** — Boi gordo,* Alcaçuz bravo, Amandueirana, Infalive), Manduirana do cerrado, Mendobi bravo, Ra de corvo, R. preta, Sene do campo, S. nacional.

—**SERICIA** — Mata pasto,* Fedegoso do Pará, Tararucú, Tareroque, Tora.

—**SIAMAEA** — Cássia paulista,* Quaresma.*

—**SILVESTRE** — Fedegoso do mato,* Cana fistula.

—**SPLENDIDA** — Amanduirana,* Alelúia, Bico de corvo, Manduirana.

—**SUPERBA** — Mari-mari, Mare-mari.

—**TORA** — Mata pasto,* Tora.

—**URSINOIDES** — Mimosa de vereda.*

—**VERRUCOSA** — Murici amarelo.*

CASTILLOA ULEI — Caucho,* Cancho, Ulé.

CASUARINA EQUISETIFOLIA — Casuarina,* C. cavalinho, Chorão,

Árvore da tristeza, Filão, Pinheiro do litoral.

CATTLEYA ACKLANDIAE, C. AMABILIS, C. BICOLOR, C. GRANULOSA, C. LABIATA, C. PURPURINA — Cattleias,* Orquídeas.*

CAVANILLESIA ARBOREA — Barriguda,* B. lisa, Barrigudo, Árvore da lâ, Castanha do Ceará, Embiratanga, Ubiragara.

CAYAPONIA ESPELINA — Purga de carijó,* P. de gentio, Disciplina, Espelina, E. verdadeira.

—**PILOSA** — Purga de caboclo,* P. de caipó, P. de gentio, Aborinha do mato, Ana pinta, Arserina, Caipó, Capitão do campo, C. do mato, Carijó, Espelina, Tomba.

CECROPIA CARBONARIA — Umbauba,* Ambauba, Ambauba.

—**PALMATA** — Umbauba,* Bauaçu, Embauba, Embauva, Gargauva, Imbauba,* I. verdadeira,* Imbaiva, Lá vegetal, Pau de preguiça, P. trombeta, Torem, Torim.

—**PELTATA** — Umbauba,* Árvore da preguiça, A. de trombetas, Bauba, Paraparaíba, Umbauba branca, U. brava, U. vermelha e os mesmos apelidos das duas ssp presentes.

—**SCIODAPHYLLA** — Matauba,* Sanbacuim.*

CEDRELA FISSILIS — Cedro bata- ta,* C. amarelo, C. branco, C. da Babia, C. da várzea, C. da Caran- gola, C. do Rio, C. rosa, C. verme- lho, Acaju catinga.

—**ODORATA** — Cedro cheiroso,* C. branco, C. fêmea.

CEIBA PENTANDRA — Sumauma,* S. da terra firme, S. da várzea, S. de macaco, Sumaumeira, Barriguda, Capoc, Ciiba, Kapok, Mãe das ár- vores.

—**PURIFLORA** — Barriguda de espi- nho.*

CELOSIA ARGENTEA — Veludo branco,* Amaranto branco.

—**BRASILIENSIS** — Crista de ga- lo,* Beijo de palmas, Borragem, B. brava.

—**CRISTATA** — Crista de galão,* Rei- jo de pa'mas, Bredo de namorado, Pluma de príncipe, Veludo crista de galão.

—**PYRAMIDALIS** — Pluma de príncipe.*

CELTIS BRASILIENSIS — Corindi- ba,* Coatindiba, Corendiva,* Corin-

diuba, Corindiuba, Corubá, Cotin- diba, Curuba.

CENCHRUS ECHINATUS — Capim roseta,* Carrapicho da praia, C. das roças, C. de carneiro,* Erinho de roseta, Roseta.

—**ECHINATUS** var **TRIBULOIDES** — Capim roseta.

—**VIRIDES** — Capim roseta

CENTRANTHUS INTERMEDIUM — Bamburral,* Cama de coelho.

CENTRATHERIUM SP — Pincel de estudante.*

—**VIOLACEUM** — Pincel.*

CENTROLOBIUM PARAENSIS — Muiracatiara,* Baracatiara, Pau rainha.

—**ROBUSTUM** — Potumuju,* Putumuju, Potumiaju, Putumuiú, Putumuju,* Araribá, A. amarelo, A. grande, Ararivá, Araruá, Ariroba, Arivá, Carijó, Eriribá, Gororoba, Guararoba, Iriribá, Mutumujú.

—**TOMENTOSUM** — Araribá rosa,* A. tinga, A. vermelha, Araraíba, Arararauva, Araruva, Guararoba, Ibiribá rosa, Potumujú amarelo,* P. rosa, Tipiri.

CENTROPOGON SURINAMENSIS — Bico de Papagaio,* Ganha sáia.

CERDANIA ALLIODORA — Pau d'ho.*

CEREUS DYBOWKII — Cabeça branca.*

—**JAMARACU** — Mandacaru de boi,* M. de fáxio, M. facheiro,* Cumbeba, Jamacaru, Jamaracurú, Jumacurú, Jumaracu, Urumbeba.

—**SCAMOSUS** — Facheiro,* F. pre- to, Man'acaru.

—**SETACEUS** — Rainha da noite.

—**TRIANGULARIS** — Cardo ananá, C. da praia, Figueira de inferno, Fruta de lobo, Mandacaru de tres quinas.*

—**VARIABILIS** — Cardo ananá,* C. ananaz,* C. da praia, C. vinagre, Figueira do inferno.

—**ZEHNTNERI** — Chique-chique,* Cheque-cheque.

CESTRUM CLAMIDATUM — Coera- na,* Coirana, Coirana, Courana.

—**CORYMBOSUM** — Coerana amare- la,* C. do brejo, Coá-punga, Con- rana, Courana,* Dama da noite, Fl de pirarucú, Goerana, Goirana.

—**ELEGANS** — Coerana,* C. verme- lha.*

—**EUANTHES** — Coerana,* Guaira- na.

- LAEVIGATUM — Coerana,* C. branca, C. da Bahia,* C. de São Paulo, Caerana, Calerana, Canema, Coá-purga, Coirana, Corana.* Cuarana, Cuirana, Dominguinha, Goerana, Goirana.
- MARTII — Coerana.*
- NOTURNUM — Coerana,* Jasmim da noite, J. verde
- PAUCIFLORUM — Coerana de Cerejas,* Coerana.
- CHAPTALIA INTEGRIFOLIA** — Costa branca,* Lingua de vaca.
- NUTANS — Costa branca,* Lingua de vaca, Serraíha da rocha, Tanira pecu.
- CHEIRANTIS RADIATA** — Samambáia,* Camambaja.
- CHENOPODIUM AMBROSIOIDES**
- Mastruço,* Matri, Matruz,* Menstruço, Menstrusto, Mentrusto, Menstruz, Ambrosia, Anserina vermífuga, Caacica, Chá do México, C. dos jesuítas, Cravinho do mato, Erva ambrosia, E. das cobras, E. das lombrigas, E. de bicho, E. de Santa Luzia, E. de Santa Maria, E. do México, E. formigucira, E. santa, E. vomiqueira, Lombrigueria, Uzaidela.
 - AMBROSIOIDES var INTEGRIFOLIUM — Mastruço.*
- CHIOCOCCA BRACHIATA** — Cin⁵ cruz,* C. cheiroso, C. cruzeiro, C. cruz verdadeiro, C. emético, Cainca, C. verdadeira, Canimarca, Caninana, Cassinga, Contra veneno, Cruzeirinha, Dambré, Fedorenta, Mina de ouro, Potia das boticas, P. ureta falsa, Puisa, Purga preta, Quinda ra preta, Q. preta, Ra amargosa, R. de frade, R. de quina, R. de serpentária do Brasil, R. do Pará, R. fedorenta.
- BRACHIATA vars: DENSIFLORA, LANCIOLATA, MICROPHYLLA, PECIOLARES, RIGIDA, VALIDA — Cipó cruz, Caninana.
- CHLORIS BAHJENSIS** — Grama de Jacobina.* Burrao, Capim burrao.
- DISTICHOPHYLLA — Capim cebola,* C. batatal, C. cocorobó, Co-cocorobó, Grama de Araquara.
- GOYANA — Capim de Rodes.*
- POLYDACTILA — Capim branco,* C. gaiamum.
- VIRGATA — Graminha,* Capim de ra, Mimosa de cacho.
- CHOMELIA OBTUSA** — Arroz do mato.*

- CHONDODENDRUM PLATYPHYL-LUM** — Parreira brava,* Abutua,* A. da terra, A. legitima, A. preta, Batata brava, B. de buti,* Cipó de cobra.
- CHORANTIA** — Rosa verde.
- CHORISIA RACEMOSA** — Oiticica.
- SPECIOSA — Barriguda,* Bela corsísa, Imbaré, Paineira branca, P. de fós róseas, Ubimangara.
- VENTRICOSA — Barriguda de espinho,* Imbaré.
- CHRYsalidocarpus LACTESCENS** — Areca bambu,* Palmeira bambu.
- CHYSANTEMUM CARINATUM** — Mal-me-quer,* M. me-quer-Bem-me-quer, Matricária, Monsenhores amarelhos.
- CORONARIUM — Mal-me-quer.* Mal-me-queres.
- INDICUM — Crisântemo,* C. da Índia, Monsenhores,* Saudades do inverno, Xivante.
- SEGATUM — Estrela de ouro.*
- SINNFSIS — Crisântemo.
- CHYSOLABANUS ICACO** — Ariú,* Aba, Abageru, Abgeru, Ajerú, Airú,* Ajurujurú, Ameixa algodão, Aperu, Coagaru, Coerujú, Gunjará, G. verme'ha, Guajirú, Guajurú, Guarajá, G. verme'ha, Hicaco, Icaco, Naruá, Oagerecu, Ongeru, Oagerum, Uajurú.
- CHYSOPHYLLUM CAINITO** — Cainito,* C. vermelho, Caianito,* Cainite, Cainito,* Abio do Pará, Aquai, F. dourada, Guaraito, Maçã estrelada, Ovo vegetal.
- CHUSQUEA GAUDICHaudii** — Taquare,* T. acu, Taquareiçú, Caniço.
- CHYTROMA SP. (C. jarana Hub.)** — Inhaiba,* I. de rego, Inhauba, Pau de mastro, Sapucúia verme'ha.
- CICHORIUM ENDIVIA** — Chicórea,* C. verdadeira, Almeirão.
- INTYBUS — Chicórea amarga.*
- CINCHONA CALISAYA** — Quina,* Q. amarcla,* Q. vera.
- SUCCIRUBRA — Quina,* Q. vermelha.*
- CINNAMODENDRON AXILARE** — Erva moura do sertão,* Cane'a branca, Casca de cotia, C. preciosa, Para tudo aromático, Pau pimenta.
- CINNAMOMUM ZEYLANICUM** — Cane'a da Índia.*
- CIPURA PALUDOSA** — A'ho do mato,* A. da campina, A. do campo, Coquinho, Vareta.

CIRTOPODIUM ANDERSONII — Su-
maré,* Banana de nicurí, Cola de
sapateiro, Lanceta milagrosa.*

PUNCTATUM — Sumaré,* Bisturi
do mato,* Rabo de tatu e os mes-
mos apelidos da sp precedente.

CISSAMPELOS ANDROMORPHA —
Orelha de onça.*

OVATIFOLIA — Orelha de onça,*
João da Costa.

TANIODES — Orelha de onça.*

TOMENTOSA — Parreira brava,*
P. capeba, Abutinha, Abutua da
terra,* A. de batata, A. grande,
A. legitima, A. preta, Baga de ca-
boclo, Batatinha de capeba, Coope-
va, Erva de Nossa Senhora, Jaboti-
caba de cipó, Jule, Jute, Palane,
Ruti, Uva de gentio, U. do mato,
U. do Rio Apá, U. seca, Videira
silvestre.

CISSUS CICYOIDES — Cortina dos
pobres,* Cortina, C. de oxalá, C.
japonesa, Anil trepador, Cipó corti-
na, C. puci, Puci, Tinta dos gen-
tios, Uva brava.

EROSA — Cipó de fogo.* Uva bra-
va.

RUTILUS — Cortina dos pobres.*

CITRIOSMA APIOSYCE — Cidrei-
ra do mato,* C. dos campos, Cidra,
Erva cidreira do mato, E. cidreira
dos campos.

CAMPORUM — Cidreira do ma-
to,* C. dos campos.

LIMONIODORA — Cidra, Cidreira
do mato.

CITRULLUS VULGARIS — Melan-
cia,* Melão d'água, Belancia, Facé,
Jacé.

CITRUS AURANTIUM — Laranja,*
Laranjeira,* Pomo das hiperídicas,
P. de Baco.

AURANTIUM var. Laranja impe-
rial,* L. independência.*

AURANTIUM var AMARA — La-
ranja amarga,* L. azeda, L. da
terra,* L. de Sevilha, Laranaja.

AURANTIUM var BRASILIENSIS —
Laranja da Bahia,* L. de um-
bigo,* L. do Cabule,* L. seleta da
Bahia, L. seleta de umbigo, L. sem
enroços,* Pomo de ouro, P. de ouro
e mel.

AURANTIUM var DEPRESSUS —
Laranja seleta,* L. da cidade, L.
do Rio.

AURANTIUM var LUMIA — La-
ranja lima,* L. docinha, L. serra
d'água,

AURANTIUM var PYRIFORMIS
— Laranja péra.*

AURANTIUM var SINENSIS —
Laranja da China,* L. caipira.

DELICIOSA — Laranja tangerina.*

GRANDIS — Toranja,* T. melan-
cia, Turanja,* Laranja da Índia,
Shaddock.

LIMETA var LUMIA — Lima de
umbigo,* L. de bico.

LIMETA var VULGARIS — Lima
da Pérsia,* L. comum.

LIMONUM var BAJOURA — Li-
mão gallego,* L. cidra, L. cravo,
L. ciciliano, L. de casca grossa, L.
da Índia, L. francês, Laranja vi-
nagre.

LIMONUM var CEDRA — Cidra,*
Cidreira,* Pomo de Media, P. de
Miden.

LIMONUM var LUMIA — Limão
doce.*

LIMONUM var MEDICA — Limão
de molho,* L. amargo, L. azedo,
L. comum,* L. de botica, L. silves-
tre, L. verdadeiro, Pomo da Assiria.

MAXIMA — Toranja,* Bombajina,
Pompeimo e os outros apelidos do
Citrus grandis.

NOBILIS — Laranja tangerina.*
L. boceta, L. crava, L. cravo,* L.
de tanger, L. mandarina, L. mexer-
queira,* L. mexirica, Mexiriqueira,
Pixerica, Tanja, Tangerina,* Tangi-
nha.

PARADISII — Pomelo,* Grape
fruit, Maçã macão, Pomo maçã, Pu-
meio.

CLADONIA VERTICILARIS — Geri-
cê branco,* Jericô.

CLEMATITIS DIOICA — Cipó cruz,*
C. do reino.

DIOICA var BRASILIANA — Cipó
cruz.

CLEOME GIGANTEA — Catinga de
negro,* C. de tatu.

PENTAPHYLLA — Mussambé de
5 fol.,* M. cor de rosa, M. sinapis-
mo, Mossambé, Muçambé.

SPINOSA — Mussambé de espi-
no,* M. branco, M. de 7 fol., Mos-
sambé, Muçambé,* Pimenta de ma-
caco, P. longa, Sete Marias, Tarni-
tânia, Taratânia, Tererânia.

CLERODENDRON FALLAX — Flor
de coral.*

FRAGRANS — Vulcania,* Volcana.

TOMPSONAE — Flor do paraiso,*
F. do bispo, F. do clero,* F. da
papa, Brinco, Lágrimas de Cristo,*
L. de Nossa Senhora, Planta do cle-
ro.

- CLITORIA GUYANENSIS** — Espelina falsa,* Falsa espelina.
- **HIRTA** — Folha de fogo,* Berugedé,* Cabeluda, Cabeludinha, Mexicanica, Pixirica.
- CLUSIA INSIGNE, C. FLUMINENSIS** — Mangue cebola,* Atraca madeira, Cebola do mato, Mata pau.*
- **SP.** — Mucerengue, Mucerengue.*
- CNIDOSCULUS MARCGRAVII** — Penão,* Pensão, Pináu, Pino, Arre dia-bo,* Cansanção de leite, Queimadeira.
- **OLIGANDRUS** — Penão* e os mesmos apelidos da sp antecedente.
- **PHYLLACANTHUS** — Favela,* Favelero,* Quicimadeira.
- **PHYLLACANTHUS** var **REPANDUS** — Favela,* Favelero.
- COBOEA SCANDENS** — Estefânia,* Cabacinhas, Cobea.
- COCCOLOBA CORDIFOLIA** — Cura-tá.*
- **ILHEENSIS** — Cipó branco,* C. de corca, Jenipapinho.
- **LACTIFOLIA** — Cabussú,* Cabuçu,* Cauacu, Gunjabara, Guajuvira.
- **MARTII** — Cabuçu.*
- **OCHREOLATA** — Costela de vaca.*
- **UVIFERA** — Baga da praia,* Guajabara, Guajuvira, Guiabara, Pau de estalo,* P. de estopa, Tangará açu, Tangaracá açu caá, Tangará guacu, Uva silvestre.
- COCCULUS FILIPENDULA** — Abuta miuda,* Butija mirim, Butuimha.
- COCHLOSPERMUM INSIGNE** — Butua de corvo,* Algodão cravo, A. do mato, Pacote, Periquiteira do campo, Sumauma do Iguapô.
- COCUS BOTRIOPHORA** — Pati,* P. doce, Palmito geribá, P. gerivá, Patioba.
- **CAMPESTRIS** — Côco de vaqueiro.*
- **CAMPOS-PORTUANA** — Lierui açu.
- **CORONATA** — Nicuri,* N. de caboclo, N. iba, Adicuri,* Alcuri,* Aracuri, Ariburi, Aricuri, Aricuri,* Coqueiro casebudo, Dicorí, Dicuri, Iracuri, Licuri,* Oricuri, Ouricuri, Uricuri, Urucuri Ururicuri, Ururu-curi.
- **EDULIS** — Catolé babão.*
- **MATA-FOME** — Coqueiro mata fome,* Mata fome.
- **NUCIFERA** — Coqueiro da Bahia,* C. da praia,* C. rei, Côco da Bahia,* C. da India, Inajaguaçu-iba, Inajauaçu.

- **ROMANZOFFIANA** — Baba de boi,* Côco de boi, C. de cachorro, C. de sapo, Geribá, Gerivá, Imburí de cachorro, Jamburi, Jariva, Jeriba, Jeribá, Jeriva, Jiriva, Jiruva, Pindoba do sul, Tâmara da terra.
- **SCHISOPHYLLA** — Nicurioba,* Aricurioba, Aricuriroba, Licurioba,* Nicurioba.
- **VAGANS** — Ariri,* Licurizinho do sertão.*
- **WEDDELLIANA** — Coqueirinho de Petrópolis, Icá, Palmeirinha de Petrópolis.
- COFFEA ARABICA** — Café,* C. comum,* F. de São Fidelis.
- **ARABICA** var **MACROCARPA** — Café de Maragogipe.*
- **VIBURNOIDES** — Chá de bugre.*
- COIX LAGRIMA-JOBI** — Lágrimas de Nossa Senhora,* L. de Jé,* L. de Santa Maria, Adlai,* Biuri, Capim de contas, C. de missanga, C. de Nossa Senhora, Capim rosário, Carpia, Contas de leite, C. de Nagô, C. de Santa Maria, Erva dos rosários, Rosário, Tento azul, Trevo indiano, Trigo adlai, T. diamante, T. dos trópicos.
- COLA ACUMINATA, C. NITIDA** — Noz de cola,* N. de Gondja, N. de Guram, N. de Sudão, Abujá, Café de Sudão, Cola africana, C. de Bayayi, C. medicinal, C. vera, Colaeira, Coleira, Colateira, Cucs, Gurú, Mangone, Obi,* Ombevê, Orobó, Oubi.*
- COLEUS BLUMEI, C. SCUTELLARIOIDES, C. VERSCHAFFELTI** — Côleos,* C. de Java, Coléus,* Tapete.
- COLOCASIA ANTICORUM** — Taio-ba,* T. de São Tomé, T. esculenta, T. mansa, Taia, Tajarana, Tajauba, Taiova, Taiuva, Taja, Tajal, Tajaz, Tara, Caládio esculento, Couve creira, Inhame taro, I. branco, Jaba-buçu, Jatal, Jataz, Orelha de veado.
- **ANTICORUM** var **ACRIS** — Taio-ba brava,* Taiobuçu, Ta abuçu.
- **ESCULENTA** — Inhame japonês,* I. gigante, I. roxo,* I. taro.
- CUMBRETUM LEPROSUM** — Cipó-aba,* Mafumo, Mofumbo, Mofumo..
- **ANFRACTUOSUM** — Vaqueta.
- COMMELINA COMMUNIS** — Marininha,* Maria mole, Mariana, Marriquinha, Cuiuinha, Erva mehiná, Fl. das lavadeiras, Grama da terra, G. do brejo, G. do Maranhão, Jacaminha, Lavadeira, Taquarasinha, Trabociraba, Tracoceiraba, Tracoera-

- ba, Trapoeiraba,* T. azul, T. rana, T. verdadeira, Trapoeirava.
DEFICIENS — Marianinha* e os mesmos apelidos da sp precedente.
DIURETICA — Marianinha* e os apelidos da *C. communis*.
NUDIFLORA — Marianinha,* Capim gomoso, Olho de Santa Luzia, Taboquinha e os mesmos apelidos da primeira sp congênere.
POHLIANA — Erva mijona,* Didi de porteira,* Trapoeiraba azul.
CONARUS FAVOSUS — Amarelinho.
CONOBEA AQUATICA — Vassourinha d'água.
SCOPARIOIDES — Vassourinha do brejo, Paraqueira.
CONOCARPUS ERECTUS — Mangue boln.* M. botão.*
COPAIFERA LANGSDORFFII — Copáiba vermelha,* C. da vúrza, Caobi, Óleo vermelho, Pau bálsamo, Podá.
OFFICINALIS — Copáiba,* C. verdadeira, Copiba, Copau, Copauva, Copiuba, Cupai, Cupiuba, Amaranthe, Bálsmo de copáiba,* Jatobá mirim, Miréu, Óleo branco, O. de copáiba, Pau de óleo, Terczina.
COPERNICIA AUSTRALIS — Carandá,* C. abá, Caraná, Carandai, Carandá-muriti.
CERIFERA — Carnauba,* Carnaíba, Carandai, Carandatai, Carnaíba, Árvore da vida, A. providência, Palmeira de cera.*
CORCHORUS AESTUANS — Caruru da Bahia, Corete.
CORDIA CALOCEPHALA — Carai-ba,* Craiba.
CHAMISSONIANA — Pau cachorro,* Cambará-açu.
COFFEOIDES — Café do mato,* Chá do mato, Limão do mato.
CURAÇAVICA — Maria preta,* Balieira, Camará japó, Catinga de preto, Erva balieira.
EXCELSA — Grão de gallo,* Tai-acu.
GLABRATA — Claraiba.*
ROTUNDIFOLIA — Guabiraba,* Guariraba.
SALICIFOLIA — Porangaba,* Poranga, Café do diabo, C. do mato, Chá de frade, C. de negro mina, C. de soldado, Laranjinha do mato.
SUPERBA — Grão de gallo,* G. de porco, Acoaramurú, Árvore de rancho, Babosa branca, Catarro, Ja-coara murú, Jaguara murú, Janganga do campo, Jatuiba, Ramela de

- cachorro, Tajaçu, Tajaçu, T. carapá.
VERBENACIA — Erva de sapo,* Agoita cavalo, Agoite de cavalo.
VULNERARIA — Rabuge.
CORDYLINE TERMINALIS — Coqueiro de Vénus,* Coqueirinho de Vénus, Palmeirinha de Vénus, Ra de chá Tenga, Ti.
COREOPSIS LANCIOLATA — Maravida.
CORIANDRUM SATIVUM — Coentro,* C. das hortas, Caopunga, Cheiro, Coendro, Coriandro.
CORONOPUS DIDYMUS — Mastruço.
CROTALARIA ARGENTEA — Capim das pampas,* C. penacho.
COSMUS CAUDATUS — Cosmos,* Picão-açu, Picão branco, P. da praia, P. do grande.
SULFUREUM — Cosmos,* Coreop-ses, Coriopes,* Cósmea, Amor de moça, Beijo de moça, Estrela do Egito, Linda fl.
COSTUS IGNEUS — Cana do mato,* C. da terra, C. do rio.
SPICATUS — Cana de macaco,* C. branca, C. do brejo, C. roxa do brejo, Fl de Santa Bárbara, Jacuanga, Jacuanga, Perina, Sangolovô, Ubá, Ubacaba.
SPIRALIS — Cana de macaco,* Ubacaba.
COUACAPOUA AMERICANA — An-ge-lim da fo larga.*
COUEPIA RUFA — Oiti corô,* O. coroia, O. da mata, O. grande, Guaiti, Gutí, Gutiba, Paiurá, Paju-rá, Uiti.
COUMA RIGIDA — Mocugê,* Maca-gé, Macujê, Mucujê.
COURATARI LEGALIS — Jequitibá,* J. branco, Jequitivá, Caixão, Embira de jequitibá, Igigibá, Igi-tibá.
COUROUPITA LENTULA — Cória de macaco,* Castanha de macaco.
SURINAMENSIS — Abricó de ma-caco,* Castanha de anta, C. de ma-caco.
COUSSAPOA CURRANDII — Cibu-eiro.*
COUTAREA HEXANDRA — Quina do Bansi,* Q. da terra, Q. de cuma-nã, Q. de Fernambuco, Q. de São Diogo, Q. do Piaui, Q. do Rio, Químico, Murta do mato.

- CRATAEVA TAPIA** — Tapí,* Tera-piá, Trapíá.
- CRATYLIA FLORIBUNDA** — Camaraturá,* Cava, Cavani.
- CRESCENTIA CUJETE** — Colte,* Coitezeiro, Cina, Cúia,* C. verde, Cuieira,* Cuieté, Cuité, Goité.*
- CROTALARIA MAYPURENSIS** — Canaria.*
- RETUSA** — Cascavel,* Cascaveleira,* Cachichi, Cheque-cheque, Chiqui-chiqui,* Chocalho, C. de cascavel, C. de raposa, Crotajária, C. maracá, Brinco de viuva, Erva de cascavel, Feijão de guizos, Guizo de cascavel, Maracá, Tange-tange, Xianané.
- CROTON ANTISYPHILITICUS** — Curraleira,* Caa-tiá, Alcanfor, A. do campo, Alcanfora, Alcanforeira, Erva andorinha,* E. mular, Leitaria, Luzetro, Maleitaira, Mercúrio do campo, Pé de perdiz, Sanguinária, Santa Luzia, Velame de cheiro.
- ANTISYPHILITICUS** var **BAHIENSIS** — Curraleira* e os apelidos da sp precedente.
- CAMPESTRE** — Velame,* V. amarelo, V. do campo, V. verdadeiro, Velaminho do campo, Capichingui, Carurú acu, Ervâncio.
- CELTIDIFOLIUS** — Capichingui,* Canechingui, Capilixingui, Capixingui, Tanixingui.
- HEMIORGYRAES** — Marmelo.*
- JACOBINENSIS** — Marmelo.*
- LUNDIANUS** — Curraleira,* Alcanfor, Alcanforeira, Erva de cobra, E. de Santa Luzia.
- LUNDIANUS** var **BAHIENSIS** — Curraleira.*
- PAULIMANUS** — Sangue de draco.*
- PHLOMOIDES** — Cassatinga,* Catinga, Cavitinga.
- PSEUDO-POPULUS** — Velame de espiga.*
- SALUTARIS** — Sangue de draco,* Cambrásia.
- SPECIOSUM** — Cassatinga.
- URUCURANA** — Urucurana,* Uri-curana, Licurapa, Sangue de draco.
- VARIEGATUM** — Croton,* C. dos jardins,* Arbusto, Fo da independencia,* F. de papagalo.
- CRYPTANTHUS ZONATUS** — Gravatá zebra.*
- CUCUMIS AFRICANUS** — Maxixe,* Machiche, Maxixerê.
- ANGURIA** — Maxixe bravo,* Pepino de burro.
- MELO** — Melão casca de carvalho,* M. amarelo, M. de mesa, Meloeiro, Semente de carvalho.
- SATIVUS** — Pepino,* Cocombro.
- CUCURBITA LAGENARIA** — Cabace,* C. amargosa, C. de colo, C. purunga, Cabaço de cária, C. marimba, Colombo, Co'ombro, Colondro, Caramembo, Abóbora de carneiro, A. eu baça, Porongo, Purungo, Taquera.
- MAMMEATA** — Mameiro grande.
- MAXIMA** — Abóbora menina,* A. de conserva, A. de Guiné, A. gigante, A. grande, A. melão, Abobolra,* Coca.
- MAXIMA** var **ROTUNDA** — Gerimú,* Geramu, Gerimum,* Girimum, Abóbora amarilla, A. gerimu,* A. jurumum, Jurumú, Moganga, Moranga.
- MOSCATA** — Abóbora cheirosa,* A. almiscar, A. cattinga, A. japonêsa, A. saco de viajem, Coca, Geremu gallego.
- PEPO** — Abóbora moganga,* A. da Guiné, A. de carneiro, A. de porco, A. de quaresma, A. moranga, A. muranga, A. porqueira, Moganga, Moranga.
- VERRUCOSA** — Abóbora de verrugas,* A. de impigem, A. sardosa.
- CUMBRETTUM LEPROSUM** — Cipó abá,* Mofumbo, Mofumo, Mufumba, Mufumo.
- CUMINUM CYMIUM** — Cominho,* Anis acre, Endro.
- CUPANIA EMARGINATA** — Cajuel-ro do campo.*
- RACEMOSA** — Camboatan,* C. de capoeira, Caguatá, Cambotá,* Cambotá, Cambotá, Camboitá, Cracotá, Cravatá, Cuvatán.
- CUPHAE APERTA** — Sete sangrias.*
- BALSAMONA** — Sete sangrias,* Baba de burro, Escorrega, Perna de saracura.
- ERICOIDES** — Carqueja.*
- GLUTINOSA** — Sete sangrias,* Babo de burro.
- INGRATA** — Sete sangrias.*
- LARICOIDES** — Carqueja.*
- PASCUORUM** — Sete sangrias.*
- CUPRESSUS LUSITANICA** — Cedrinho,* Cedro do hússaco, C. portuguesa, Cipreste,* Aclpreste.
- SEMPER VIRENS** — Cipreste,* C. comum, C. italiano, C. piramidal, Aciapreste, Árvore da vida.
- CURATELLA AMERICANA** — Lixeira,* L. do cerrado, Lixa, Bacabuaf, Calimbaiba, Cafimbé, Calimpé,

Cajueiro bravo,* C. de tabuleiro, C. do campo, C. do mato, C. manso, Caju peba, C. silvestre, Cambaiba, Cambaibinha, Cambarba, Cambarrá, Fáia, Fo de lixa, Marajoara, Pau de lixa, Pentieira, Sambaiba,* Sambaiba, Sambeiba, Sobro, S. nacionai.

CURCUMA LONGA — Curcuma,* Açafrão da Índia, A. da terra, Açafrão (fora da Bahia), A. da Índia, Açafror, Batatinha amarela, Gengibre amarcelo, G. dourado, Ra de açafrão, R. de curcuma, Rizoma dos índios, Terra mérita.

—**TINCTORIA** — Curcuma,* Sassafrão, e os apelidos da sp precedente.

CUSCUTA AMERICANA — Cipó chumbo,* C. dourado, Cuscuta, Erva de chumbo, Fios de ovos, F. do diabo.

—**INDECORA** — Cipó chumbo.*

—**RACEMOSA** — Cipó chumbo,* C. chumbo ordinário, Erva felpuda, Seda de linho.

—**UMBELLATA** — Cipó chumbo,* C. chumbo da fl miudinha, Erva felpuda, Xiriuba, Xiriubeira.

CUSPARIA TOXICARIA — Angustura venenosa.*

—**TRIFOLIATA** — Angustura,* A. de cheiro, Amarélinho da serra, Amarelo.

CUTUBEA SPICATA — Fel da terra,* Alfinetes, Boca de sapo, Erva de bicho, Genciana do Brasil, Papai Nicolau.* Ra. amargosa.

CYBISTAX ANTISYPHILITICA — Caroba da fl verde,* C. do campo, Carobinha mandioca, C. mirim, C. pavão, C. verde, Cinco chagas, C. fos, Ipê de fl, I. de fl verde, I. do campo.

CYCAS CIRCINALIS — Sagu,* S. das Molucas, S. de jardim, Saguer,* Sagum, Palmeira de sagu, Palmeirinha de sagu.

—**REVOLUTA** — Sagu,* S. do Japão, Saguerio, e os apelidos da sp precedente.

CYDISTA AEQUINOCTIALIS — Cipó de corda,* C. de amarrar caramujeiro, C. de bamburral, C. de cesto, Guela de jacu.

CYPELLA CATHARTICA — Baririçó.*

—**COERULEA** — Lírio roxo do Brasil,* L. de cerca.

—**HERBERTII** — Batatinha do campo,* B. purgativa, Ruibarbo do campo, Careta.

—**LONGIFOLIA** — Iris.

—**NORTHIANA** — Lírio verde.

CYPERUS ALTERNIFOLIUS — Palmeirinha d'água.*

—**BRASILIENSIS** — Tiririca,* T. comum, Capim cortante.

—**CUMPRESSUS** — Capim barba de bode,* Barba de bode.*

—**GIGANTEUS** — Pirí-pirí,* Pápiro brasileiro, Perí, Perí-perí,* Piríri, Pipirí, Junco de brejo.

—**LEUCANTHUS** — Capim de um só botão.*

—**LONGUS** — Dandá,* D. açu, D. africano, D. cheiroso,* D. do Brasil, Alfabar, Côco capim, Dulcinia, Junça,* J. cheirosa, Junco, J. de lagoa, J. do brejo, Junquinho.

—**ESCULENTUS** — Dandá.*

—**LUZOLAE** — Capim de botão.

—**PALUSTRIS** var **OLIGOSTACHYS** — Capim dandá,* Junça de conta, Juncinha, Tiririca,* T. dos jardins.

—**RADIATUS** — Tiririca.

—**ROTUNDUS** — Dandá,* Capim de andar.

—**ROTUNDUS** var **PROLIGERUS** — Capim dandá,* Côco capim, Tiririca, Junça de contas, Juncinha.

CYRTOPODIUM PUNCTATUM — Sumaré,* Lanceta milagrosa.*

D

- DACTYLOCTENIUM AEGIPTIUM** — Capim calandrini,* C. mimoso do Piauí, Calandriní, Mão de sapo.
- DAHLIA VARIABILIS** — Dália,* D. dos jardins.
- DALBERGIA MISCOLOBIUM** — Cabuina do campo.*
- NIGRA** — Jacarandá negro,* J. atan, J. cabiuna,* J. cabiuva, J. da Bahia,* J. preto,* J. verdadeiro, Cabeúna, Cabiuna, C. rajada, Cabiuva, Caboré, Cambiuna, Camboriúna, Guaximbé, Guaximbí, Pau preto, Tambaíba, Urauna.
- SP** — Sebastião de Arruda,* Cega machado, Cravo, Fuso, Pau de fuso,* P. de rosa, P. de tanho, P. rosa.
- TOMENTOSA** — Cipó violeta.*
- VARIABILIS** — Cipó violeta.
- DALECHAMPIA TILIAEFOLIA** — Cipó tripa de galinha,* Tamíranana, Tripa de galinha, Urtiga de cipó, U. queimadeira, U. tamíranana.
- DAPHNOPSIS BRASILIENSIS** — Embira branca.*
- DATURA ARBOREA** — Trombeta branca,* T. arbórea, Anágua de Vénus, Baboso, Cálice de Vénus, Estramônio arbórescente, Jabumba, Mamominha, Sáia branca, Toé, Zabumba,* Z. branca.
- FAUSTOSA** — Trombeta roxa,* T. de juiz, T. de juizo final, T. pequena, Trombetão, T. roxo, Túnica de Cristo, Babado de viúva, Cipó de luto, Erva da toupeira, Manto de Cristo, Zabumba roxa.*
- STRAMONIUM** — Estramônio,* Erva de João Venâncio, E. do diabo, E. dos feiticeiros, E. dos mágicos, Datura, Figueirinha do inferno, Maçã do diabo, M. espinhososa, Mamominha branca, Pomo do diabo, P. espinhososa.
- SUAVEOLENS** — Trombeta,* T. cheirosa, Trombetiera, Açucena do brejo, Babado, Baboso, Cartueheira, Erva trombeta, Fl de trombeta, Sete sáias, Sino de tarde.
- DAUCUS CAROTA** — Cenoura,* C. de Montevideo, Bisnaga hortense, Erva coentrinha.

- DAVILA GRANDIFOLIA** — Cipó Garcês.*
- RUGOSA** — Cipó caboclo,* C. capa homem, C. carijó, C. de caboclo, C. de carijó, C. vermelho, Capa homem, Muiraqueta, Muiraquita, Sambaiba, Sambaibinha.
- DEJANIRA ERUBESCENS** — Quina de raiz,* Químico, Boca de sapo, Centáurea da terra, C. do Brasil, Copo d'água, Erva quina, Escovinha, Ra amargosa, R. de fel.
- DESMODIUM ADSCENDENS** — Carapicho beijo de boi,* C. de ovelha, Carracho, Amor do campo, Amorico, Pega-pega, Trevinho do campo, Trevo do campo.
- DESMONCHUS MACROCANTHUS** — Titara,* Tipiti, Jacitara, J. açu, Jacitata, Urubamba.
- NEMOROSUS** — Titara.*
- POLYACANTHUS** — Jacitara.*
- DIANTHUS CARYOPHYLLUS** — Cravo,* C. dos jardins,* C. dos floristas, C. odorífero, Craveiro.*
- CHINENSIS** — Cravina da China.*
- PLUMARIUS** — Cravina,* Cravo bordado.
- PLUMARIUS** var **ALBIFLORA** — Cravina branca,* C. rajada.
- PLUMARIUS** var **SEMPER-FLORENS** — Cravina de todo anno.*
- DICHIROMENA CILIATA** — Capim estrela.*
- PUBERA** — Capim estrela.
- DICKSONIA SELLOWIANA** — Samambá imperial,* Chachim.
- DIDYMOPanax MOROTOTONI** — Mandiocai,* Mandioqueira.
- DIFFEMBACHIA PICTA** — Aninga Pará.*
- DILLENA INDICA** — Flor de abril,* Dilénia, Fruta estrelada.
- DIMORPHANDRA EXALTATA** — Cereja do Paraná,* C. da terra, C. do Brasil, C. do mato.
- GARDNERIANA** — Barbatimão,* Fava de arara.
- DIOCLEA EDULIS** — Curunha,* Coroanha, Curuanha.
- POLYMORPHA** — Ipeca,* Ipeca-coranha.
- VIOLACEA** — Mucuna açu,* M. uaçu.

DIOSCOREA ACULEATA — Inhame da Costa,* I. da Guiné, Cará da Costa.

—**BULBIFERA** — Inhame de Angola,* I. sapateiro, Batata de rama, Cará de Angola, C. de espinho, Cará do ar, C. moela, Macaquinho.

—**DODECANERA** — Cará barbado.*

—**GLANDULOSA** — Caratinga,* Cará da fo colorida, C. liso, C. sem barba.

—**LATIFOLIA** — Inhame fígado de Peru.*

—**LAXIFLORA** — Caratinga brava,* C. do mato.

—**PIPERIFOLIA** — Caratinga,* Cará da fo colorida, C. da pele branca.

—**POLYGONOIDES** — Cará da terra.*

—**SATIVA** — Inhame de São Tomé.*

—**SINUATA** — Caratinga brava.*

DIOSPYROS KAKI — Caqui,* Alperceiro do Japão Kaki.

DIPLODENIA FRAGRANS — Aia-manda cheirosa.*

—**ILLUSTRIS** — Erva venenosa,* Jalapa verme-ha, Rosa dos campos.

—**SANCTA** — Erva santa.*

DIPLOTHEMIUM CAMPESTRE — Piçandô,* Burí mirim, Pissandô,* Pisandu.

—**CAUDESCENS** — Patloba da Bahia,* Burí, B. açu.

—**MARITIMUM** — Cachandô,* Câo curiri, Coqueiro da praia, Burí da prain, B. mirim, Guriri, Puranam.

DIPTYCHANDRA EPUNCTATA — Carvão vermelho.*

DOLICHOS LABLAT — Manga'ô,* M. da Costa, M. da África, Mangaravi, Cumandatiú, Guar.

—**LABLAT** var **ALBIFLORUS** — Ervilhaca,* Cisirão, Mangalô branco.*

—**MONACHALIS** — Feijão frade,* F. caretta, F. carita, F. carito, F. de frade, F. fradinho,* F. miudo.*

—**SESQUIPEDALES** — Feijão de macassa,* F. de corda,* F. de massacar.

—**SOJA** — Soja,* Sojoira, Feijão soja. **DOMBEYA VIBURNIFLORA** — Astrápea,* Borá, Dombea, Parassol.

—**WALLACHII** — Astrápea,* Aurora, Borla de sargento. Estes dois últimos apelidos também pertencem à se precedente.

DORSTENIA ANTHURIIFOLIA — Cainpiá.*

—**BAHIENSIS** — Contra erva.*

—**BRASILIENSIS** — Contra erva,* C. erva das farmácias, C. erva do Brasil, C. erva oficial, Caá-plá, Cainpiá açu, C.-piá mirim, C.-piá preto, Caiapiá, C. mirim, Cajapiá, Capa homens, Capiú, Carapa, Carapipá,* C. verdadeiro, Caxapiá, Chupa-chupn, Contas de cobra, Contraria, Figueira terrestre, Liga-liga, Liga-osso, Ra das Felizinas, Serpentária do Brasil, Tapore, Taropé, Teiu, Teiu-açu.

—**MULTIFORMIS** — Contra erva,* Cainpiá, C. do grande, C. preta.

DRACAENA BRASILIENSIS — Coqueiro de Vénus, Pa-meirinha de Vénus, Guarana, Tengn, Ti.

—**DRAGO** — Sangue de drago, S. d'água, S. de Andrade, S. de dragão, S. de pau, Sanguinário, Árvore do dragão, Cabraia, Dragoelho, Dragoneiro.

DRYMARIA CORDATA — Pega pintado do miúdo,* Erva vintem, Jaboti-cá, Pernou, Sosinho.

DRYMYS WINTERII — Casco de anta,* C. de anta vermelha, Coneila amargosa, C. do náramo, Capororoca picante, Catáia, Acatáia, Malambho, Orilha de anta, O. de burro, Pau para tudo.

DUGUETIA LANCEOLATA — Beriha de Pernambuco, Morolé.

—**MARCOGRAVIANA** — Beriba verdadeira, B. verde.

E

ECHINOCACTUS OTTONIS — Cabeça de fraude.*

ECHINOCHLOA POLYSTACHIA — Capim de Angola,* C. da praia, C. de feixe, C. de mu'a, C. mandante, C. navalha, C. paraguá, Cana-cana verdadeira, Canarana, Bengo, Painço grande.

— **POLYSTACHIA** var. **HELIOIDES** — Capim angolinha.*

ECHINOCYSTIS LOBATA — Equinocistis.

— **MURICATA** — Equinocystis.

ECHINODORUS GRANDIFLORUS — Chá da campanha,* Congonha do brejo.

— **MACROPHYLLUM** — Chapéu de couro,* Chá do brejo, C. do pobre, Erva do pantano.

— **PUBESCENS** — Chá mineiro.*

ECHIOPSPERMUM BALTHAZARI — Vinhático amarelo, V. testa de boi.

ECHITES FONGIFLORA — Fl de babado,* F. de babeiro, Babeiro.

— **PELTATA** — Painea de penas,* Paineira loura, Capa homens, Cipó cágado, C. capador, C. capa homens, C. carníero, C. de paina, C. pau, C. santo, Erva santa, João da Costa, Leiteira.

— **PELTIGERA** — Cipó de penas,* C. carneiro.

— **VIOLACEA** — Cipó de São Francisco.*

ECLIPTA ALBA — Erva botrão,* E. contra cobras, E. lanceta,* Lanceta, Sururiuna, Surucuina.

EGLETIS VIScosa — Macela,* M. da terra, Marcella, Chá de jagor, Losna do mato.

EICHORNIA AZUREA — Baroneza,* Dama do lago,* Moruré da fl roxa, M. de canudo, M. oreha de veado, Mureru, Orelha de burro, O. de veado, Parovauna, Pavoa, Uapé, Violeta d'água.

— **CRASSEPEs** — Baroneza* e os apelidos da sp precedente.

ELAEIS GUINEENSIS — Dendê,* D. brasileiro, D. da Costa, D. de papagáio, D. do Pará, D. periquito, D. sombra, Dendezeiro,* Dedê, Aoura, Caiaus, Palmeira da Guiné.

— **MELANOCOCUS** — Dendê,* D. do Pará.

ELEPHANTROPUS SCABER — Fumo bravo,* F. de mina, F. do matto, Caá, Caíá, Erva colégio,* E. de veado, E. grossa, Pé de elefante, Suquáia, Sarroia, Sassóia, Suacú-áia, Suaçu-caá, Suçáia,* Sucualijá, Sussáia, Sucuva.

ELETERIA CARDAMOMO — Cardamomo.*

ELEUSINE INDICA — Capim pé de galinha,* C. pé de papagaio, C. de coradouro,* C. de pomar, C. puba, Fl de grama, Grama de coradouro, G. rasteira, Pata de galinha, Pé de galinha, P. de papagáio.

ELIONURUS CANDIDUS — Capim amargoso.*

— **LATIFLORUS** — Capim amargo-so,* C. manga do campo.

EMILIA SONCHIFOLIA — Serra-lha,* S. do Brasil, Erva do figado.

ENDLICHHERIA HIRSUTA — Cane-la cheirosa, C. branca, C. da fo-mida, C. de papagáio.

ENHYDRA SESSILIS — Barba de lagoa.*

ENTEROLOBIUM CONTORTISILIQUUM — Tamboril,* Tambor, Tam-bori, Tambureiro, Tamburil, Tam-buriuva, Árvore das patacas, Cam-banambi, Chimbó.

— **ELLIPTICUM** — Vinhático,* Fave-la branca, Pau de vinho.

— **LUTESCENS** — Cambuí vinhá-tico.*

— **MONJOLO** — Jacaré,* Jacareiba, Camoeteiro, Camoeteira, Carcunda de jacaré, Icarapé, Monjojo, M. roxo, Serreiro, Serrero.

— **TAMBURIL** — Tamboril,* Talabo, Tambrim, Tambuvi, Timboliba e ou-tros apelidos assina'ados a propó-sito do E. contortisiliquum.

— **TIMBOUVA** — Tamboril,* Tambu-ri,* Timbauba, Timbaiba, Timbau-va, Timborá, Timborana, Timboril, Timbouba, Timbuiba, Timbuva, Ore-lha de macaco. O. de negro,* O. de preto, Pacará, Ximbiuva, Xim-buva, Kimbó.

- EPALTES BRASILIENSIS** — Esto-
tuque.*
- EPIPENDRUM DICHROMUM** — Bo-
ca de dragão,* Epidendro.
- FRAGRANS** — Boca de dragão,*
Epidendro.
- RANIFERUM** — Boca de dragão,*
Epidendro.
- ERAGROSTIS ARTICULATA** — Ca-
pim mimoso,* C. atana, Panasco.
- BAHIENSIS** — Capim açu,* Arroz
de eotia.
- CILIARIS** — Capim de rola, C.
bosta de rola, C. pêlo de rato, C.
penacho.
- MAGASTACHYA** — Capim pé.
- VAHLII** — Capim meruquia.*
- ERECHTITES HIERACIFOLIA** —
Carurú amargo,* Caperiçoba ver-
melha.
- VALERIANAEFOLIA** — Carurú
amargo.*
- EREMANTHUS INCANUS** — Fumo
bravo,* Chá, Cráia.
- SPHAEROCEPHALUS** — Chapéu
de couro.*
- ERIANTHUS SACCAROIDES** — Ca-
na brava,* Mâcega brava, Pena-
chinho.
- ERIARTEA EXORRHIZA** — Casti-
gal,* Baseiuba, Baxiuba, Pachiuba,*
Paxiuba.
- ERIGERON BONARIUM** — Capiço-
ba,* Capetiçoba, Capitiçoba, Cati-
çoba, Acatiânia.
- CANADENSIS** — Cauda de raposa.
- ERIOBOTRIA JAPONICA** — Amei-
xa do Japão,* A. amarela, A. do
Canadá, Ameixa, Japânia, Nes-
pera,* Nespereira do Japão, Nespilo.
- ERIOCHLOA ANNULATA** — Canim
Bahia,* C. da planta, C. do campo.
- ERIOPE HYPERIODES** — Barrigu-
dinha,* Piteira.
- ERISMA CALCARATUM** — Jabuti.*
- ERYNGIUM FOETIDUM** — Coentro
bravo,* C. da Colônia, C. da Co-
lumbia, C. da Índia, C. de boi, C.
do caboclo, C. do Maranhão, C. do
sertão, C. grosso, Nambi.
- ERYTHRINA CORALLODENDRON**
— Mulungú,* Murungú * Muchoco,
M. vermelho, Pau vermelho, Sanan-
du, Sananduba, Suinária.
- CRISTA-GALLI** — Mulungú,* Mu-
rungú,* Coraleira cristada, Pau
imortal.
- FALCATA** — Mulungú.*
- MULUNGU** — Mulungú,* Murun-
gú,* Molungú, Morungú,* Muchoco,
M. vermelho, Bico de arara,
Bico de papagáio, Cortiça, Corti-
- ceira do campo, João curto, Pau
imortal, P. vermelho, Sapatinho de
judeu, Suinã, Suinan,* Suinara,
Sumanvirá.
- RETICULATA** — Canivete.
- ERYTHROCHITON BRASILIENSIS**
— Eritroxiton.
- ERYTHROXYLLON CAMPESTRE**
— Cabelo de negro,* Coca do Para-
guai, Fruta de tucano do campo.
- CATUABA** — Catuaba vermelha.*
- FRANGULAEFOLIUM** — Arco de
pipa,* A. de pipa do miudo.
- PELLETIERIANUM** — Fruta de
pomba,* F. de pombo, Cocão, Va-
cum.
- PULCHRUM** — Arco de pipa,*
Cocão, Guareita, Saguaragi, So-
bragi, Sobragil, Sobraju, Sobriaju.
- SUBEROSUM** — Galinha chocu,*
Azougue do campo, Jacarandá do
campo, Mercúrio, Sessenta e dois.
- ESCHWEILERA JARANA** — Jarna-
na,* Jarana.
- SPECIOSA** — Biriba,* Biribá, Bi-
ribá da Bahia,* Beriba, Berivá, Em-
beriba, Embiriba, Ibiraba, Ibiriba.
- ESEMBECKIA FEBRIFUGA** — La-
ranjeira do mato,* Ana sorte, Ca-
putuna, Garatá, Cataguá, Guaratá,
Guaratun, Gurutá, Mamominha,
Mendenha, Marfimzinho, Pau duro,
Quina de espinho, Q. laranjeira,*
Tira teima, Tres fos, T. fos bran-
cas, T. fos vermelhas.
- LEIOCARPA** — Laranjeira do
mato.
- NIGRA** — Tembetaru,* Tambeta-
ru, Coentrilho.
- ESPIGELIA BRACHYSTACHYA** —
Espigélia.*
- EUCALYPTUS AMIGDALIANA**, E.
CRERA, E. DIVERSICOLOR, E.
GOMPHOCEPHALUS, E. OBLI-
QUA, E. ROBUSTA — Eucalipto.*
- CITRIODORA** — Eucalipto,* E.
limão.
- GLOBULUS** — Eucalipto,* Árvore
da febre, Gomeiro azul, Mogno
branco.
- EUCARIS AMAZONICA** — Lírio eu-
carístico,* L. do Amazonas, Estrela
amazonica, E. do cerrado, E. do
norte, Eucaris, Fl. de noiva, Nar-
ciso.
- GRANDIFLORA** — Lírio eucarís-
tico.*
- EUCHLAENA MEXICANA** — Teo-
sinte,* T. da Guatemala, Teosinto,*
Capim da Venezuela.
- EUGENIA AQUAE** — Jambo bran-
co,* J. aguado.

- CAMPESTRE — Uváia,* U. doce, Uvnaira, Uvalha,* Uvalheira, Uvária, Pitanga doce.
- JAMBOLANA — Jamboião,* Jambolano, Jambo da Índia, Jambol, Jamboleiro, Jambul, Jalão, Jame-lão,* Ameixa de caboclo, Azeitona doce.
- JAMBOSA — Jambo,* J. amarelo,* J. da terra, J. moreno, J. rosa.
- MALACCENSIS — Jambo vermelho,* J. de Málaca, J. do Pará, J. encarnado, Jamalac, Jambochn.
- MICHELLI — Pitanga,* Ibiripitanga, Ibitanga, Piranga, Ubáia.
- PITANGA — Pitanga* e os apelidos da sp precedente.
- PRODIGIOSA — Jambo vermelho.
- ROTUNDIFOLIA — Murta da praia.*
- VELLOSIANA — Cambuji,* C. da praia, C. da reslinga, C. de cachorro, C. verdadeiro, Cabuji, Cabubri, Camboi, Cambuci, Cambuim, Acambuji, Goiaba do mato, Pitanga de cachorro.

EUPATORIUM BALLOTAEFOLIUM

- Maria preta verdadeira.
- DENDROIDES — Vassoura de ferro.*
- DENDROIDES var XYLOPHYLOIDES — Vassoura de ferro.*
- HACATANTHUM — Cambará.
- SQUALIDUM — Casadinho.* Erva de São Miguel.
- EUPHORBIA BRASILIENSIS — Perna de saracura.*
- HYPEROPHYLLA — Parce mas não é,* Maleite de fós largas.
- IPECACUANHA — Vid Ipeca.
- PHOSPHOREA — Cunanã,* Cumana, Cumanan,* Cunanzinho, Canapuan, Candoblé, Cipó de cunanan, C. de leite, Mandacaru de leite,* Pau de coan, P. de cunanan, P. de leite.
- PILLULIFERA — Curraleira,* Corredeira, Alcanfôr, Alcanforeira, Erva andorinha,* E. curraleira, Maleiteira, Santa Luzia.

- PROSTATA — Quebra pedra,* Arrebenta pedra.
- PULCHERRIMA — Papagáio,* Asa de arara, A. do papagáio, Cardial, Fl. de papagáio, F. do Espírito Santo, Fo de cardial, F. de papagaio, F. de sangue, Gue'a de lobo, Língua de leão, L. de sogra,* Poinsétia, Rabo de arara, Tecla.
- SERIENS — Erva de cobra,* Caá camhui.
- SPILEDENS — Dois amigos,* D. amores,* D. irmãos, Duas amigas, Beijá casados,* Casadinhos, Coroa de Nossa Senhora, C. de Nosso Senhor, Eu e tu,* Fogueira do inferno, Iaiá não me toques,* Martirio, Não me toques.
- TIRUCALLI — Aveloz,* Alve'oz, Arnica do campo, Árvore de coral de São Schistão, Coral verde, Coroa de Cristo, Dedo do diabo,* Dente de cão, Labirinto,* Mata verrugas.
- EUTERPE EDULIS — Palmito doce,* Assai da terra firme, Gessara, Jussara.*
- OLERACIA — Assai,* Açaí, Gessara, Gissara,* Grassai, Jassara, Jissara,* Jocara, Jossara, Jussara, Palmitiro, Palmito jussara,* Piná, Uassai, Uissara.
- SARMENTOSA — Titara,* Jacitara, J. açu, Palmeira cipó.
- EVEA IPECACUANHA — Ipecacoanha,* Ipecacuanha,* I. anelada, I. de Cuiabá, I. de Mato Grosso, I. do Brasil, I. oficial, I. preta, I. verdadeira, Ipeca,* Evea, Pecacuanha, Pocacuém, Pipacoanha, Poáia, P. cinzenta, P. das boticas, Ra brasileira, R. de ouro, R. vomitiva.
- EXACUM CUBENSIS — Fel da terra.*
- EXCOECARIA PALLIDA — Árvore dos mosquitos.
- EXOSTEMA AUSTRALIS — Quiniquina,* Q. do Paraná, Q. de Santa Catarina, Cauacu, Quarango.
- SAUSANUM — Quina de São Diogo,* Q. do Plauf.

F

- FAGARA RHOIFOLIA** — Tamanqueira,* Guaritá.
- FERREIREA ESPECTABILIS** — Angelim pedra,* Gracai, Sepepirana amare'a, Sucupira falsa.
- FEUILLIA TRILOBATA** — Nandiroba,* Noz vómica do Brasil, Cipó de jaboti,* Fava de Santo Inácio do Brasil, Gendiroba, Guabeba, Guaveva, Guapiva, Igarçu, Jandiroba,* Jundiroba, Pacapíu.
- FICUS ANTHELMINTICA** — Gameleira,* G. de lombrigueira,* G. do Pará, Guaxinduba brava, Guaxinguba, Caxinguba, Coajinguba, Coajunguba, Coapinguba, Lombrigueira, Mata pau,* Mulembá, Ogé, Renaco, Uapium açu, Uapuim açu.
- CARICA** — Figo,* F. verde, Figueira comum, F. de Baco, F. doméstica,* F. dos pomares, F. do reino.
- DOLIARIA** — Gameleira,* G. branca,* G. branca de purga, G. brava, G. de cansaço, G. de pinga, G. de purga,* G. legitima, G. lombrigueira,* G. mansa, G. verdadeira, Cereja de São Fidelis, Coajinguba, Coapinguba, Coaxinguba, Copau açu, Coxinguba, Cuaxinguba, Figueira do mangue, Guapoi, Guaporé, Guaxinduba, Habói, Ibapai, Mata pau, Mulembá, Quaxinguba, Uapoim açu.
- GLABRA** — Gameleira vermelha.*
- NYMPHAEFOLIA** — Gameleira,* Apuf.
- POPULEASTER** — Gameleira.*
- REPENS** — Hera brasileira,* Figueira trepadeira.
- REPENS** var **PUMILA** — Hera miuda brasileira,* Figueira trepadeira.
- RETUSA** var **NITIDA** — Figueira Benjamim,* Benjamim, Ficos.*
- FLACOURTIA RAMONTCHI** — Ameixa de Madagascar,* A. megalache, A. mombim, Ameixoa.
- FOMES SEPIATER** — Orelha de pau,* Pirongo, Tortulho.
- FOURCROYA FLAVO-VIRIDES** — Piteira imperial.*
- GIGANTEA** — Piteira,* P. brava, P. da terra, P. fedorenta, P. gigante,* Pita, P. caroatá açu, P. da terra, Piteiro, Áloes verde, Câñamo da Mauricea, Gravatá gigante, G. gordo, Grogoatá.
- MACROPHYLLA** — Piteira,* Pita, Piteiro.
- FRAGARIA VESCA** — Morango.*
- FRANCISCEA UNIFLORA** — Manacá.*
- FRIDERICIA GUILIELMA** — Cipó quebrador,* Cigana do mato.
- FUCHSIA INTEGRIFOLIA** — Brinco de princesa,* Agrados.
- FUCUS COMMUNIS** — Limo.*
- VESICOLOSUM** — Carvalhinho do mar,* Alga vesiculosa, Bodehá, Rodelhão, Cacho de pedra, Sargasso comum,* S. vesiculoso.
- FUMARIA OFFICINALIS** — Fel da terra.

G

- GALESIA GORAZEMA** — Pau d'alho.
- **SCORODODENDRUM** — Pau d'alho.* P. de mau cheiro, P. fedorento, Árvore de aího, A. que muita sede, Catinga de gambá, Cipó d'alho, Guararema, Ibiracema, Iviraréma, Jandiparana, Jandiparan-duba, Ubaeté, Ubirarema.
- GALPHIMIA BRASILIENSIS** — Tintureira,* Resedá amarelo.
- GARDENIA JASMINOIDES** — Jasmin do Cabo.*
- **FLORIDA** — Jasmin do Cabo,* J. florido, Fl. de general, Gardênia do Cabo, G. da fo grande, G. dos jardins, General.
- GARUGA PINNATA** — Camboatá de rego,* Árvore de fo parida.
- GAUTHERIA VILLOSISSIMA** — Pindaiba.
- GEISSOSPERMUM VELOSII** — Pau Percira,* P. pente, Pinguaciba, Bubá-nçu, Camará amargoso, C. do mato.
- GENIPA AMERICANA** — Genipapo,* G. branco, G. comum, G. da América, Genipa, Genipat, Cabassu (Cabaçú), Janipaba, Janipapo, Jenipapo, Jenipapo.*
- GENTIANA CENTAURIUM** — Fel da terra,* Erva de bicho.*
- GEOFREA SUPERBA** — Humari,* Mari, Marizeiro, Umari.*
- GERANIUM ERODIFOLIUM** — Malva rosa,* M. flor, M. sardinha.
- GERBERA JAMERSONII** — Gérbera,* Bússula, Margarida africana. M. de tres cores, M. do Transval, Planta bússula.
- GLADIOLUS COMMUNIS** — Palma de Santa Rita,* Espadana, E. dos montes, Gladiolo, Palma branca.
- GLAZIOVA MARTIANA** — Palmelrina de Petrópolis.*
- GLICINE HISPIDA** — Soja,* Sojeira.
- GOMPHOCARPUS BRASILIENSIS** — Algodão de seda,* Árvore de caiau, Barra, Fio de virgem, Palma de Santa Barbara, P. de seda.
- GOMPHRENA GLOBOSA** — Suspiro,* S. roxo,* Amaranto globozo,
- Amarantóide violeta, Fl. do inverno, Pernétua, P. encarnada, P. roxa.
- **GLOROSA** var **ALBIFLORA** — Suspiro branco,* Amarantóide branco, Perpétua branca.
- **HISPIDA** — Chapéu de couro.*
- **SCAPIGERA** — Rabo de perdiz.*
- GNONIORRHACHIS MARGINATA** — Itapicurú,* Itapicuro, Tapicurú, Guarabu amarelo, G. mirim.
- GOSSYPIUM BARBADENSE** — Algodão,* A. americano, A. crioulo,* A. da Costa, A. da Guiné, A. fo de parreira, Algodoeiro, Amanuís, Minuís, Vareque, Xiló.
- **HIRSUTUM** — Algodão,* Algodoeiro, Vareque, Xiló.
- **RELIGIOSUM** — Algodão,* A. cravo, Algodoeiro, Vareque, Xiló.
- GREVILLIA ROBUSTA** — Grevília,* Gravília.
- GRIFFINIA PARVIFLORA** — Cebola do mato, C. brava, Cebolinha do campo.
- GUADUA ANGUSTIFOLIA** — Taquara, Caniço.
- **SUPERBA** — Taquara, Taquaruçú, Pixiriecú.
- GUAREA TRICHILIOIDES** — Billreiro,* Birreiro, Árvore carrapeta, Itauba, Calcanhar de cotia, Camboatá, Cangerana miuda, Carrapeta, C. verdadeira, Carrapetiro, Cedro branco, Cedrorana, Cragoatá, Gitó, G. mirim, G. utauba, Guarebu, Itó, Jatauba, Jitó, J. mirim, Jatuaba, J. branca, Jatuamba, Jatutuba, Jatuuba, J. branca, Macuqueiro, Marinheiro do mato, Nogueira do mato, Pau bala, P. de sabão, P. sândalo, Sândalo do Pará, Tau, Tauba, Tauva, Utuaba, Utuamba, Utuambé.
- GUAZUMA ULMIFOLIA** — Mutamba,* Matamba, Mata tamba, Matombo, Motamba, Motambo, Mucungo, Mutambo, Mutombo, Araticum bravo, Ata brava, Buxuma, Camacan, Cambá-acan-acá, Embirú, Envireira do campo, Guaxíma macho, G. torcida, Guazuma, Ibxumá, Imbiri, Imbiriba, Nabombo, Pau de mutamba, Pojo, Ibixuma.

GUETTARDA ANGELICA — Angélica do mato,* A. brava, A. cheirosa, A. do norte, A. do sertão, A. mansa, Canela do campo, Catinga de cheiro, Ra de Angélica, Sucena, Sucupira preta.

—**URUGUAYENSIS** — Veludinha,* Veludinho.

GUILIELMA INSIGNIS — Babu-
nha,* Ceriba, Piraguai, Pirajão,
Pirijão.

GUSTAVIA ANGUSTIFOLIA — Pau
fedorento,* Jandiparana, Janipara-
na, Janiparanduba, Janipuaran-
duba.

GYMNOPOGON RADIATUS — Ca-
pim pé de galinha,* Grama de Cam-
pinas.

GYNERIUM ARGENTEUM — Ca-
pim dos pampas,* C. dos capoeirões,
C. penacho, Cana dos pampas, C.
tinga, Erva dos pampas, Palha de
penacho, Penacho branco, P. de ca-
pim, Pluma, P. de capim.

—**PARVIFLORUM** — Ubá,* Cana
do rio, C. flecha,* C. ubá, Frecha,
Parimá, Pau de flecha.

—**SAGITTATUM** — Cana frechá,* C.
flecha,* C. de flecha, Capim de fre-
cha, Ariná, Eguaíá, Flecha, F. ver-
dadeira, Flecheira, Ubá.

H

HAEMANTHUS COCCINEUS — Coroa de Moçambique,* C. do rei de Moçambique, C. imperial, Diadema, D. real, Tulipa do Cabo,* T. do campo.

HANCORNIA SPECIOSA — Mangaíba,* Mangabeira.* Mangaíba, Timbiucatinga, Timbiucatú.

HEDYCHIUM CORONARIUM — Lírio do brejo,* L. de Petrópolis, Lágrima de moça, Borboleta,* B. do brejo, Cardamomo do brejo, C. do mato, Escaidamão, Fl. de lis, Jasmim borboleta, J. do brejo, Napoléon, Narciso, N. branco,* Ninfeta, Olímpia.

—FLAVESCENS — Borboleta amarela.*

—BARBATUM — Barbadinho,* Barbadão, Carrapicho barbadinho.

HELIANTHUS ANNUUS — Girassol,* Gira sol, Heliano, Helianto.

—TUBEROSUS — Topinambo,* Topinambô, Topinambor,* T. batata, T. batateiro, Tupinambor,* Alcachofra da terra, A. de Jerusalém, A. do Canadá, Batata tupinambá, Graxsôl de batata, G. do Canadá, G. tuberoso.

HELICINIA PENDULA — Passavaria.*

HELICONIA BIHAI — Bananeira do mato,* Biai, Pacova brava.

—BRASILIENSIS — Bananeirinha do mato,* B. da Jamáica, Bananeira brava, Sororoquinha.

—PSITACORUM — Bananeirinha do mato,* B. papagáio, Pacova catincha, Sororoca.

HELICTERES SACARROLHA — Sacarrolha,* Guasuma branca, Imbira brava, I. do mato, Parafuso, Rosca de mula, R. para mulas, Rosquinha do campo, Vuarame.

HELIOPHYTUM CURASSAVICUM — Crista de galo.*

HELLIOTROPIUM ELLIPTICUM — Azulão.*

—ELONGATUM — Aguaraquinhá,* Aguaraquiunha, Crista de galo, Erva ferro, Fedegoso do mato, F. verdadeiro, Jagoraquinhá.

—FOETIDUM — Crista de galo,* C. de galo fedorenta,* Cravo de uru-

bú, Aguaracuinha açú, Aguaraquinhá, Aguaraquiunha, Borracha brava, Borragem brava, Burracha, Fedegoso, F. bravo, F. de Pernambuco, Heliotrópio inculto, Tureroque, Turiri.

—INDICUM — Borragem brava,* Cravo de urubú, Fedegoso do Pará, Tureroque, Turiri.

—PERUVIANUM — Heliotrópio,* Heliotropo, Bálamo de chuíro,* Baunilha do Peru, B. dos jardins, Fl. de baunilha, Jaspe sanguíneo.

HEMIGRAPHIS COLORATA — Capela,* Biscut.

HERRERIA SALSAPARRILHA — Japecanga,* Japicanga, Bombaina, Cipó de japecanga, Salsaparrilha,* S. de botica, S. do rio.

HETEROPTERYS PRAGUA — Vida ipca, Praguá.*

HEVEA BRASILIENSIS — Seringa,* Seringueira,* S. boa, S. branca, S. de borracha, S. fo de maniva, S. rosada, S. roxa, Árvore da goma elástica, Hévea.* Pau moeda, P. seringa.

HIBISCUS ABELMOSCHUS — Quiabo de cheiro,* Q. quingombô, Quiarata de cheiro, Quingombô,* Q. de cheiro, Ambrete, Musquié, Rosa almiscaráda.

—AFRICANUS — Quiabo.*

—BIFURCATUS — Algodão do brejo,* A. bravo, Amandurana, Fanfã, Fanfan, Majorana, Malva vinagreira, Mamorana, Mata cabras, M. pinto, Quiaborana, Uscima do brejo, Vinagreira do campo.

—CANNABINUS — Papoula do São Francisco,* Cânhamo americano, C. brasileiro, C. de Bombaim, C. Perriene, Juta brasileira, J. nacional, Malva do São Francisco,* Umbaru.

—ESCULENTUS — Quiabo,* Q. branco, Quiabeiro,* Quiabeno, Quilobô, Calalu, Gombô, Nafé, Obra.

—ESCULENTUS var **LONGUS** —

Quiabo chifre de veado,* Q. comprido, Quigombô.

—FURCELLATUS — Algodão bravo.

—MOLLEOIDES — Bríneo de príncesa,* B. de rainha.

- **MUTABILIS** — Papoula de duas cores, P. de tres cores.* Amor de homem, Firmeza dos homens, Inconstante, Rosa cambiante de Calenna, R. da China, R. de Caïena, R. de São Francisco, R. louca, R. pau-lista.

— **ROSA-SINENSIS** — Graxa,* G. de estudante, Goela de leão, Graça, Castiçal do inferno, Fl. de engraxate, F. de graxa, F. de sapato, F. da Oceania, Inconstante amante, Lâmpada eétrica, Limpa sapatos, Mimo de Vénus,* Rosa da China, R. graxa, Sapateira.

— **ROSA-SINENSIS** var **FULGENS** — Graxa* (dobrada).

— **ROSA-SINENSIS** var **ZEBRINUS** — Graxa (rajada).

— **SABDARIFFA** — Rosela,* R. sorrel, Azeda da Guiné, Azedas, Aze da vermelha, Carurú azedo, C. da Guiné, Quiabo azedo, Q. de Angola, Q. roxo, Vinagreira.*

— **SCHISOPETALUS** — Lustre.*

— **SCUISOPHYLLUS** — Lustre,* Campanhia, Candelabro,* Coroa de bicho, Lanterna.

— **SYRIACUS** — Malva rosa,* Limpa sapatos, Rosa da Síria.

— **TILLIACEUS** — Algodão da praia,* Algodoeiro da praia, A. de Índia, A. do mangue, Amandurana, Bola, Guapicum, Guaxima, G. da praia, G. do mangue, Pau cortiça, Quiabo do mangue, Uaçima da praia.

HIMANTHUS OBOVATA — Janau-ba.*

HIPPEASTRUM EQUESTRE — Cebola berrante,* Açucena.

— **PROCERUM** — Fl. da imperatriz, Açucena.

HIRTELLA AMERICANA — Macucurana,* Macacu, Macé de fogo, Macucu, Mucucurana, Ajurana, Ajurú, Pau macaco.

— **CILIATA** — Ajeurarana.*

— **MARTIANA** — Comandatuba,* Ajurana, Ajurú.

— **TRIANDRA** — Macucurana,* Leitinho.

HOMALOCENCHRUS HEXANDRUS — Arroz bravo,* A. de espinho, A. de Goiana, A. do México, A. silvestre, Arrozinho.*

HORDEUM VULGARE — Cevada.*

HOYA CARNOSA — Flor de cera.*

— **CORIACEA** — Flor de cera.*

— **VARIEGATA** — Flor de cera.*

— **VIRIDOSA** — Flor de cera.*

HURA CREPITANS — Assacu,* Arreiro, Ou-sacu, Uassacu.

HYACINTHUS ORIENTALIS — Jacinto,* Hiacinto.

HYDRAGEA HORTENSIA — Hortênsia,* Novelos da China, Rosa do Japão.

— **JAPONICA** — Mortênsia,* Rosa do Japão.

HYDROCOTYLE ASIÁTICA — Cai-russú* (Cairuquí), Codagem, Coairu-cú, Beví aqua, Puncado, Pata de cavalo, Pé de cavalo, P. de elefante, Valarai.

— **LEUCOCEPHALA** — Erva capitão da miuda,* Aceriçoba da miuda,* Orelha de onça da miuda, O. de onça rasteira.

— **PUSILA** — Erva capitão.*

— **UMBELLATA** — Erva capitão,* Acacioba, Acerariçoba,* Aceriçaba, Aceriçoba, Aeariraba, Capitão, Cicuta, C. falsa.

HYDROLEA SPINOSA — Carqueja do pântano,* C. do brejo, Bacanta, Bacnida, Cega oho.

HYMENAEA COURBARIL — Jatai,* J. açu, J. grande, Jataiba, J. mondé, J. peba, J. uba, J. uva, Jatauba, Jatei, Jaté, Jati, Jassi, Jatobá,* J. de anta, J. de porco, J. trapuca, J. verdadeiro, Jatubá, Jetai, J. de Pernambuco, Jetaiba, Jetaibo, Jetaicé, Jetajuba, Jetus peba, Jupati, Jutai, Abati, A. timbni, A. copal do Brasil, Árvore copal, Conai, C. americano, C. do Brasil, Ibiuva, G'co de Jatai, Quebra machado, Trapuca.

— **OLFERSIANA** — Jatobá capão.*

— **STIGNOCARPA** — Jatobá capão,* J. de casca fina, J. de catinga, J. do campo, J. verdadeiro, Jati, Jaboticira, Jetai do Piau.

HYPARRHERIA RUFA — Capim Jaraguá,* C. provisório, C. vermelho, Jaraguá, Pasto branco, Ponta de lança, Sapé gigante.

HYPOLYTRUM SCHRADERIANUM — Capim navalheira,* Navalha, N. de macaco,* N. de mico, Navalheira.

HYPTIS MULTIFLORA — Betônia,* Batônia, Batônica, Betônica.

— **PECTINATA** — Neves,* Maché, Poejo do brejo, Mercúrio do campo.

— **SUAVEOLENS** — Mentrasto muçu,* M. do grande, Melissa de Piñon.

— **UMBROSA** — Bamburral.*

- ICHNANTHUS BAMBUSIFLORUS** — Andrequicé,* Arroz de Caiona, Cana de passarinho, Capim andraquecê, C. andrequicé, Ceneuaua, Fo larga, Mal-me-quer grande, Pé de periquito.
- CANDICANS** — Capim papuã,* C. papuan,* C. papuano, Papuã, P. verdadeiro, Papuira.
- ILEX AFFINIS** — Congonha de Goiaz,* C. do campo, Caá-chi, Mate bandido, M. do Rio, M. espúrio, M. falso.
- AFFINIS** var **GENULINA** — Congonha de Goiaz,* Caá-chi.
- APOLLONIS** — Congonha da Bahia.*
- CONOCARPA** — Congonha dos campos,* Catuaba do mato.
- THEEZANS** — Congonha do Rio,* C. do mato, Cananna amargosa, Chá do Rio, Cravo do mato, Mate do Rio.
- ILLICIUM ANIZATUM** — Aniz estre'ado,* A. da China, A. da Pérsia, Badiana,* B. da China, Funcho, F. da China.
- IMPATIENS BALSAMINA** — Beijo de frade,* Balsamina, Ciumes, Erva impaciente, E. não me toques, Não me toques.
- SULTANA** — Mariquinha sem vergonha,* Mariquinha sem vergonha, Alegria do 'ar, Beijo de freira.*
- IMPERATA BRASILIENSIS** — Capim sapé,* C. agreste, C. peba, Canipeba, Agreste, Grama do Pará, Jarapé, Jucapé, Massapé, Sapé, S. macho, S. verdadeiro.
- CONTRACTA** — Capim sapé macho,* Sucapé.
- INDIGOFERA TINTORIA** — Anil,* A. roxo, A. verdadeiro,* Andu d-mato, Caá-chira, C.-vu, C.-varana, Erva anil, Guajaná timbó, Gurai timbó, Indigofera, Timbó mirim, Tinta dos gentios.
- INGA BAHIENSIS** — Inga-i,* I. amarelo, I. de quatro fos, I.-é, I. mimoso, Ingá.
- CYLINDRICA** — Ingá mirism.*
- CINNAMOMEA** — Ingaçu,* Ingá-açu,* I. grande, I. maaseo.
- EDULIS** — Ingá,* I. cipó, I. doce, I. opeapitiba, I. rabo de mico, I. timbó, I. verdadeira,* Engá.
- FAGIFOLIA** — Mococona,* Ingá cururú, I. mococona.*
- SESSILIS** — Ingá ferradura,* I. arqueado.
- ZALMANN** — Mococona, Ingá mococona.
- IPOMOEA BATATAS** — Batata doce,* B. doce da branca, B. caína, B. da ilha, B. da terra, B. de Ango'a, Erva moura tuberosa, Jetica,* J.-agu, Jeticuá, Jetique, Jetuca, Jetica.
- BATATAS** var **INDIVISA** — Batata doce de fo redonda.
- BATATAS** var **LEUCORHIZA** — Batata doce,* B. doce branca.*
- BATATAS** var **PORPHYRORHIZA** — Batata doce de Angola, B. doce verme'ha, B. roxa.*
- BATATOIDES** — Cipó de batata.*
- BONA-NOX** — Boa noite,* Boas noites, Cipó café, Fl da lua, F. da noite, F. do norte, Jetirana branca,* Mensageira da noite.
- BRASILIANA** — Campainha.
- FISTULOSA** — Canudo,* Algodão bravo, A. do pantanal, A. dos pântanos, Campainha de canudo,* C. rósea, Majorana, Mata cabras, M. pinto, Salsa branca.
- GLAZIOWI** — Fl de pau,* F. de couro, F. de madeira, Campainha de ouro, Cipó Brasil.
- HORSFALLIAE** — Campainha verme'ha,* C. purpúrea.
- HORSFALLIAE** var **ALBA** — Campainha.
- LONGICUSPIS** — Campainha azul,* Fl de São João.
- OPERCULATA** — Batata de purga,* Escamones da América, Purga de batata,* P. de Amaro Leite, Ra de jeticuá.
- PES-CAPREA** — Salsa da praia,* Batata da praia, B. do mar, Batateira, Campainha branca, Cipó da praia, Mate-me embora da praia, Pé de cabra, Soldanelha, Zarza.
- PURPUREA** — Bons dias,* Adeláide, Adelaidinha, Campainha, C. purpúreas.

- **QUAMOCLIT** — Primavera,* Fl de cardial,* Primula, Quamóclito.
- **SANFRANCISCANA** — Canudo er-bácia.*
- **SINUATA** — Jalapinha.*
- IRESINE HERBSTII** — Coração ma-goadado,* C. de Maria, Orelha de coelho.
- **PORTULACOIDES** — Capotira-guá,* Capim do salgado,* Pirixi.
- IRIARTEA EXORHIZA** — Paxluba,* Baxiuba, Castiçal.*
- IRIS FLORENTINA** — Lírio floren-tino.

- **GERMANICA** — Lírio, L. roxo dos campos.
- **PUMILLA** — Lírio japonês.*
- ISCHNOSIPHON ARUMAM** — Aru-mam.*
- ISOTOMA LONGIFLORA** — Arre-benta cavalo,* A. boi, Erva de lei-te, Jasmim da Itália.
- IXORA STRITA** — Alfinetes de noiva,* Buquê de noiva, Fl de coral, F. de noiva, Jasmim coral, J. de São José, J. imperial, J. vermelho, Ixora.

J

- JACARANDA BRASILIANA** — Caroba,* Caraubeira, Caviuna, Copáia, Jacaranda verdadeiro, Pará-pará. Ximbó.
- CAROBA** — Carobinha do carrago,* Camboatan pequeno, Camboté, Carobinha, Jacaranda.
- MIMOSAEFOLIA** — Caroba guaçu,* Jacaranda da fl̄ roxa, J. caroba, J. mimoso,* J. roxo, Palissandra.
- NITIDA** — Caroba,* Copáia.
- OBOVATA** — Caroba preta.*
- PAUCIFOLIATA** — Caroba do campo,* Jacaré da serra.
- JACQUINIA ARMILLARIS** — Barbasco.*
- JARACATIA SPINOSA** — Jaracatiá,* J. sete fós, Jacaratá,* Jacatiá, Chamburi, Chambarú, Ibirube, Mamão bravo, M. de espinho, M. do mato, M. l, M. jaracatiá, Mamãozinho do mato, Mamota.
- JASMINUM ASORICUM** var **BAHIENSIS** — Jasmim da Bahia,* J. de Espanha, J. do Rio, J. dos Aços, J. real.
- FLORIBUNDUM** — Jasmim da Itália.*
- GRANDIFLORUM** — Jasmim da Itália.*
- ODORANTISSIMUM** — Jasmim.*
- SAMBAC** — Bogari,* Bugarim,* B. miudo, Jasmim bogari, Mogarim, Mosqueta, Sambac.

- JATROPHA CURCAS** — Pinhão de purga,* P. branco,* P. bravo, P. croá, P. das Barbadas, P. de cerca, P. do mato, P. do Paraguai, P. purga, Pião, Purgueira, Feijão do Peru, Figo do inferno, Mandiú guaçu, Mandubí guaçu, Mundubi guaçu, Mandutí guaçu, Manfui guaçu.*
- GOSSIPIFOLIUM** — Pinhão roxo.*
- ELLIPTICA** — Teju.*
- MULTIFIDA** — Fl̄ de coral,* Jam-pa.
- URENS** — Cansanção de leite.* Arre diabo, Pinão, P. pina, Pinha quelmadeira, Urtiga cansanção,* U. de mamão.
- VITIFOLIA** — Cansanção de leite.*
- JOANNESIA PRINCEPS** — Andá açu,* Andá, A.-çu, Andá guaçu, Andaz, Boeita, Castanha de arara, Câco de gentio, C. de purga, Comandu-açu, Cotieira, Fruta de arara, F. de cotia,* F. de purga, Indaí-açu, I. guaçu, Indai-açu, Noz de bugre, Paulista, Purga de cavalo, P. de gentio,* P. dos paulistas.
- JONIDIUM IPECACUANHA** — Ipecacuanha,* Poáia da praia, Violeta vomitiva.
- JIUSSIEUA LINIFERA** — Cravina d'água,* C. de lagartixa.
- PILOSA** — Cruz de Malta,* Camarambáia, Mão de sapo.
- REFENS** — Cruz de Malta.*
- SUFFRUTICOSA** — Cruz de Malta.*

K

KALANCHOE TUBIFLORA — Cacto japonês.*

KEMPFERIA CALANGA — Calanga do Japão,* C. da China, Cananga do Japão,* C. pequena, C. verdeira, Galanga.

KIELMEYERA EXCELSA — Vasa matéria,* Caga matéria,* Catugi,* Folha santa.

—**SPECIOSA** — Malva do campo.*

KRAMERIA ARGENTEA — Ratainha,* Ratânia,* Ratanha, R. da terra, R. do Ceará, R. do Pará, Carrapicho do Ceará.

KILLINGA ODORATA — Capim santo,* C. barata, C. ossá, C. leve, C. marinho, Jacapé, Juçapé, Capimonga.

—**PUMILLA** — Capim de um só botão.*

—**PUNGENS** — Capim camelô.*

L

- LACIACIS SORGHOIDES** — Taboquinha,* Taquarinha, Andrequicé, Cana de passarinho.
- LACUMA CAIMITO** — Abio,* Abi, A.-iba, Abieiro, Abiorama.
- LADEMBERGIA HEXANDRA** — Quina rosa.*
- LAELIA CRISPA** — Orquídea.
- PURPURATA** — Palma de chico-te,* Orquídea.
- LAETIA APETALA** — Pau piranha.*
- LAFOENSIA GLYPTOCARPA** — Merendiba rosa.*
- SESSIFOLIA** — Pacari,* P. da mata, P. se'vagem, Candeia de caju, Copinho, Dedal, D. do mato, D. de dama, Dedaleira, D. amarela, Erva dedal, Jacarandá capitão, Mangaba brava, Pau de dedal.
- LAGENARIA VULGARIS** — Abóbora d'agua,* A. branca,* A. cabeca, A. verde, Cabaça de romeiro, Gremuê, Tacuera.
- LAGERSTROEMIA FLOS-REGINA** — Norma,* Escumiha, Extremosa,* Loucura, Mimosa dos jardins, Minerva dos jardins.
- LAGUNCULARIA RACEMOSA** — Mangue amarelo,* M. seco, M. seriba,* Árvore do carangueijo, Cana pauba, C. pauva, C. ponga, Guapira, Pau de carangueijo, Tinteira.
- LANDENBERGIA HEXANDRA** — Quina rosa.*
- LANTANA ACULEATA** — Cambará vermeiho,* C. de cheiro, C. de chumbo, C. de espinho,* C. juba, C. miudo, C. verdadeiro, Capitão do campo, Salsa brava, Uauba camará, Xambi.
- BRASILIENSIS** — Cambará branco,* C. de meia legua, C. de lixa, C. tinga, Capitão do campo, Pau de lixa, Ruim, Xumbí.
- CAMARA** — Cambará,* C. de espinho, C. vermelho, Camatá, Balieira preta, Chumbinho roxo, Lantana, Ruim, Salsa brava, Ximbí.
- MACROPHYLLA** — Cambará da fo grande,* C. do mato.
- MICROPHYLLA** — Alecrim brava,* A. do tambo.

- MUTABILIS** — Cambará,* C. de duas cores,* Camará.
- RADULA** — Cambará.*
- UNDULATA** — Cambará.*
- LAPPA TOMENTOSA** — Bardana,* B. maior, Boldrana.
- LATHYRUS ACUTIFOLIUS** — Comandá.*
- ODORATUS** — Ervilha de cheiro.*
- PALUSTRIS** — Comandá do brejo.*
- SERICEUS** — Comandá.*
- STIPULARIS** — Comendá.*
- LATUCA SATIVA** — Alface,* A. comum,* A. cultivada, Leituca, Tridácio.
- SATIVA** var **CAPITATA** — Alface repolhuda.*
- SATIVA** var **CAPITATA-CRISPA** — Alface paulista.*
- SATIVA** var **ROTUNDIFOLIA** — Alface ore'ha de burro,* A. ore'ha de mula.
- SATIVA** var **LONGIFOLIA** — Alface romana.*
- LAURUS CINNAMOMUM** — Canela,* C. de Ceilão, Caneleira da Índia.
- LAVANDULA SPICA** — Alfazema,* Árvore da castidade, A. da pimenta, Lavando.
- LAWSONIA INERMIS** — Resedá falso.*
- LECYTHIS ANGUSTIFOLIA** — Sapucáia pequena,* Árvore da combuca, A. de caçamba, Combuca, C. de macaco, Rochuchú.
- ELLIPTICA** — Sapucairana,* Sapuperna.
- LANCIOLATA** — Matá-matá,* Sapucáia branca, S. mirim, S. pequena, Sapuaiú.
- OLLARIA** — Inhaiba.*
- PISONIS** — Sapucáia,* S.-açu, S. de castanha, S. grande, Sapucai, Sapucáia, Sabucaja, Árvore da combuca, A. da caçamba, Caçamba do mato, Castanha sapucáia,* Combucá de macaco,* Embira de jacuíbá, Fruta de macaco, Fruto de caçamba, Jaçapucáia, Jaçapucam, Jaçapucari, Jecuibá, Juquetibá, Marmita de macaco,* Pau caixão, P. car-

- ga, Quatelê, Ruchuchú, Sapucáia de castana, Zabucal, Zabucháia.
- LEMNA GIBBA** — Lentilha d'água.*
- LEONOTIS NEPETAEFOLIA** — Cordão de frade,* C. de São Francisco, C. de São Francisco grande, Cauda de leão, Agripalma, Rubim, Tolonga.
- LEONTODON TARAXACUM** — Dente de leão,* Alfase de cão.
- LEONURUS SIBIRICUS** — Erva Macaé,* E. das lavadeiras, E. de São Francisco, E. dos zangões, Cordão de São Francisco do pequeno, C. de S. Francisco roxo, Leonuro, Marroio, Quina dos pobres.
- LEOPOLDINA PIAÇABA** — Piagava,* Piassava.*
- LEPIDIUM BONARIENSIS** — Mastroço.*
- RUDERALE** — Mastroço do sul,* M. bravo, M. silvestre, Mastroz, Matri, Matruz.*
- LEPIDOSPERMA OFFICINALIS** — Junco de cangalha,* Capim indígena.
- LEPTOCORYPHIUM LANATUM** — Capim zaranza.*
- LESPEDEZA STRIATA** — Trevo do Japão.*
- LEUCAS MARTINICENSIS** — Cordão de frade,* Catinga de mulata, Cauda de leão, Erva dos Santos Filho, Pau de Braga, P. de Praga, Rubim, Tolonga.
- LICANIA DEALBATA** — Fruta de vaqueiro,* Manjar grude, M. grudo.
- HETEROMORPHA** — Macuco,* Leitinho, Pau macaco.
- RIGIDA** — Oiticica,* O. verdadeira, Oiti bêbado, O. cagão, O. da beira do rio.
- SCLEROHYLLA** — Caraipé verdadeiro,* Oiticica, Rapadura.
- UTILIS** — Caraipé verdadeiro,* Canela rapadura, Caripé, C. verdadeiro.
- LILIUM CANDIDUM** — Lírio dos poetas,* L. branco, Açucena branca,* Fl. de lis.
- LIMNANTHEMUM PELTATUM** — Água pé, Uapé.
- LIMONIA TRIFOLIATA** — Limão-sino de jardim.*
- LINDERNIA CRUSTATA** — Douradinha do campo,* D. do Pará, Botica inteira, Don Bernardes, Gritadeira do campo, Mata cana, Matucana, Orelha de rato.
- DIFFUSA** — Douradinha,* Dourada, Caá-atála, Gritadeira do cam-
- po, Matucana, Papaterra, Samambáia douradinha.
- LIPPIA LYCIOIDES** — Cedron,* Cedrão, Cidrilha, C. branca, Cidró, Cidron, Cleta, Doce lima, Erva Heloisa, E. Luiza, Lucia lima, Verbenaria cidrada.
- MICROPHYLLA** — Alecrim do campo.*
- SP.** — Canela de cachorro.*
- THYMOIDES** — Alecrim do campo.*
- URTICOIDES** — Pau de lixa.*
- LISIANTHUS PENDULUS** — Geneciana.*
- LITHRAE MOLLEOIDES** — Aroeirinha,* Aroeira branca, A. brava, A. de capocina.
- LIVISTONA OLIVAEFORMIS** — Lestivista.*
- LOASA PARVIFLORA** — Cansanção.*
- LONCHOCARPUS CAMPESTRE** — Grifio.*
- LONICERA CAPRIFOLIUM** — Madre silva,* M. silva dos jardins, M. silva trepadeira, Chupa mel, Lonicera.
- LUCUMA CHRYSOPHYLLOIDES** — Turubá.
- PROCERA** — Maçaranduba,* M. branca, M. verdadeira, Maçarandiba, Maçaranduva, Mussuranduba, Aparaíó, Apraiú, Árvore da vaca, Chauá, Enquiri, Paraju, Pau de vaca.
- LUDWIGIA CAPAROSA** — Caparaça.*
- LUFFA ACUTANGULA** — Bucha de purga,* B. de João Paes, B. dos campistas, B. fedorenta, B. pepino, Lufa.
- CYLINDRICA** — Bucha,* B. comum,* B. chuchú, B. dos caçadores, B. dos paulistas, B. dos pescadores, Buchinha do norte, Erva ferro, Esfregão, Esponja, Fruta de cotia, F. dos paulistas, Lufa.
- CYLINDRICA** var **LONGA** — Bucha de metro,* B. gigante, Esponjin, E. gigante.
- OPERCULATA** — Buchinha,* Aborinha do norte, Cabacinha, Cabacinho, Lufa, Purga de bucha,* P. de jalapa,* P. dos paulistas.
- PURGANS** — Buchinha.*
- LUHEA GRANDIFLORA** — Ivitanga,* Ibitinga, Iratingui, Ivatinga, Açoite cavalo,* A. cavalo branco, Açoite de cavalo, Batinga, Caá-vitinga, Enxota, Estriveira, Jarandeu, Matamba preta, Mutamba preta, Papeagaçu, Salta cavalo, Soita

cavalo, Uabatinga, Ubatinga, Uvatingsa, Vatinga.
—**OCHROPHYLLA** — Açoita cavalo.*
—**PANICULATA** — Açoita cavalo.*
LUZIOLA BAHIENSIS — Arroz do brejo,* A. das aguas, A. palustre, A. silvestre, Camalotinho, Capim arroz.

—**PERUVIANA** — Arroz do brejo.*
LYCOPodium CERNUUM — Pinheirinho,* P. dos campos, Palma de São João, Pé de macaco, Enxofre vegetal, Froco, Licopódio brasileiro,* L. indígena, Santa cruz.
—**POLYMORPHUM** — Samambája,* Cipoengo.
LYGODIUM POLYMORPHUM — Samambaia.

M

MABEA FISTULOSA — Canudo de pito,* C. de cachimbo, C. de São João, Chupa mei, Mamona do mato, Pitáira, Piteiro.

MACAIREA SERICEA — Capuchinha,* Capucina.

MACHAERIUM ALLEMANNI — Jacarandá rosa,* J. atan, J. bagre, J. puitán, J. tan, J. vermelho.

ANGUSTIFOLIUM — Sete casacas,* Árvore dos borrhachudos, Bico de pato, Camboatan mosquiteiro, C. sete casacas, Guaretá, Guarimbú, Jacarandá bico de pato,* J. sete casacas, Mosquiteiro, Pequiá de pedra.

FIRMUM — Jacarandá roxo,* J. pardo.

INCORRUPTIBILE — Jacarandá negro,* J. cabiuna, J. preto, J. verdadeiro,* Guaximbé, Guaximbí.

SP. — Itapicuru preto, Carrancudo.

VIOLACEUM — Jacarandá violeta.*

MACHONIA BRASILIENSIS — Ipeca, I. falsa.

MACLURA TINCTORIA — Tatajiba,* T. do brejo, Taginuva, Taguagiba, Tajiba, Tajira, Tataguba, Tataiba, T. de espinho, T. de tinta, Tataíba, T. do brejo, Tatajoba, Tatajuba,* Tatajuva, T. de espinho. T. do brejo, Tatarema, Tatauba, Amoreira de espinho,* Bagaceira, Cuba, Espinheiro branco, Fustete, Moreira amarela, Pau Brasil amarelo, P. de fogo, Pau laranja, Uaziuba.

MACOUBEA GUIANENSIS — Pequiá,* P. bravo, Piquiá, Piquicé, Petiá, Pau de espeto, Souari.

MACROLOBIUM BIFLORUM — Vid Ipê.

HYMENAEOIDES — Vid Ipê.

MAGNOLIA CHAMPACA — Magnolia amarela,* M. de Java, M. de Petrópolis.

GRANDIFLORA — Magnolia Branca,* M. comum, M. da Carolina, M. da fl grande, M. grande, Loureiro tulipa.

PUMILA — Magnólia pequena,* M. da fl pequena, M. lirio, M. miúda.

MAGONIA GLABATA — Tingui capeta,* T. de coia, T. peba, Timbó peba.

MALPIGHIA COCCINIFERA — Carrasquinha,* Cereja das Antilhas.

VERBASCIFOLIA — Murici guaçu.*

VERBASCIFOLIA var **INTERMEDIA** — Murici guaçu,* M. pequeno, M. grande, M. rasteiro, Donradinha falsa.

VERBASCIFOLIA var **LEIOCARPA** — Murici guaçu,* M. casendo, M. do mato, M. grande, M. rasteiro.

VERBASCIFOLIA var **VILLOSA** — Muric* gunçu.*

MALVA SILVESTRE — Malva,* M. de terra, M. das hortas, M. de caça, M. maior.

MAMMEA AMERICANA — Abricotó,* A. de São Domingos, A. do Norte, A. do Pará,* A. selvagem, Abricotete, Abricotereiro, Mamei, Pêcego de São Domingos.

MANETTIA CORDIFOLIA — Ipeca.

IGNITA — Poáia da praia,* P. de eipó, P. de Minas, P. do rio, Ipecaonha.

MANGIFERA INDICA — Manga,* Mango, Mangueira.*

MANIHOT CUNNEATA — Maniçoba.*

DICHOTOMICA — Maniçoba de Jequié.*

DULCIS — Aipi,* Aipim,* Cogumagu mirim, Macaxeira, Macaxéra,* Macuxera, Manibuna, Mandioca ai-pi, M. branca, M. doce, M. mansa, Manibaru, Maniba tatu, Manipipoca.

DULCIS var **PALMAT** — Alpim cacau.*

FERRUGINIA — Maniçoba.*

GLAZIOVII — Maniçoba,* M. do Ceará.*

HARMONICA — Maniçoba.*

HEPTAPHYLLA — Maniçoba de São Francisco.*

LIRATA — Maniçoba.*

- MICRODENDRON — Manicoba.*
 —PIJAIENSIS — Manicoba do Piau.*
 —ROTUNDA — Manicoba.*
 —TRIPHOLIATA — Manicoba.*
 —UTILISSIMA — Mandioca,* M. amarga.* M. brava, M. venenosa, M. vermeira, Manaibaru, Manalbucú, Mandiba, Mandiva, Manioca, Manipeba, Manitinga, Maniva, Casava, Janiva, Pão do Chile, Pará-pará, Sertan.
MARANTA ARUNDINACIA — Araruta,* Agoutiguepe.
MARCGRAVIA POLYANTHA - Dra-gona.*
MARISCUS JACQUINI — Cálamo bravo.*
 —RUFUS — Capim serra,* C. de botão grande, Mandibá, Mandivú.
MARLIERIA EDULIS — Cambucá,* C. amarelo, C. verdadeiro, Cambucéf. Coá puca, Cambucazeiro.
MARTINESIA CARYOTIFOLIA — Praxiuba magacrona.*
MATAYBA GUYANENSIS — Cambocata branco.*
MATRICARIA AMERICANA — Maecla.* M. da terra, Matricária americana.
 —CAMOMILLA — Maecla galega,* M. francesa, Camomila vulgar, Matricária americana.
MAURITIA ARMATA — Buriti bravo,* B. mirim, B. nana, Buritirana.
 —FLEXUOSA — Buriti do brejo,* Meriti.
 —VINIFERA — Buriti,* Brutí, Carandá guaçu, Carandas, Coqueiro buriti, Meriti, Muriti.
MAXIMILIANA REGIA — Inajá,* Anná.
MAYTENUS ILLICIFOLIA — Mai-teno,* Canerosa, Caromilho, Congorça, Coromilho do campo, Espinheira santa, Espinho de Deus, Pau murta, Sombra de touro.
 —OBSUSIFOLIUS — Carne de anta,* Congonha brava, C. brava da fomiuda, Lenha branca, Limãozinho, Sobre.
 —RIGIDUS — Pau de colher,* P. de arara, Bom homem.
MEDICAGO SATIVA — Alfafa,* Alfalfa, Luzerna.
MEIBOMIA AFFINIS — Carrapicho,* Carrapicho, Amores do campo sujo.
 —AXILARIS — Amendoeirana,* Mandubira.
 —BARBATA — Barbadinho,* Barbadão.

- DISCOLOR — Marmelada de cava-lo,* Amores.
 —MOLLIS — Carrapicho.
 —SUBSECUNDA — Carrapicho.
 —SUPINA — Amores de vaqueiro,* Carrapicho.
 —TRIFOLIA — Trevinho do campo.*
MELANOXILON BRAUNA — Barauna,* Barauninha, Bimbeira, Brauna, Coração de negro, Garauna, G. da moda, Guarauna, G. preta, Guirauna, Ihirauna, Ipá taruman, Maria preta da mata, M. pretas do mato, Muiraruna, Parova preta, Perovauna, Ferovauna, Ubirarana, Ubirauna.
MELIA AZEDARACH — Sabonete de so'dado,* Santa Bárbara, Sicóromo bastardo, Amargoseira, Arvore dos rosários, A. santa, Caneleiro grego, Cinamomo, Jasmin da terra, J. de cachorro, J. de soldado, Lilé da China, L. da Índia, L. da Pérsia, L. das Antilhas, Lírio das Índias, Loureiro grego, Paraízo, Paraxaio.
MELISSA OFFICINALIS — Erva cideira,* Chá de França, Grama cideira, Melissa, Maliteira, Salva limão.
MELLOA POPULIFOLIA — Cipó de cesta.*
MELOCACTUS BAHIENSIS — Cabeça de fade.*
 —GONIODACANTHUS — Cardo melão.*
MELOTHRIA PENDULA — Abóbora do mato,* Cereja de purga, Guardião, Melão de morcego, Taiuá do mato.
MEMORA PUBESCENS — Carobinha,* Carobucú.
MENTHA ARvensis — "Vergamota," Bergamota.*
 —PIPERITA — Hortelã,* H. comum, H. hortense, H. das coxinhas,* Hortelan, Levante, Ortelá.
 —SATIVA — Hortelã,* H. comum, H. hortense.
 —VIRIDES — Horteá verde.*
MENYANTHES TRIFOLIATA — Trevo aquático,* T. de cabra, T. de castor, T. do charco, T. dos pântanos.
MESPOLODAPHNE SASSAFRAS — Canc'a sassafraz,* Sassafraz.
MICHELIA CHAMPACA — Magnólia amarela,* M. de Java, M. de Petrópolis, Miquélia, Ameixa de Tchampaca, Champaca.
MICONIA ALBICANS — Canela de velha.*

—BRASILIENSIS — Jacatirão,* Ja.
cotirão, Jaguatirão, Jaquatirão,
Tangará, Vassourão.

—CALVESCENS — Mundurú,* Mundurú vermelho.*

—PRASIMA — Mundurú,* Mundurú branco.*

MICRANIA BAHIENSIS — Cambota-
tan da Bahia.*

MIKANIA AMARA — Guaco,* G.
eatinga, G. trepador, Gaiaco, Cipó
sieurijú, Erva das serpentes, Huaco.

—CARNULOSA — Cipó almêcega,*
C. de fígado, C. doutor.

—GLOMERULATA — Guaco,* G. cat-
tinga, G. de cheiro, G. liso, G. tre-
pador, Gaiaco.

—HIRSUTISSIMA — Cipó cabeludo,*
C. de cerca, Erva doutor, Fl de li-
xa, Guaco cabeludo, G. de cabeleos.

—LAEVIS — Condurango.*

—MYRIOCEPHALA — Condurango.*

—OFFICINALIS — Coração de Je-
sus,* Guaco da serra.

—SCANDENS — Guaco,* G. da ser-
ra, G. de cheiro, G. trepador, Cipó
eatinga, C. de cobra, Ciposinho de
cobra.

—SETIGERA — Cipó cabeludo.*

MIMOSA ASPERATA — Calumbí
d'água,* Juquiri arbóreo, J. grande.

—CONTORTISSIMA — Tamboril.*

—PUDICA — Sensitive,* Caá-co,
Caá-eo, Calumí, Dormideira, Dor-
me-dorme, D. Maria, Erva viva,
Espinho que dorme, Feche a porta
meu bem, Juquer, Juquiri, J. ras-
teiro, Malícia de mulher,* M. das
mulheres, Morre João, Silva d'água,
Vergonha, Vivam.

—NIGRA — Jurema preta.

—SEPIARIA — Maricá,* Espinho de
cerca, E. de maricá,* E. roxo, Se-
te feridas.

—VELLOSIANA — Sensitive.

MIMUSOPS ELATA — Maçarandu-
ba.*

—GLOBOSA — Sapota.*

—PARAFNSIS — Maparajuba.*

MIRABILIS JALAPA — Bonina,*

Boa morte, Erva de Santa Catari-
na, Fl das quatro horas, F. de
merenda, Jalapa comprida, J. do
mato, J. falsa, J. verdadeira, Ma-
ravilha,* M. de forquilha, Purga de
náhica.

MIRCIARIA PLICATO-COSTATA —

Cambucá.*

—TENELLA — Cambuf preto,* Cam-
buinhinho.

MOLDENHAUERA FLORIBUNDA
— Grossai,* G. de azeite, Goroçai,

Groçai,* Grossabi, Guarassai, Gu-
raçai, Guasai, Faveca.

MOMORDICA CHARANTIA — Me-
lão de São Caetano, M. de São Vi-
cente, Momórdica, Cacateira, Erva
de lavadeira, E. de São Caetano,
Pepino de Santo Inácio.

MONNIERIA BAHIENSIS — Alfa-
vaca de cobra.*

—TRIFOLIA — Maricotinha,* Alfa-
vaca de cobra,* Jaborandi das tres
fos, J. de Pison, J. do Pará, Omo-
lu, Vassoura de forno.

—TRIFOLIA var **BAHIENSIS** —
Maricotinha.*

MONSTRERA PERTUSA — Timbó
manso,* Dragão fedorento, Fo fu-
rada, Fo rota, Imbé furado, I.
São Pedro, São Pedro.

MONTANOA BIPINNATIFIDA —
Margarida arbórea,* Fl de maio,*
Girassolina.

MONTRICARDIA LINIFERA —
Aninga,* A. açu, Aningaiba, Bi-
guá tinga, Linga, Ninga.*

MOQUILEA TOMENTOSA — Oiti
mirim,* O. da práia,* O. do Pará,
Guaiti, Guiti, Gutiba, Uitti.

—ZALTMANN — Oiti,* O. açu, O.
da Bahia,* O. da mata, O. grande,
Goiti, Guaiti, Guiti, Uitti, Guti,
Uitti.

MOQUINIA LUCIDA — Candeia
branca,* C. mucerengue,* Acende
candeia, Facho de viajante, Pau
candeia.

—PANICULATA — Cambará da fo-
miuda.*

—POLYMORPHA — Cambará da fo-
grande.*

MOREA APHYLLA — Batatinha do
campo.*

MORINGA OLEIFERA var **PTERY-**
GOSPERMA — Chuva de prata.*
Moringa, Noz de bem, Quiabo de
quina, Q. de tres quinas,* Ramo de
noiva, Seringa.

MORRENIA CISSOIDES — Cam-
paina.

MORUS ALBA — Amoreira branca,*
A. da China, A. do bicho da seda,
Moreira.

—TATAGIBA — Tatajiba,* Tatagi-
ba, Espinheiro branco, Moreira
amarela, Pau Brasil amarelo.

MOURERA ASPERA — Couve d'a-
gua.*

MOURIRIA CAULIFLORA — Curi-
ri,* Criviri, Criuviri, Goiabaraná,
Mureri, Murta de parida.

—GUJANENSIS — Cruji,* Creoli,*
Creoula, Goiabaraná, Uriri.

- **PUSA** — Mondurú,* Mandapuçá, Mondururú,* Mundururú,* Moroso eíano, Jaboticaba do campo, J. do cerrado, Puçá, Pusá, Pussá.
- MUCUNA PLURICOSTATA** — Café dos navegantes,* C. beirão,* C. do Pará, Feijão café.
- **PLURIENS** — Mucuna,* Macanã, Mucunã,* M. cipó, Mucunam, Mucuno, Cabeça de frade,* Café do Mato Grosso, Coroa de frade, Fava café, F. coceira, F. purgativa, Feijão cabeludo, F. de Florida, Lavradio, Olho de boi, O. de burro, Pô de mico.* Quiarta.
- MUEHLEMBECKIA PLATYCLADA**
- Fita de moça.*
- MUSA CHINENSIS** — Banana nani-ca,* B. anã,* B. anica, B. cambotá, B. caturra, B. chinesa, B. d'agua,* B. de italiano.
- **PARADISIACA** — Banana maçã,* Pacoba, Pacova, Pacoveira, Pomo de Adão, P. do paraizo.
- **PARADISIACA** var. **ARGENTEA**
- Banana da prata.*
- **PARADISIACA** var. **NORMALIS**
- Banana da terra,* B. comprida, B. de Caena, B. de chifre.
- **PARADISIACA** var. **REGIA** — Banana ouro,* Pacova mirim, Pissango real, Dendo de moça.
- **PARADISIACA** var. **VIOLACEA** — Banana roxa.* B. vermeilha, Camburi, C. de chifre.
- **ROSEA** — Banana de sementes,* B. mãe.
- **SAPIENTUM** var. **VITTATA** — Banana de São Tomé,* B. curta, B. do paraizo, B. figo, B. rajada, Missara, Mocha, Pomo maçã, Zombi.
- **SAPIENTUM** var. **CHAMPA** — Banana da prata.*
- MYOSOTIS PALUSTRE** — Não me esqueças,* N. me olvides, N. te esqueças de mim, Forget me not,* Lembra-te de mim, Miosotes,* M. dos pântanos, M. dos poetas, Orelha de coelho, O. de rato.
- MYRCIA CAULIFLORA** — Jåloticaba,* J. da campina.

- **RUBELLA** — Pitanga miuda.
- **SPHEROCARPA** — Cambuji,* A. cambuji.
- MYRCIARIA JABOTICABA** — Jaboticaba,* J. açu, J. da campina, J. de cabinho, J. de caboclo, J. de Minas, J. de São Paulo, J. do mato, J. miuda, J. sabará, J. tuba, JJabotá de cabinho, J. de São Paulo, Ponhema.
- **PLICATO-COSTATA** — Cambucá vermelho.*
- **TENELLA** — Cambuji preto,* Murta do campo.
- MYRISTICA BICUHYBA** — Bicuibá,* B. branca, B. da fo miuda, B. mirim, B. vermelha, Barauka, Barouga, Becuiba, Bicuba, Biquiba,* Bocuha, Boucouha, Bucuiba, Bucuuba, Abacu, Micuiba, Ocuiba, Ocuuiba, Uuuuiba, Urucuba.
- **OFFICINALIS** — Bicuiba açu,* B. redonda, Bicuibussú, Moscadeira do Brasil, Noz moscada do Brasil.
- MYROCARPUS FASTIGIATUS** — Óleo pardo,* O. de caboreiba, O. de macaco, Cabiruna, Cabiruva, Caboreiba,* Cabreuva, C. amarila, C. do campo, C. parda, C. vermeilha, Cabreuvinha, Cabriuna, Cabrué, Caburaiba, Cabureiba, Jatauba.
- **FRONDOSUS** — Óleo pardo.*
- MYROXILON DIGYNUM** — Auiuba,* Auiuva.
- **TOLUIFERUM** — Bálsmo de tolui,* B. da América, B. de Cartágêna, B. de cheiro eterno, B. de trapo, Benjoim do norte, Coroiba.
- MYRSINE BAHIENSIS** — Capororoca branca.*
- **BRASILIENSIS** — Capororoca,* C. branca, Pau pororoca, Sobro, Taporoca.
- **FLOCULOSA** — Capororoca.*
- MYRTUS BRASILIENSIS** — Pitanga,* P. comum, P. verdadeira, Piranga, Ubipitanga.
- **COMMUNIS** — Murta,* M. cheirosa, M. cultivada, M. dos jardins, M. verdadeira, Mirto, M. de Afrodite.

N

- NASTURTIUM OFFICINALIS** — Agrião,* A. da Europa, A. da fonte, A. d'água, A. d'água corrente, A. das hortas,* A. ordinário, Agrão, Cardamomo dos rios.
- PUMILUM** — Agrião de lagoa,* A. bravo, A. do mato, Egrão.
- NECTANDRA CANESCENS** — Louro bravo,* L. silvestre, Caneia do mato, Macatáia, Murutáia.
- GILOBOSA** — Caneia preta,* C. inhaiba, C. massapê, Cedro preto, Louro-vermelho, Pau de Santana, Pô de Santana, Surínea.
- GRANDIFLORA** — Caneia.*
- LATIFOLIA** — Caneia da fo larga,* C. bastarda, C. grande, Batalha.
- LEUCANTHA** — Caneia seca,* C. de capoeira, C. de Ceilão, C. mirim, Carvalho seco, Louro tl.
- MOLLIS** — Caneia preta,* C. de veado, C. massapê, C. prego, C. preta verdadeira, Inhaiba, Louro da casca preta.
- MYRIANTHA** — Caneia capitão mor,* C. burra, C. de mau cheiro, C. japu, C. merda, Canelão, C. puante.
- NITIDULA** — Embúia,* E. amarela, Bago de louro amarelo, Caneia amarela, C. da fo larga, C. embúia, Imbúia, Louro amarelo, L. do Rio.
- PSALMOPHYLLA** — Caneia amarela.*
- PUBERULA** — Louro amargoso,* L. besuntão, Ajuba, Caneia preta amargosa, C. preta da serra, C. parda, Pau de Santana, Surínea.
- RIGIDA** — Caneia da fo grande,* C. dura, C. ceibo, C. seiba, C. sciava. Catinga de negro, Louro da mata virgem.
- NEEA THEIFERA** — Caparosa,* C. do campo, C. silvestre, Erva caparosa.
- NEOGLAZIOVIA VARIEGATA** — Caroá,* C. verdadeiro, Caranha, Ca-

- raú, Carauatá, Caravatá, Caroatá, Coroá, Corotá, Croá, Croatá, Grana, Gravatá.*
- NEPHELUM LITCHI** — Litchi,* Léchia,* Lichia, Lixia, Alixias, A. da India.
- NEPHROLEPUS DUFFII** — Confete,* Samambáia confete.
- NERIUM OLEANDER** — Espirradeira,* Beija, Eloendro, Fl de São José, Loureiro rosa, Loandro, L. da India, Loendro, Sevadilha.
- OLEANDER** var **ALBIFLORA** — Espirradeira branca.*
- OLEANDER** — var **ATRO-PURPUREA** — Espirradeira roxa.*
- OLEANDER** var **AURANTJUM** — Espirradeira amarela.*
- NICOTIANA GLAUCA** — Arraiadeira,* Charuto do rei, Eucalipto bravo.
- TABACUM** — Fumo,* Catarinária, Erva da rainha, E. de Portugal, E. de Santa Cruz, E. do Grão Prior, E. do tabaco, E. para todas as moléstias, E. santa, E. sagrada, Panacéia antártica, P. aromática, Peiti, Patigma, Petim, Petum, Petume, Pitima, Tabaco,* T. da fo larga.
- NOTOPanax COCLEATUM** — Pau de colher,* Colher de pau.
- NOTHOSCORDUM FRAGRANS** — Cebolinho cheiroso.*
- STRIATUM** — Alho silvestre.*
- UNIFLORUM** — Cebolinho cheiroso.*
- NYCTANTHES ARBOR-TRISTIS** — Acajá-noite.*
- NYMPHAEA ALBA** — Nenúfar,* N. verdadeiro, Gigoga, Goffão, Golfo da fl branca, Lírio d'água, Lis das lagos, Pasta, Rosa lacustre.
- LUTEA** — Nenúfar amarelo.*
- RUDGEANA** — Golfinho,* Aguapé branco, A. de meia noite, Apé, Gogóia.
- NIYUR GADING** — Côco, Coqueiro anão,* C. da Bahia, C. menino.

O

- OCIMUM AMERICANUM** — Mangericão de alfavaca.*
- BASILICUM** — Alfavaca cheirosa,* A. de cheiro, Basilicum grande,* Erva real, Hortelã do Brasil, O. do campo, Mangericão da fo larga, M. de cheiro, M. de molho, M. dos cosinheiros, M. grande, M. miudo, Remédio de vaqueiro.
- MINIMUM** — Mangericão miudo,* M. da fo miuda. A sp é considerada var do *Ocimum basilicum*.
- FLUMINENSIS** — Alfavaca* Favaça, Mangericão de cheiro, M. grande, Santa Maria.
- GRATISSIMUM** — Mangericão,* M. de cheiro, Mangerico, Catinga de mulata.
- GUINEENSIS** — Quiôô,* Alfavaca da Guiné, A. do campo, Ki-oiô, Oiô, Segur'a.
- OCOTEA BAHIENSIS** — Canela da Bahia.*
- BLANCHETTI** — Canela fedorenta,* C. louro, C. trampa, Louro cêca, L. fedorento.*
- COMPPLICATA** — Canela da prainha.*
- GLAUCINA** — Canela Tapinhão.*
- INDECORA** — Cane'a sassafrás da serra,* Pau sassafrás da serra.
- MEGAPHYLIA** — Itauba.*
- OPACA** — Canela da Bahia.*
- PUBERULA** — Canela pimenta,* Amansa besta.
- SASSAFRAS** — Cane'a sassafrás,* C. funcho, Anhiauba, A. do brejo, Louro sassafrás, Pau de sassafrás, Planta de Cantagalo, Sassafrás,* S. amarelo, S. de Cantagalo, S. do Brasil, S. do Parana, S. do Rio, Sassafrazinho, S. do campo.
- SPECTABILIS** — Canela baiana,* C. metela, Louro preto.
- SPIXIANA** — Canelâd.*
- TELEANDRA** — Louro,* Ajuba, Can'a incuá, C. limão.*
- OENOCARPUS BACABA** — Bacaba açú,* Bacabão, Batana, Amendobi, Iarabuhoba, Ubacaba.
- DISTICHUS** — Bacaba,* B. de azeite,* Bacabal.
- OLEA EUROPEA** — Azeitona,* Oliva, Oliveira.*

- OLMEDIA ERYTHRORHIZA** — Guarijuiba,* Guarijuba.
- OLYRA POLYPODIOIDES** — Bambusinho,* Capim bambusinho.
- OMPHALEA DIANDRA** — Caiaté,* Castanha comadre de azeite, C. de Caiaté, C. de cotin, C. de peixe, C. purgativa, Comadre de azeite.
- ONCIDIUM CEBOLETA** — Rabo de rato,* R. de tatu.
- CRISPUM** — Fl do divino Espírito Santo,* F. do Espírito Santo,* Chita crespa.
- FLEXUOSUM** — Chuva de ouro,* Cacho de ouro, Pingo de ouro.
- LANCEOLATUM** — Oreja de burro.*
- POHLIANUM** — Chita.*
- TUMILUM** — Chita.*
- VARICOSUM** — Chuva de ouro,* Cacho de ouro, Pingo de ouro.
- OPERCULINA CONVOLVULUS** — Batata de purga,* B. purgante, Fl das quatro horas, Escamonea da América, Jalapa, J. bastarda, J. branca, J. brasileira, J. de Lisboa, J. de São Paulo, Jalapão. Purga de Amaro Leite, P. de batata,* P. do sertão, Ra de jetcucú, Rulbarbo branco, Tapioca de purga.
- OPHIOPOGUM JAPONICUM** — Mondo,* Barba de urso, Cabelo de urso, Capim pélio de urso, Erva turquesa, Grama da sombra,* G. convallária, G. inglesa, G. preta, Pélio de urso.
- OPUNTIA BAHIENSIS** — Palmatória,* P. do diabo,* Ambeba, Cardo palmatória, Figueira de espinho, Gerumbeba, Xique-xique, X. do sertão, Opúncia.
- BRASILIENSIS** — Palmatória do diabo,* P. grande, Arumbeba, Figueira de espinho, Palma, Palmadora.
- BURBANKI** — Palmatória sem espinho,* Palma,* Palmadora.
- FICUS-INDICA** — Figueira da Índia,* F. da Espanha, Figo da Índia,* Jamaracá, Jamarucú, Jurumbeba.
- INAMOENA** — Pa'matória miuda,* Guibá,* Guipá, Iviro.

- TUNA — Palmatória sem espinho,* Opúncia, Palma,* P. santa, Tuna.
 —VULGARIS — Palmatória, Mondureú, Mondurucú,* Xique-xique do sertão.
ORBIGNIA EICHLERI — Babaçu,* Baguaçu, Bauaçu, Côco de macaco, C. de inajá, Guacu, Gunguacu, Guiacu, Indaiá açu, Indajá, Uacaçu, Uauacu. Esses apelidos são extensivos às seguintes esp. congêneres.
MARTIANA — Babaçu,* Buacu, Aguacu.
MICROCARPA — Babaçu.*
SPECIOSA — Babaçu,* Côco babaçu.
SPECTABILIS — Babaçu.*
OREODOXA OLERACIA — Palmeira imperial,* Areca imperial, Palma mater,* Palmeira real.
ORIGANUM MAJORANA — Mangerona,* Mangerioba, Mangeroba, Manjaroná, Fl. do himineu.
ORYSA SATIVA — Arroz,* A. branco, A. da Carolina, A. de Veneza.
OTTONIA ANISUM — Jaborandi da mata virgem,* J. dr. Coutinho, J. do norte, J. manso, Peçeca.
OURATEA CASTANAEFOLIA — Farinha seca,* Coxa de frango, Manga do mato, Mangue do mato, Manoel comprido, Pau d'arco serra, Pau serra.

- PARVIFLORA — Batiputá,* B. manso, Batibutá, Jabotapitá, Jabo-tiputá.
SALICIFOLIA — Caueiro bravo.*
VACCINIOIDES — Angelim,* A. margoso.
OXALIS AMARA — Azedinha,* Aze-dia de tres fos, Azedinha amarga-sa,* Macau.
BAHIENSIS — Azedinha da Bahia,* A. do brejo, Aleluia, Azeda de tres fos, Macau.
BARRELLIERI — Azedinha,* Ale-lúia, Erva da Páscoa, E. de boi, Pau de cuco, Tres corações, Trevo azedo, T. d'água.
CAMPESTRE — Azedinha do cam-po.*
CORNICULATA — Azedinha,* Ale-lúia, Azeda de tres fos, Macachi, Macai, Pé de pombio.
DENSIFOLIA — Azedinha das pe-dras.*
HIRSUTISSIMA — Azedinha ver-melha.*
MARTIANA — Caruru de sapo.*
OXPETERA — Azedinha da fo-cortada.*
REPENS — Azeda,* A. rasteira,* Azedinha do brejo, Trevo azedo, T. d'água, Tres corações.
OXYPETALUM BANKSII — Cipó de leite.*

P

PACHIRA AQUATICA — Mamorana,* M. grande, Mamaurana, Mamocerana, Mamurana, Munguba,* Acá, Cacáu da praia, C. selvagem,* Castanha da Costa da Espanha, C. das Guianas, C. do Ceará, C. do Maranhão, Castor, Embiratanha, Embirueú, Paina de Cuba, Sapote grande, Tocoaré.

PALICOUREA LONGEPEDUNCULATA — Erva de rato,* E. de rato grande, E. de rato verdadeira, Tangará-rafá.

PALINURUS AUSTRALIS — Coroa de Cristo,* Espinho de Cristo, E. de italiano, E. de judeu.

PAMPHILIA AUREA — Estoraqueiro,* E. do Brasil, Benjoeiro, Incenso preto.

FERRUGINEA — Estoraqueiro,* Benjoeiro, Pindaubuna.

RUINIFERA — Estoraqueiro.*

Panax FRUTICOSUM — Folha da fortuna.*

GUILFOLIA — Folha da fortuna.*

PANCRATIUM MARITIMUM — Raio de Júpiter.* Cila branca, Lágrimas de Napoleão, Pancrácio marítimo.

PANDANUS UTILIS — Pândano,* Pinhão de candelabro, Vacuá.

PANICUM ALTISSIMUM — Capim lixa,* C. açu, C. da praia açu, C. pororó, Arroz de cotia, Milhã do norte.

BARBIDONE — Capim do Pará,* C. angolão, C. de Angola, C. de Angola açu,* C. de corte, C. de lastro, C. de planta, Erva do Pará.

BARBIDONE var **ROBUSTA** — Capim de Angola açu,* C. angolão,* C. do Pará.

BREVIFOLIUM — Capim mimoso.*

CRUS-ARDEAE — Capim milhan do campo.*

CRUS-GALLI — Capim pé de galinha,* C. pé de galo, C. pé de papagaio, C. de capivara.

DACTYLON — Mate-me embora,* Mata-me embora,* Matai-me embora,* Capim cidade, C. comum, C. da cidade, C. das Bermudas, C. de burro,* Capim matai-me embora, C. mineiro, C. seda, Erva das Ber-

mudas, Grama comum, G. das boticas, G. de burro,* G. de ra, G. de Marajó, G. de São Pau'o, G. de seda, G. fina, G. mineira, G. rasteira, G. roxa, G. sem vergonha, Gramão, Graminha comum, G. da cidade, G. de ra, G. de seda, Mineirinha.

FASCICULATUM — Capim milhan roxo.*

GEMINATUM — Canarana fina,* Capim d'água, C. da fo comprida, C. vermelho, Ponta de lança, Tacuari d'água.

GLADIATUM — Capim trapoeira-ba.*

GRUMOSUM — Capim gigante das baixas,* Palha de Santa fé, P. man-sa, Santa fé.

HELOIDES — Capim angolinha,* C. fino.*

LEANDRI — Capim marmelada,* C. de Guatemala, C. de São Paulo, Gramo paulista.

MALACOPHYLLUM — Capim milhan roxo.*

MAXIMUM — Capim Guiné,* C. colonião, C. de cavalo, C. de corte, C. de planta, C. de soca, C. de touceira, C. do seco, C. do sertão, C. gigante, C. grande, C. meladinho mineiro, C. murumbú, C. verde, Grama da Guiné, Guiné,* Milhasinha, Murubú, Murumbú, Painço grande, Palha da Guiné.

MELINIS — Capim gordura,* C. gordo, C. cabelo de negro, C. catingueiro,* C. de frei Luiz, C. melado, C. meloso.*

MOLINOIDES — Capim quissé.*

MUMDIANUM — Capim do Pará,* C. de Angola, C. de cavalo, C. de lastro, C. fino.

PAPPOPHORUM — Capim mimo-so.*

PETIOLATUM — Capim palma,* Rabo de raposa.

RIVULARE — Capim gigante das baixas,* Palha de Santa fé.

RUGOLUSUM — Capim coqueirinho.*

SANGUINALE — Capim pé de galinha,* C. sanguinário, Cevadinha miuda.

- SPHAEROCARPUM — Capim rabo de raposa.*
- SULCATUM — Capim palmeira,* C. amargoso, C. canoão, C. coqueirinho, C. geriva, C. jiriva, C. leque, Canoão, Grama doce.
- TENERIFAE — Capim favorito,* C. de Tenerife, Favorito.
- VELUTINOSUM — Capim milhar branco,* Zabelê.
- ZIZANOIDES — Canarana roxa,* Capim arroz.
- PAPAVER SOMNIFERUM** — Papoilá,* Papoula,* P. branca, P. de ópio, P. do oriente, P. opífera, Papoulo.
- PAPPOPHORUM MUCRONULATUS** — Capim amargoso,* C. manga.*
- PARABIGNONIA MAXIMILIANA** — Cipó catete.*
- PARKIA PENDULA** — Visgueiro,* Arara petui, Boloteiro, Fava de bolota, Faveira de berloque, Faveirão, Joarana, Joerana,* Joeirana, Juçurana, Jupiuba, Jupuuba, Macaqueiro, Mafua, Muirarema, Murariena, Paricá grande, Pau de arara, P. de sândalo, Procaxi, Sabiú.
- PARKINSONIA ACULEATA** — Rosa da Turquia,* Chile, Cina-cina, Espinho de Jerusalém,* Turco, Turquia.
- PASPALUM CHRYSITES** — Capim de carneiro.*
- DENSUM — Grama de carneiro,* Capim colônia.
- DENSUM var MILLEGRANA — Grama de carneiro,* Capim colônia.
- DILATATUM — Capim comprido,* C. comprido da Austrália, C. grama das baixas, Grama comprida,* G. de sananduva, Mium.
- EXTENUATUM — Capim de sapo,* C. mão de saro.
- FALCATUS — Capim gengibre,* C. rastriero.
- LAXUM — Capim de São Carlos,* Grama de São Carlos,* G. larga, G. major José Inácio, G. major Inácio.
- MANDLOCANUM — Capim de Pernambuco,* C. de Macané, C. gengibre, Grama de Macané, G. de Marajó, G. de Pernambuco.
- MARITIMUM — Capim gengibre.*
- PANICULATUM — Capim grama da Guiné.*
- PLATYCAULON — Capim grama,* C. da roça, Erva tapete.
- SANGUINALE — Capim pé de galinha.*
- SCOPARIUM — Capim imperial.*

- VIRGATUM — Capim milhã do brejo,* C. milhã roxo, C. Marajó, C. tapeirú grande, C. turipué, Palha branca.
- PASSIFLORA ALATA** — Maracujá grande,* M. mamão, Murucuíá, Murucujá.
- BAHIENSIS — Maracujá comum,* M. da Bahia,* M. de comer.
- CAPSULARES — Maracujá branco.*
- EDULIS — Maracujá comum,* M. da Bahia,* M. de comer, M. de macaco, M. mirim, M. miudo, M. redondo, M. péta, M. peroba, M. suspiro, Murucujá, Murucujá, Sucurujuá, Sucururá.
- EDULIS var VERRUCIFORMIS — Maracujá comum.
- MACROCARPA — Maracujá melão,* M. açu, M. de Caiena, M. de quatro pernas, M. de quatro quinas, M. gigante, M. grande,* M. mamão,* Maracujina,* Maracujam.*
- MICROCARPA — Maracujá de boi,* M. de três pernas, M. mirim,* M. redondo, M. selvagem, Maracujinho.
- PATAGONULA AMERICANA** — Iné branco,* I. do sul, Gaiforina, Galuvira, Guaiabi, Guaiabira, Gualavira, Guaijavira, Guarapuvira.
- PAULICOREA LONGEPEDUNCULATA** — Erva de rato,* Café bravo.
- RIGIDA — Douradinha.*
- PAULLINIA CUPANA** — Guaraná,* G. uva, Cupana, Uaraná.
- CURURU — Cipó cururú,* C. timbó.
- ELEGANS — Cipó timbó.*
- PINNATA — Cipó cururú,* C. cueurú, C. cumaru apé C. de crupé vermelho, Cruapé vermelho, Cururú, C. apé, Mafome, Tururú apé.
- PAVONIA CANCELATA** — Baba de boi,* Geribá.
- VARIANS — Malva cabeça de veado,* M. grande, M. rabo de fogueté,* Malvão.
- PEDILANTHUS TITHYMALOIDES** — Sapatinho do diabo,* S. de udeu,* S. dos jardins, Coração de negro,* Fo do coração.
- PEIRESKIA ACULEATA** — Ora pro nobis,* Cacto rosa, Espinho de Santo Antônio, E. preto, Surucucú.*
- BAHIENSIS — Ora pro nobis,* Cacto rosa, Groseilha das Barba-

das, Inhabento, Jumbeba, Peiréschia, Quiabento,* Surucucá.*

PELARGONIUM ZONALE — Gerânia,* Giranic,* Alegria, Bico de cegonha, B. de grou, Catinga de mulata, Malva dos jardins, M. fl., M. maçã, M. sardinha, Pelargônio,* Sardinheira.

PELTODON RADICANS — Rabugem de cachorro,* Rabuge, Rabugo, Boiá-caá, Erva de cobra, Fava cauleira, Fo santa, Hortejá brava, H. do Brasil, H. do mato, H. meladinho, H. verdadcira, Meladinho,* Melin-mela,* Meloso, Pacari, Paracari, Paracurí, Pega-pega,* Poejo rasteiro, São Pedro caá.*

—SP. — Tapete de oxalá.*

PELTOGINE DISCOLOR — Pau roxo, P. alto, P. amaraute,* P. violeta, Amarante, Amarelo, Barabu, Boxinho, Guarabu, G. amarelo, Gunribú, Guarubú, Gurubo, Itapicuru roxo, Jataimondé, Jutairana, Roxinho, Vio'ete.

PELTOPHORUM VOGELIANUM — Ibira puitá,* I. guaçu, I. piita, Amendoi falso, Guaracaiá, Tambo-ri bravo, ou do bravo.

PENNISETUM NIVOSUM — Rabo de mucura,* Capim da praia, C. dos Nambiquaras.

—PURPUREUM — Capim elefante,* Erva elefante.

—SETOSUM — Capim rabo de mu-cura,* Tacori de cavalo.

PERIANDRA DULCIS — Alcaçuz,* A. da terra, A. de Minas, A. do Brasil, Cipó en, Pau doce, Ra doce, Urucuque.

PERSIA GRATISSIMA — Abacate,* A. branco, A. roxo, Abacado, Abacateiro. Creme vegetal, Louro abacate, Péru abacate, Pereira da Nova Espanha.

PETIVERIA ALLIACEA — Tipi,* T. verdadeiro, Titi, Cagambá, Embirembo, Erva da Guiné,* E. de alho,* E. de tipi, E. pepi, Gambá, Gorana timbó, Gorarema, Gorazema, Guiné,* Iratueca, Iratataca, Macura-caá, Mucura-caá, Ocoembro, Paracaeas, Fararoca, Pau de Guiné, Pepi,* Pipi, Ra de congo-nha, R. de gambá, R. de Guiné, R. de pepi, R. do Congo.

PETREA BLANCHETIANA — Capela de viuva.*

—RACEMOSA — Capela de viuva.*

—VOLUBILIS — Capela de viuva,* Chorão de viuva,* Cipó azul, Coroa de viuva, Fl azul, F. de São

Miguel, F. de viuva, Grinalda de viuva, Jasmim de viuva, Touca de viuva, Toucado, Viuvinha.*

PETROSELINUM SATIVUM — Sal-sa,* S. hortense, S. cultivada, S. das hortas,* S. de cheiro, S. vulgar, Perecili.

PETUNIA NYCTAGINIFLORA — Petúnia,* P. branca.

VIOLACEA — Petúnia vermelha.*

PHALARIS CANARIENSIS — Milho alpista,* Alpista,* Alpiste, Capim alpiste.

PHARUS BRASILIENSIS — Capim bambú,* Arroz de cachorro, Esparto da terra.

—SCABER — Capim pintado,* Iaguá arroz.

PHASEOLUS CARACOLATA — Ca-racol,* Caracala, Caracoleiro, Tripa de galinha.

—LUNATUS — Fava,* F. Belém.*

—MESOLEUCUS — Feijão frade,* F. fradinho, F. de frade, F. miudo.

—VULGARIS — Feijão.

—VULGARIS var COMPRESSUS — Feijão.

—VULGARIS var DERASSUS — Feijão preto,* J. Porto Alegre, F. do Rio Grande, Pai de família.

—VULGARIS var ELLIPTICUS — Feijão.

—VULGARIS var OBLONGUS — Feijão.

—VULGARIS var RADIATUS — Feijão rajado.*

—VULGARIS var SPHAERICUS — Feijão.

PHLOX DRUMONDE — Flex,* Flores.

PHOENIX DACTYLIFERA — Tâma-ra,* Tamareira,* Datilifera.

PHORMIUM TENAX — Linho da Nova Zelândia,* Seda vegetal.

PHRYGANOCYDIA CORIMBOGA — Caroba de Mato Grosso.*

PHYLLANTHUS ACIDUS — Grose-ja,* G. branca, G. da Índia, Pi-tanga branca,* P. do mato, Uva creapa, U. espinhosa.

—ACUMINATUS — Conabi,* C. Pará, Conambi, Conami, Conani, Conanu, Conavi, Caroba do mato, Tin-guá, Tingui.*

—BRASILIENSIS — Conambi* e os outros apelidos da sp precedente.

—KOLTZIHIANUS — Fita da moça.*

—NIRURI — Quebra pedra,* Arrebenta pedra, Erva pombinha,* Flinto, Fura muros, F. paredes.

—NIVOSUM — Folha de seda,* Se-reno.

—PULCHER — Tamarindo japonês,*
T. de mesa.*

PHYLLOLOCALIX LUSCHNATIANUS
— Pitombo,* P. da Bahia,* Curu-
ri, Curuiri, Uva do campo.

PHYLLOCARPUS PTEROCARPUS
— Guarabu eebola.*

PHYLLODENDRON IMBE — Cipó
imbé,* C. de aímbé, C. de imbé,
C. matador, Ambé, Aningauba, Ba-
nana de imbé, B. do brejo, B. im-
bé, Caruba, Fo da fonte, Fruta de
imbé, Guaiambé, Guembé, Guimbé,
Imbé de comer, Mata pau, Taiá ja-
raraça, Tajá, Tajaz de cobra, Tra-
coá, Tracoan, Trucuas, Umambé.

—PERTUSUM — Sete chagas,* Chag-
as de São Sebastião.

—SPECIOSUM — Aninga.*

PHYLLOTACHYS AUREA — Bam-
bú dourado,* B. amarelo.

—CASTILLONIS — Bambú impe-
rial.*

PHYSALIS ALKEKENGE — Camapu,*
Canapu, Camambu, Cereja do
inferno, C. judia, Alquequenje, Ba-
te testa,* Bucho de rã, Erva de
noiva, E. do Peru, E. noiva do
Peru, Fisálida, Juá poca, J. de cap-
pote, Paco-paco, Saco d'água, Tim-
bó do Rio de Janeiro, Uva do
campo.

—ANGULATA — Camapu, Cananu.

—BRASILIENSIS — Camapu, Ca-
napu.

—PERUVIANUM — Camapu, Cana-
pu.

—PURESCENS — Camapu, Canapu.

—VIScosa — Camapu, Canapu.
PHYSOCALYMA FLORIBUNDA —
Sabastião de arruda.* Pau rosa do
Norte.

PHYTOLACCA DECANDRA — Tin-
tureira,* T. vulgar, Carirú-açu, Ca-
rirú de cacho, C.-guacu, Erva da
América, E. de laca, E. do Cana-
dá, E. dos cachos, E. dos cachos
da India,* E. dos cancos, Espina-
fre das Índias, E. macio, Gaia mo-
ça, Mechoacan do Canadá, Mechoa-
cana, Mechuação, Moreles em ca-
chos, Uva da America, U. do Ca-
nadá, U. dos tintureiros, U. dos
trônicos.

—THYRSIFLORA — Carurú bravo,*
C. bravo guaçú, C.-açu, Carurú de
porco, Bredo carurú, Cipieira, Tin-
ge ovos, Tintureira selvagem.

PICRIA FEL-TERRAE — Fel da
terra.*

PILEA GROSSECRENATA — Pega-
rapaz,* Corre-corre, Dinheiro em
peça,* Ouro em peça.

—HYALINA — Brilhantina.*

—MICROPHYLLA — Brilhantina*,
Erva gorda, Mil grãos.

—MUCOSA — Urtiga.*

PILEUS SETOSUS — Espinhento,*
Alastrado, Cardeiro.

PILOCARPUS PENNATIFOLIUS —
Jaborandi,* J. das Rutárias, J. do
Ceará, J. do norte, J. verdadeiro,*
Jaborandí, Jaguandí, João horan-
di, Ibiratá, Naborandi, Naguarandi,
Namhorandi, Nandi.

PILOCEREUS SENILIS — Cacto ca-
beça de velho,* Cabeça de velho.*

—SETOSUS — Espinhento,* Cardel-
ro,* Cheque-cheque, Chique-chique.

PIMENTA OFICINALIS — Pimen-
ta da Jamaica.* P. de coroa.

PIMPINELLA ANISUM — Erva do-
ce,* Aniz.* A. verde, Pimpinea.

PIPER ADUNCUM — Aperta ruão.*
A. João, Erva de iaboti, Jaborandi
do mato, Mastico, M. falso, Pimen-
ta de fr ganchoso, P. dos Índios,
Ruão. Tapa buraco.

—ANTIDISSPEPTICA — Bétis,* Be-
me Pinerona.

—CARPUNYA — Alfavaca de co-
bra.* Carnúnia.

—CELTIFOLIUM — Aperta ruão.*

—EUCALEYPTIFOLIUM — Botis,* B.
cheiroso.* Beque, Bete, Betle, Be-
triz, Bitre.

—JABORANDI — Jaborandi falso,*
J. das Alagoas, Jaborandirana, Ca-
tai-guaçu, Cutia, Erva de soldado,
Nandu.

—MARGINATUM — Capeba.* C.
cheirosa,* Caú-peba, Caú-capeuna,
Caú-nena, Caena, Capena, Capena,
Capeva,* Catagé, Cinó de cobra,
Cipó-deño de cobra, Bitre, Fo cha-
ta, Nandi, Nandu, Pariparoba, Pe-
riparoba, Pimenta do mato, P. dos
Índios, P. longa.

—NIGRUM — Pimenta do reino,* P.
da Índia,* P. preta.

—ROHRIT — Canta.* Betis.

PIPERONIA PELUCIDA — Alfava-
ca de cobra,* Alfavaquinha de co-
bra.

PIPTADENIA BRUNCIFERA — Su-
ruêcuí.*

—COLUBRINA — Angico branco,*
A. cêco, Brinco de sagui, B. de sa-
girú, B. de saoim, Cambuí angico,
C. branco, Ingá angico, Moré.

—COMMUNIS — Jacaré,* Camboe-
teiro, Icarapé, Pau jacaré.

—LAXA — Espinheiro bravo.*

—MACROCARPA — Angico do cam-
po,* A. fava, A. preta, A. rajado,

- A. vermelho, Arapiraca, Cambuferro, Curupai.
- **MONILIFORMIS** — Catanduba,* Angico surucucú, Pau carrasco, Rama de bezero.
- **POLYPTERA** — Espinho roxo.*
- **RAMOSISSIMA** — Espinheiro bravo.*
- **RIGIDA** — Angico,* A. amarelo,* A. cedro, A. cêco, A. de banhado, A. montês, A. verdadeiro, A. vermelho, Acácia angico, Cauvi, Curupáre, Guarapiraca, Ingá angico, Paricá.
- **TRISPERMA** — Espinheiro bravo.
- **ZENTNERI** — Surucucú.
- PIPTOCARPHA LUNDIANA** — Candeia,* Candieiro.
- **ROTUNDIFOLIA** — Para tudo,* Candeia, Infalivel.
- PIRUS CYDONIA** — Marmelo,* Mar-melito,* Pomo de Vénus. P. dos poetas.
- **MALUS** — Maçã,* Macleira.*
- PISCIDIA ERYTHRINA** — Timbó de rã,* T. boticário.*
- PISONIA ACULEATA** — Quixaba.*
- **CAMPESTRE** — Murta pimenta,* M. da fo larga.
- **TOMENTOSA** — João mole,* Pau judeu, P. lepro.
- PISTIA OCCIDENTALIS** — Lentilha d'água,* Alfase d'água. A. do golfo, Erva das cobras, E. de Santa Luzia, Fl. d'água, Golfo, Murici de canudo. M. pagé, Mururé pagé, Santa Lúcia.
- PISUM SATIVUM** — Ervilha,* E. comum,* E. de desenhar. E. galega.
- **SATIVUM** var **PLATICARPA** — Ervilha torta,* E. come-se tudo.
- PITHECOCTENIUM ECHINATUM** — Pente de macaco,* P. do diabo, Anhagaquibuso.
- PITHECOLORIUM AVAREMOTEMO** — Avaremótemo,* Abaremoto, Abaremotomo, Bordão de velho, Brinco de sagui, B. de saguirú, B. de saim, Goabi pocacaiba, Guabi, Guaibi, Sauim.
- **CAULIFLORUM** — Ingarana,* Ingá caetitá, I. da terra firme, Ingásinha, Arandenca, Jarandeuca.
- **DIVERSIFOLIUM** — Jurema,* J. branca,* Arabitá.
- **LUSORIUM** — Sobreiro,* Sobro, Cortiça, Sete capotes.
- **TORTUM** — Vinhático de espinho,* Geremari.
- PLANTAGO LANCIOLATA** — Tanchagem,* Tansagem, Tansaja, Plantagem.
- **MEDIA** — Tanchagem.*
- PLATHYMENIA FOLIOSA** — Vinhático do campo.*
- PLATONIA INSIGNIS** — Bacuri,* Bacori,* Bacuriuba, Ibacopari, Ibacori, Landirana, Pacori, Pacoru, Pacuri Pacuriuba.
- PLATYPodium ELEGANS** — Jacarandá branco.* J. banana, J. do campo, Jacarandá-sinho.
- PLERAGYNA RUFa** — Oiti, corô,* O. corôn, O. da mata.
- **UMBROSISSIMA** — Oiticica,* Oiti da beira do rio.
- PLUCHEA QUITOCO** — Quitoço,* Caculage, Cravo madre, Madre cravo. Tabacarana.
- PLUMBAGO AURICULATA** — Plumbea.*
- **CAPENSIS** — Emilia,* Bela Emilia,* Detelária, D. do cabo, Erva das feridas, Jasmin azul, Plumbago.
- **SCANDENS** — Erva do diabo,* E. do amor, E. de louco, Amansa senhor,* Caçandiva, Caçopomonga, Caatáia, Cannamon, Chüstico vegetal, Chá pomonga, Fo de louco, Louco, Lucemadeira, João de Melo, Queimadeira.
- PLUMIERIA DRASTICA** — Janauba,* Jarauba, Pau santo, Raivosa, Tiborna,* T. dos sertanejos, Tiborno.
- **LANCIFOLIA** — Agonia,* Agoniada,* Arapué, Araupé, Quina branca, Q. mole, Sucuba, Sucuiba, Sucuuba, Tarioca.
- **MICROPHYLLA** — Agoniada,* Quina branca.
- **TRICOLOR** — Jasmim caiana,* J. de Caiena, J. manea, J. manteiga, Francinenciro, F. da Caiana.
- **TRICOLOR** vars **ALBA**, **ROSEA** e **RUBRA** — Jasmim Caiana.
- POA LUXURIANS** — Capim sempre verde.
- **NEMORALIS** — Capim sempre verde,* C. da Europa, Sempre verde.
- POECILANTHES GRANDIFLORA** — Currancuda.*
- POGOSTEMUM PATCHULI** — Paticholi,* Patichuli.
- POINCIANIA REGIA** — Flambolan,* Flambóia, Flamejante, Fl. de pavão, Pau rosa.
- POLYANTHES TUBerosa** — Angélica dos jardins,* Jacinto das indias, Tuberosa.
- POLYGALA HYGROPHILLA** — Candelabro.*

- **PANICULATA** — Barba de São Pedro,* Alcaçuz de Santa Catarina, Alecrim de Santa Catarina, Arrozinho, Ipeca bastarda.
- POLYGONUM ACRE** — Capicoba,* Capetiçoba, Capitiçoba,* Caltata, Erva de bicho, Oreha de rato, Persicária, P. do Brasil, Pimenta aquática, P. d'água.
- POLYPODIUM FELIX-MAS** — Samambáia açu,* Feto arborescente,* Xanxim, Xavim, Xaxim, Xaxum.
- **PENDULUM** — Samambáia chorona,* S. Pendente.
- **PERCUSSUM** — Erva Silvânia da fo grossa.*
- **SUB-AURICULATUM** — Feto chorão.*
- **VACCINIFOLIUM** — Erva Silvânia,* E. de lagarto, E. de Santa Tereza, E. lagartixa, E. Silvânia,* E. Tereza, Feto trepador, Silvânia.
- **VULGARIS** — Rabo de peixe.*
- POLYPORUS OFFICINALIS** — Oreha de pau,* Pirongo, Tortulho, Urupé.
- **SANGUINEUS** — Orelha de pau vermelha,* Pirona, Urupé piranga, U. pironga.
- POLYSCIAS FRUTICOSA** — Fo da fortuna,* Árvore da fortuna.
- **GUILFOLEI** — Fo da fortuna.
- POLYTRICHUM COMMUNE** — Musgo comum.*
- PONTEDERIA AQUATICA** — Baroneza,* Dama do lago.
- **CORDIFOLIA** — Baroneza,* Rainha do lago.*
- POPULUS NIGRA** var **PYRAMIDALIS** — Choupo,* C. piramidal,* Alamo, A. cipreste.
- PORPHYLLUM RUDERALE** — Couve cravinho,* Couvinha, Cravo de urubú, Erva couvinha.
- PORTULACA GRANDIFLORA** — Onze horas,* Amor crescido, Beijdroega da fl grande, Cavaleiro das onze horas,* Fl das onze horas, Perexi, Rosa de Santa Terezinha, Santa Terezinha.
- **HIRSUTISSIMA** — Amor crescido,* A'cerim de São José.
- **OLERACIA** — Beijdroega pequena,* B. verdadecira, B. vermelha, Caá ponga.
- **PILOSA** — Alecrim de São José.*
- **RACEMOSA** — Beijdroega,* B. grande.
- POSOQUERIA ACUTIFOLIA** — Baçupari.*
- **LATIFOLIA** — Açucena do mato,* Araçá da praia, Fl de mico,
- Lírio do mato, Maria pêldorreira, Tapa buraco, Puruí.
- **LONGIFLORA** — Aimara posoqueri.*
- POTHUS QUADRANGULARIS** — Fo de urubú.*
- PURUMA CECROPIAEFOLIA** — Tararanga preta,* Amaitim, Cucura, Mapati, Puruma, Umbuba do cheiro, U. de vinho, U. mansa, U. puruma.
- **GUINEENSIS** — Tararanga branca* e os apelidos da sp precedente.
- **MOLLIS** — Tararanga vermelha* e os apelidos da primeira sp do Ge citado.
- PRADOSIA LACTECENS** — Buranhém,* Buraen, Casca do Brasil, C. doce, Guaraem, Guaranhém, Guraem, Guras en, Guranhém, Ibiraçem, Imiracem, Imiracem, Imirâé, Iviranhem, Muminha de quati, Merecem, Miica, Moica, Moncisia, Pau de remo, P. doce, Uajará, Ubiraem.
- PRIVA BAHIENSIS** — Mãe Izabel,* Bunda de mãe Izabel.*
- PROTIUM HEPTAPHYLLUM** — Almecenga,* A. brava, A. cheirosa, Almecgueiro,* Almesca,* Almescla, Almescar, Animé, Árvore do incenso, Breu almecenga, Elemi, E'melicra, Erva feiticieira, Ibiracica, Icariba, Pau de breu, Tacacá mará, Tel-
- **HEPTAPHYLLUM** var **BRASILIENSIS** — A mæcæga* e os apelidos da sp precedente.
- **ICICARIBA** — Almêcæga,* A. vermelha, A. verdadeira, Almecgueiro,* Breu branco, Elemi do Brasil, Goma limão, Icica, I. açu, Icicariba, Mescla, Mirra, Ubiracica.
- PRUNUS PERSICA** — Pêcego,* Pêcegueiro.
- **SPIHAEROCARPA** — Ginja,* Giageira,* Amendoeira brava, Cereja do Brasil, Coração negro, Marromeiro bravo, Virurú.
- **CHAMOESRASSUS** — Ginja, Giageira.
- PSEUDO ABUTILON-SPICATUS** — Paco-paco,* Malva do salgado, M. de pendão, M. rabo de foguete,* M. vareta,* Rabo de foguete, Vasourinha d'agun.
- PSIDIUM ACUTANGULUM** — Araçá pomba,* Araçá piranga, Araçandiba, Araçanduba, Araçaranã, Araçatinga, Goinbarana.
- **ALBICANS** — Araçá branco,* A. das almas.*

- ARAÇA — Araçá mirim,* A.-iba, A. verdadeiro, Araçal, Araçasinho, Aui, Uva do campo.
- DENSICORUM — Goiaba azeda.*
- GOIABA — Goiaba,* G. açu, Guaiaba,* Guaiava, Guajába, Guiaba, Arançá goiaba,* A. guaiaba, Purui.
- GOIABA var POMIFERUM — Goiaba branca,* G. maçã, Araçá das almas.*
- GOIABA var RUFUM — Goiaba verme ha,* G. pêra.
- LITTORALIS — Araçá, Araçasinho.*
- MICROCARPUM — Araçá miúdo,* Araçasinho.
- OLIGOSPERMUM — Araçá de pedra.*
- PETROSUM — Araçá de pedra.*
- PIGMEUS — Maranguba.*
- RUFUM — Araçá cágão,* A. bravo, A. perinha, A. pirim.*
- PSITTACANTHUS DICHROUS** — Erva de passarinho.*
- PSYCOTRIA IPECACUANHA** — Ipêcacoanha,* Ipecacuanha, Bexuquinho.
- RIGIDA — Gritadeira,* G. dos tabeiroz, Gongó dos campos, Batedeira, Dourada, Douradão, Doura-

- dinha grande, Mata cana, Tangará açu, Tangaracá açu.
- PTERIS AQUILINUM** — Samambáia das tiperas, S. grande, Samambáia, S. das roças.
- CAUDATA — Samambáia, Samambáia.
- PTEROCARPUS DRACO** — Sangue de dragão, Mututú.
- ZEHNTNERI — Pau de sangue.
- PTEROCAULON VIRGATUM** — Barbasso,* Barbasco, Alecrim das paredes, Caíção de velho,* Calças do velho.
- PTERODON PUBESCENS** — Favela, F. amarela, Fava de sucupira, Favero, Sucupira branca, S. lisa.
- PUNICA GRANATUM** — Romã,* Romeira,* Romanziria.
- GRANATUM var FLORAPLENA — Romã de fia dobradas.
- PYROSTEGIA IGNEA** — Cipó de São João,* Ciposinho de São João, Cipó bela fl., C. pé de lagarto, C. pé de lagartixa, Belas, Marqueza das belas.
- PYRUS COMMUNIS** — Pêra,* Pereira,* P. de Afrodite, P. de Vénus, P. erótica.

Q

QUALEA CORDATA — Pau terra,*
P. terra do cerrado, P. cinza,* P.
cinzeiro, P. uva do campo, Dedaleira
preta, Dedaleiro preto, Jundai,
Mururi, Qualé, Q. azul, Uva
pura do campo.

—**GRANDIFLORA** — Pau terra* e
os apelidos da sp precedente.

—**MULTIFLORA** — Pau terra* e os
apelidos da primeira sp congênere
citada.

—**PARVIFLORA** — Pau terra,* P.
terra miudo, P. terra pequeno.

QUARARIBEA PENDULIFLORA —
Virote mirim.*

—**TURBINATA** — Virote.*

QUASSIA FERRUGINIA — Calun-
ga.*

QUINA VERA — Quina.

QUISQUALIS INDICA — Arbusto
milagroso.*

R

- RADDIA PORTOI** — Capim zabelê.*
RANUNCULUS BONARIENSIS — Cordão de ouro*, Erva lançeta.*
—**FLAGELLIFORMIS** — Ranúnculo brasileiro.* Rainúnculo brasileiro.
RAPANEA FERRUGINEA — Azeitona do mato,* A. brava, Capororoca, C. açu, C. vermelha, Capororrelinha, Pororoca.
—**GUYANENSIS** — Capororoca comum,* C. da fo larga, Jacarandá do campo.
—**GUYANENSIS** var **SUB-ACUTA** — Capororoca comum.
—**PARVIFOLIA** — Capororoca branca.*
RAPHANUS SATIVUS — Rábano,* R. das hortas, Rabão, Couve de São.
—**SATIVUS** var **RADICOLA** — Rabanete,* Rabaneta, Rábano curto, Rabica, Nabo japonês, Saramago.
—**SATIVUS** var **ROTUNDUS** — Rabanete redondo,* R. curto.
RAPHIA EXCELSA — Rapia,* Jupati.
—**FLABELIFORMIS** — Rapia,* Jupati.
RAPUTIA ALBA — Arapoca branca,* Guaratã, Guaratan, Guaratáia, G. branca, Guratá, Guratulapoca, Guratapoca.
—**MAGNIFICA** — Arapoca,* A. amarela,* A. jubá, A. verdadeira, Gemma de ovo, Mocla de galinha, Pau amarelo, Rapoca e os demais apelidos da sp precedente.
RAUWOLFIA BAHIENSIS — Casca de anta brava.*
—**BLANCHETTI** — Canudo de purga.*
RAVENALA MADAGASCARIENSIS — Árvore do viajante,* A. do caçador, A. do viajor,* Bananeira de leque,* B. de Madagascar, Guia dos viajantes, Leque, Pacova sororoca, Sororoca, Ravenala, Urânia, U. sumberba.
REMIJIA FERRUGINEA — Quina da serra,* Q. de remígio.*
REMIREA MARITIMA — Carrapicho de cavalo,* Cipó da praia, Barba de boi, Papatura.

- RENEALMIA BRASILIENSIS** — Cardamomo,* Água da Colônia, A. de alecrim,* A. de levande,* Bradamundo,* Caeté de cheiro, Cana do brejo, Cardamomo da terra, C. do Brasil, C. em cachos, Fl de levande, Fo da Colônia, Paco serosa, Pacová.
—**OCCIDENTALIS** — Cardamomo,* Cuité açu.
RESEDA ODORATA — Resedá,* R. de cheiro, R. odorífero, Reseda,* Resedal, Rosedá, Erva do amor, E. dos mouros, Minh-nete, Quaré.
RHEEDIA GARDNERIANA — Bacupari,* Bacapari, Bacopari,* Bacuripari, Canfo, Ibacopari, Mirante,* Mueuri, Sacopari, Sacuparu, Saputá, Uvacupari, Vacapari, Vacaopari.
RHIPSALIS MACROCANTHA — Cardo pendurado.*
—**SARMENTACEA** — Chulas.*
RHIZOPHORA MANGLE — Mangue vermelho,* M. bravo, M. canoé, M. de espeto, M. de pendão, M. preto, M. sapateiro,* M. verdagüiro, Apareiba, Árvore do caranguejo, Canapauba, Canaponga, Guaparaiba, Guapariba, Guarapai, Guarapari, Guarapan, Mangarabeira, Mangaribeira, Mapareiba, Pau de caranguejo, Ratimbó, Sapateiro, Tintureira.
RHODODENDRUM INDICUM — Azálea,* Azaléa.* Árvore das rosas, Rosa dos Alpes.
RHOEO DISCOLOR — Trapoeiraba açu,* Barquinha de Noé, Canoa, Cordoban, Gravatá vermelho.*
RHYNCHOSIA MINIMA — Matinetá.* Alfafa viscosa.
RHYNCHOSPORA CIPEROIDES — Junco de tres quinas.*
RICHARDISONIA ROSEA — Ipeca,* I. do campo, Poaia do campo, P. rósea.
RICINUS COMMUNIS — Mamona,* M. branca, Mamono, M. branco Mamoneira,* Árvore maravilhosa, Bafureira, Baga, Carrapateira,* Carrapato, Figo do inferno, Figueira do inferno, Pinô, Pinô guaçu, Ricino.*

--*SANGUINEUS* — Mamona vermelha.*

RIVINA HUMILIS — Erva dos carpinteiros.*

RODRIGUESIA MACULATA — Ovo de tico-tico.*

ROLLINIA SYLVATICA — Embira de araticum.* Araticum do mato.

ROSA CENTIFOLIA — Rosa Amélia,* R. branca, R. das rosas, R. de cem fos, R. de toucar, Cem fos.

—*GALLICA* — Rosa rubra,* R. de França, R. francesa, R. gálica,* R. vermelha.

—*INDICA* — Rosa chá,* R. damascena.*

—*MOSCATA* — Rosa de Alexandria,* R. de cheiro.

—*MULTIFLORA - CARNEA* — Rosa trepadeira.

—*SEMPER-FLORENS* — Rosa das quatro estações,* R. almiscarada, R. de Damasco.

ROSMARINUS OFFICINALIS - Alecrim,* A. das hortas, A. de casa, A. de cheiro, A. dos jardins, Fl do Olimpo, Libanotes.

ROUPALA BRASILIENSIS — Pau concha,* Cangica, Carne de vaca, Carvalho catucaem, C. do Brasil, C.

do Paraná, C. nacional, Caxicáem, Caxicoem, Coxí caem, Cutuajé, Cutucanhem, Fáia, Guaxica, Irino.

—*ELEGANS* — Carne de vaca,* Tucajé e alguns apelidos da sp precedente.

—*LUCENS* — Congonha vermelha.*

RUDGEA VIBURNOIDES — Chá de bugre,* Casca branca, C. cotó, Congonha do gentio, Costa branca, Cotó, Coto-cotó, Erva de bugre,* Fo grossa do sertão, Piôia.

RUELIA BAHIENSIS — Ipeca basta-arda,* Mocó.

RUMEX ACETOCELLA — Azeda miuda,* Azedas de orelha, Azedinha alelúia, A. miuda.

RUSSELIA EQUISETIFORMIS — Fi de coral.*

—*JUNCEA* — Coral.*

RUTA GRAVEOLENS — Arruda,* A. comum, A. da fo miuda, A. das vinhas, A. doméstica, A. dos jardins, A. fedorenta,* Erva de arruda, Ruda.

RYNCHOSPORA AUREA — Capitava.*

—*CEPHALOTES* — Capim de bolota.*

—*STOREA* — Pirí-pirí,* Peri, Perí-peri, Pápito brasileiro, Pipiri.

S

SACCARUM OFFICINARUM — Cana de açucar,* C. da China (var), C. doce,* Tacomaré.

—VIOLACUM — Cana roxa.*

SACCIPLEPS VILVOIDES — Capim de egua,* C. cortesia, C. mourão, C. rabo de rato.

SALACIA BRACHYOPODA — Cipó abacate.*

—CAMPESTRIS — Bacupari do campo,* Capicurú, Capirucú, Janirucú, Laranjinha do campo, Tapicurú.

—GLOMERATA — Bacupari da Bahia.*

—MICRANTHA — Bacupari miúdo.*

SALIX BABYLONICA — Salgueiro,* S. chorão,* S. da Babilônia, Salso, S. chorão, Chorão salgueiro, Oiraná.

SALVERTIA CONVALLARIAEODORA — Co'her de vaqueiro, Fo longo, Moliana, Pau de colher de vaqueiro.

SALVIA SPLENDENS — Pingo de lacre,* Pé de chumbo,* Alegria dos jardins, Bico de papagáio, Cardial, C. do Brasil,* Labarda, Mulatinha sem vergonha, Realista, Salva, S. comum, S. do Brasil, Sangue de Adão.

SAMBUCUS AUSTRALIS — Sabugueiro,* S. do Brasil, S. do Rio Grande, Acapora.

SANSEVIERA LAURENTII — Espada de ogum.*

—ZEYLANDICA — Espada de ogum,* Bastão de São José, Cânhamo africano, C. da Nova Zelândia,* Espada de São Jorge,* Palma de São Jorge, Rabo de carneiro, R. de gato, Sansevieria, Sansevieria, Zebrina.

—ZEYLANDICA var **CYLINDRICA** — Espada de ogum.*

—ZEYLANDICA var **GUINEENSIS** — Espada de ogum.*

—ZEYLANDICA var **LONGIFLORA** — Espada de ogum.*

SAPINDUS DIVARICATUS — Saboeiro,* S. do Brasil, Sabocira, Saboneta, Sabonete, Saboneteiro, Saponária, Árvore do sabão, Fruta de sabão, Ital.

—ESCUENTUS — Pitomba,* Pitombeira,* Olho de boi.

—SAPONARIA — Saboeiro,* Sabão, Guití, Ibará, Ibaró, Pau de sabão, Pau do Paraná, Rita e outros apelidos do *Sapindus divaricatus*.

SARGASSUM BACIFERUM — Sargasso,* Salgasso, Saragaça.

—NATANS — Sargasso.*

SAUVAGERIA ERECTA — Erva de São Martinho,* Adina, Zoaba.

SCABIOSA ATRO-PURPUREA — Saudades,* S. roxas, Escabiosa,* E. dos jardins, E. marítima, E. viúva, Gaforina, Gaforina, Viúva.

—ATRO-PURPUREA var **ALBA** — Saudades brancas.*

CHINOPSIS BRASILIENSIS — Brauna,* B. preta, Barauna, Barauva, Bimbeira, Árvore da chuva, Coração de negro, Crauna, Garauña, G. da moda, Guarauna, G. preta, Guirauña, Ibirauña, Ipê taruman, Maria preta do campo, M. preta da mata, Muirauna, Parova preta, Pau preto, P. preto do sertão, Perovaíuna, Perovauna, Quebracho, Q. coronilho, Ubirarana, Ubirauna.

SCHINUS THEREBENTIFOLIUS — Aroeira,* A. comum,* A. corneiba, A. da praia, A. de Minas, A. do campo, A. mansa, A. vermelha, Abacaíba, Aguaraíba, Arundeava, Bálsmo de aroeira, Coração de bugre, Corneiba, Fruta de cotia, F. de raposa, F. de sabiá, Jejuira, Lentisco, Pimenteira do Peru, Urundeuva, Urinduba.

THEREBENTIFOLIUS var **RADIANA** — Aroeirinha,* Aroeira da fl. branca, A. do Amazonas, A. do mangue, A. fo de sarso e os apelidos da *Lithraea molleoides*.

—WEINMANNIAEFOLIUS — Aroeira do campo,* Aroeirinha do campo,* A. rasteira, Abacaíba rasteira, Curundeava, Pimenteira do Peru.

SCHIZOCASSIA PORTEII — Planta da felicidade.*

—SCHIZOLODIUM EXCELSUM — Guapuruvú,* Guaperuvú, Guapiruvú, Baageiro, Bageiro, Bacuribí, Bacurú, Bacurubú, Baqufruvú, Fava

- contra mau olhado, F. divina,* F. para dentição, Ficha, Ficheiro, Macurubú, Pau canoa, P. de canoa, P. de vintem, P. tambor.
- PARAHYBUM — Guapuruvú.*
- SCHUBERTIA MULTIFLORA** — Anégica de rama,* Erva da Costa, Maria da Costa, Mata cães.
- SCHULTESIS STENOPHYLLUM** — Fel da terra.*
- SCLERIA HIRTELLA** — Alvarado.*
- MELALEUCA — Tiririca,* T. de Mato Grosso, Capim cortante.
- MITIS — Tiririca,* T. de Mato Grosso.
- PALUSTRIS — Tiririca,* T. de Mato Grosso, Capim cortante.
- SYLVESTRE — Navalha de macaco,* Cipó navalha, Tiririca.*
- SCLEROLOBIUM PANICULATUM** — Carvão de ferreiro,* Carvoeira, Carvoeiro, Tachizeiro branco, Taxizeiro, Veludo.
- SCOPARIA DULCIS** — Vassourinha mofina,* V. alegre, V. branca, V. de casa, V. de Nossa Senhora,* V. de varrer, V. de varrer de casa, Vassoura de varrer, Peipeicaba, Pepeataba, Tapeicaba,* Tapixaba, Tapixirica, Tupeocabá, Tupiçaba, Tupichá, Tupixava.
- SEBASTIANIA BRASILIENSIS** — Capixava,* Ibiracambi, Marmelo do mato.
- HOLTZSCHIANA — Branquinho,* Branquilhão.
- SECHIUM EDULE** — Chuchú,* Chu-chuzeiro, Caiota, Carota, Machuchú, Maxixe francês, Xuxú.
- EDULE var **GLAUROCARPA** — Chuchú branco.*
- SECURIDACA LANCEOLATA** — Caninana.*
- SELAGINELLA CONVULUTA** — Gericó roxo,* Erva milagrosa, Jeericó, Mão fechada, Pé de papagaio, Rosca.
- SANECIO VULGARIS** — Catião.* Cravo do campo, Maria mole, Tasneirinha.
- SERJANIA CARACASANA** — Cipó d'água,* Timbó do campo, Tinguiá, Tingui.*
- FUSCIFOLIA — Cipó timbó,* Tinguiá, Tingui.*
- LETHALIS — Cipó timbó,* Cipó cururú.
- PARADOXA — Cipó timbó.*
- PISCATORIA — Cipó timbó.*
- SESAMO INDICUM** — Gergelim,* Gingelim, Jerxelim, Sésamo, S. do Oriente.

- SESBANIA AEGIPTIACA** — Balança os cachos.*
- SESUVIUM PORTULACASTRUM** — Beldroega da praia,* B. miuda.
- SETARIA GENICULATA** — Capim rabo de raposa,* Espartilho, Esparto pequeno, Panasco do Taboleiro.
- GLAUCA — Capim tinga,* Capitinga, Rabo de raposa.
- SCANDENS — Capim rabo de raposa.*
- VERTICILLATA — Capim de cabra.*
- SICANA ODORIFICA** — Melão caboclo,* M. croá,* M. cruá, M. de cheiro, M. de mesa, Cruá, Cruatina, Curuá, Sicana.
- SICKINGIA RUBESCENS** — Quina vermelha do Brasil,* Q. vermelha do mato, Arariba carijó, A. roxo, A. vermelho, Guararoba.
- SIDA CORDIFOLIA** — Malva branca.*
- LINIFOLIA — Guaxima miuda,* Lingua de tucano, Malva tucano.
- MACRODON — Malva do campo,* Carapíá.
- RHOMBOIFOLIA — Vassoura de relógio,* Vassourinha de relógio,* V. do campo, Alcaçuz da terra, A. de Minas, A. do Brasil, A. do cerrado, Chá inglês, Erva do chá, Erva do meio dia, Ipeca rasteira, I. relógio, Malva da praia, M. preta, M. relógio, M. relógio grande, Potaia comprida, Relógio de painho, R. de vaqueiro, Zanzo.
- ULMIFOLIA — Vassoura da fl amarela,* Chá da Índia.
- SIDERONYXON VASTUM** — Baomichá,* Bacomiça, Bacomixa, Bacumixa.
- SILVIA NAVALIUN** — Tapinhoá,* Tapinhoan,* T. amarelo, Canela tapinhoan, Itapinhoá.
- SIMABA BLANCHETTE** — Calunga.*
- CUNEATA — Casca para tudo.* Para tudo.
- FERRUGINEA — Calunga.* Calumba.
- GLANDULIFERA — Calunga.*
- SALUBRIS — Calunga.*
- SIMARUBA VERSICOLOR** — Pau paraiba,* P. praiba, P. de caixa, P. de tamanco,* P. parauba, Paraíba, Parauba, Pé da perdiz, Piolheira, Carauba, Mampá-i, Marapá do campo, Marubá, Marupá, Marupá do campo, Simaruba, S. do Brasil, S. mirim, S. paraiba.

- SMILAX JAPECANGA** — Japecanga,* Japicanga, Japucanga, Cipó de japecanga, Iapecanga, Iguapecanga, Inhapecanga, Ra da China, Ra da China branca, R. de quina, Salsa do brejo, S. do campo, S. gorda, Sa'saparrinha das boticas, S. do Rio.
- **PIPIRACIA** — Japecanga vermejha.*
- **SALSAPARRILHA** — Salsaparrilha,* S. branca, S. das boticas, Salsa americana, S. do mato, S. grande.
- SINAPIS ALBA** — Mostarda branca,* M. da China, M. inglesa, Mostardão.
- **NIGRA** — Mostarda,* M. da China, M. negra,* M. ordinária, M. preta, Mustardeira, Couve negra.
- SIPARUMA GUYANENSIS** — Capitú,* Erva de rato, Limão bravo, Mampa-i, Vulnerária das Guianas.
- SOARESIA NITIDA** — Oiticica.*
- SOLANUM ACULEATISSIMUM** — Arrebenta cavalo,* A. boi, Joá, Juá bravo.
- **AURICULATUM** — Couvetinga,* Cavitinga, Cavonc, Cuvitinga, Fruta de Guará, Fumo bravo, Guvitinga.
- **BALBISII** — Babá,* Bambão, Bobó, B. fruta, Bombão, Joá ti, Juá amarelo, J. do norte, Juceri babá, Melancia brava, M. da praia.*
- **CERNUUM** — Braço de preguiça,* Bolsa de pastor,* Capoeira branca, Panacéa.
- **DULCAMARA** — Maria preta,* Doce-amarga, Dulcamara.
- **SILO** — Gilô,* Tomate de princesa.
- **GRANDIFLORUM** — Lobeira,* Fruta de lobo, Fumeiro, Jurubeba grande.
- **GRANDIFLORUM** var **PULVERULENTUM** — Lobeira,* Fruta de lobo.
- **INSIDIOSUM** — Jubeba.*
- **LYCOPERSICUM** — Tomate,* Tomateiro,* Pomo do amor.
- **LYCOPERSICUM** var **CERASIFORMIS** — Tomate redondo.*
- **LYCOPERSICUM** var **PYRIFORMIS** — Tomate comprido,* T. cabacinha,* T. pêra.
- **MAMMOSUM** — Peito de moça,* Beringela, Cabeça de cabrito, Joá bravo, Jurubeba do Pará.
- **MELONGENA** — Beringela,* Beringela, Bringela.*
- **NIGRUM** — Pimenta de galinha,* P. de cachorro, P. de rato, Agua-
- racuinha, Araxixú, Bragaiba, Caçáxixá, Carachichú, Erva do sertão, E. mocó, E. moira, E. moura,* Guarapíá, Guraquim, Solanum, Sué.
- **OVIGERUM** — Beringela branca.*
- **PANICULATUM** — Jurubeba,* J. nil, J. verdadeira, Jauna, Jovena, Joveva, Juauana, Jubeba, Jumbeba, Jumpeba, Jupeba, Jurepeba, Juripeba, Jurubebinha, Jurumbeba, Juuna, Juvena, Juvera, Urumbeba.
- **PULVERULENTUM** — Caicara,* Caiasara, Capocreira branca.
- **PYRIFORMIS** — Tomate comprido.*
- **TUBEROSUM** — Batata americana,* B. alemã, B. chilena, B. de Parmentier, B. do reino,* B. inglesa,* B. portuguesa, Papa.
- SOLIDAGO BONARIENSIS** — Cordão de ouro.*
- **MICROGLOSSA** — Cordão de ouro,* Arnica, Lanceta, Rabo de rajo, Sapé macho.
- SONCHUS OLERACEUS** — Serrilha.*
- SOPHORA TITTORALIS** — Feijão da praia,* F. de árvore, F. de boi, Fava de impigem, Cambuí da praia, C. da restinga, C. de cachorro, Comandaíba.
- SPARATTANTHELIUM BOTUCUDORUM** — Arco de barril.*
- SPARATTOSPERMA ELLIPTICUM** — Caroba de Goiaz.*
- SPATHODIA CAMPANULATA** — Espatódia,* Arvore da bisnaga, A. da tulipa,* Fl de cachimbo, Sesagan, Tulipa da África.
- SPIGELIA ANTHELMIA** — Lombriegueira,* L. mansa, Arapabaca,* Arapacaba, Erva cruz, Estreja do mato.*
- **FLEMMINGIANA** — Arapabaca.*
- **MULTISPICA** — Grama bambu,* G. lanceta.
- SPILANTHES ACMELLA** — Agrião do Brasil,* A. do Pará, A. silvestre, Abecedária, Acmeia, Botão de ouro, Erva das crianças, E. de Málaca, Jambo, Jambu-açu, Jambu-rana, Mastroço do Pará, Pimenta da Costa, P. do Pará, Rainunculo brasileiro.
- **ACMELLA** var **OLERACEA** — Agrião do Brasil.*
- **ACMELLA** var **ULEAGINOSA** — Agrião do Brasil.*
- SPINACIA OLERACEA** — Espinafre,* Jambo-açu, Jambu-açu, Nambu.

SPIRAEA CHAMAEDRIFOLIA —

Buquê de noiva.*

SPONDIAS LUTEA — Cajá,* C. amarela, C. do sertão, C. mimoso, C. mirim, C. miuda, C. pequena, Cajaciro,* Cajazeira,* Cajazeiro, Cereira da América, C. da Espanha, Acajou, Acajá, Acajáiba, Amboô, Árvore das taperas, Ibameta, Munquengue, Pomo de Vénus, Tabuá, Taperebá, Taperibá,* T. do sertão, Tapiribá.

LUTEA var **PURPUREA** — Cajá umbú, Cajarana, Umbú caú.

MANGIFERA — Cajá manga,* C. açu, C. de fr grande, Cajarana,* Acaí-açu, Evi, Taperibá-açu.

RUBRA — Seriguela, Cajá vermelha.*

PURPUREA — Umbú,* Umbuzeiro,* Ambu, Amcixa da Espanha, Cajavana, Cajavarana, Fava do sertão da Bahia, Giqui, Ihamitara, Imbu, Jiqui, Mombina Ombu.

SPOROBOLUS INDICUS — Capim mourão,* C. lucu, Cortesia.

SPRENGELII — Capim barba de bode,* Barba de bode.*

TENUISSIMUS — Capim pé de moleque.*

STACHYS FLUMINENSIS — Cordão de frade,* C. de creoula, Catinga de mulata, Erva dos Santos Filho.

STACHYTARPHA CAYENNENSIS — Gervão fil de verônica.*

DICOTOMICA — Gervão,* G. das catinhas, G. roxo, G. verdadeiro, Gerbão, Gerebão,* G. verdadeiro, Aguarraponga, Chá do Brasil, Erva dos sumidouros, E. gervão, Juba, Jurbão, Juvão, Ogerbão, Orgerbão, Orgivão, Uregão, Urgivão, Urgibão, Vassourinha de botão, Verberão.

STANHOPEA EBURNEA — Sapatinho de Vénus,* Sapato de Vénus.

GRAVEOLENS — Cabeça de boi,* Saco e cobra.

STEMODIA VISCOSA — Rabuge.*

STENOCALYS BRASILIENSIS — Grumichama,* G. branca, G. roxa, Grumixaba, Grumexuba, Grumixama, Comicha.

BRASILIENSIS var **ERETHROCARPUS** — Grumichama,* Grumixa-

xama.

BRASILIENSIS var **LEUCOCARPUS** — Grumichama,* Grumixaba, Gurumiçaba, Gurumixaba.

DYSINTERICUS — Cagaiteira,* Cagaito.

SULCATUS — Pitanga,* P. comum, P. verdadeira, Ubipitanga.

STENOLOBIUM VELUTINUM — Cipó de macaco,* Timbó das piranhas,* Tingui das piranhas.

STENOTAPHRUM AMERICANUM — Grama,* G. de jardim,* G. da praia, Capim camalota.

STEPHANOTIS FLORIBUNDA — Estefanote,* Angélica do Japão.

STERCULIA EXCELSA — Sumau-ma.*

FOETIDA — Chichá, C. fedorento, Castanha da África, Amendoin de árvore, A. de pau, Arachichá, Araricá, Araxixá, Árvore fedorenta, Boleta de mula,* Bóia, B. unha de anta, Canela fétida, Pau de bóia, P. de cortiça, Unha de anta, Xixá, Congo,* Jecongo.

STIZOLOBIUM ATERRIMUM — Mucuna preta,* M. branca, M. raiada, Feijão de Bengala, F. de mastate, F. Maurício, F. mascate.

ATERRIMUM var **DURINGIANUM** — Mucuna preta.*

ATERRIMUM var **NIVEUM** — Mucuna preta.*

AURINGINUM — Mucuna preta.*

STRITHANTHUS BRASILIENSIS — Erva de passarinho,* E. de passarinha, E. passarinheira, Enxerto de passarinho,* Esterco das aves, Guitrá, Oera, Passarinheira, Tetipoteiba, Viequero.

VULGARIS — Erva de passarinho.*

STRYPNODENDRON BARBATI-
MÂO — Barbatimão,* B. verdadeiro, Barba de timan, Caneca da mocidade, C. de virginidade, Charãozinho roxo, Guarujá vermelho, Guarujá, Iabatimó, Moisés,* Ubatimô.

FLORIBUNDUM — Barbatimão,* Moisés.*

GARDERIANA — Barbatimão.*

POLYPHYLLUM — Barbatimão branco.*

ROTUNDIFOLIUM — Barbatimão.*

STYLOSANTHES GUIANENSIS — Alfafa do norte,* Trifólio.

VISCOSA — Meladinha de cavalo,* Alfafa rasteira do campo, A. viscosa, Alfavaca viscosa da praia.

STYRAX COMPORUM — Cúia de brejo,* Canela poça, Estorache da América, E. do campo, Fruta de pomba, Mangue do cerrado, Pindubá.

- **FERRUGINEUM** — Limoeiro do campo,* Benjoeiro, Benjoim.
- **LATIFOLIUS** — Caneia poca,* Pau de tinta, P. tinta.
- SWARTZIA APETALA** — Brinco de mula's.*
- **CROCEA** — Moçutaiba,* Ipê bôia, Muiracutaca.
- **MOLLIS** — Brinco de cabra,* Brinquinho.
- SWEETIA ELEGANS** — Perobinha.*
- **NITENS** — Peroba da Bahia, Perobinha do campo, Itaburana.
- SYAGRUS COMOSA** — Coqueiro castolé, Guabiropa do campo, Guariroba do campo, Guarirobinha.
- **OLERACEA** — Coqueiro amargoso, C. guabiropa, Côco amargoso, Coquim amargoso, Guabiropa, Gairo,

- Gariroba, Guairú, Guariroba, Guaviroba, Palmito amargoso, Pati amargoso.
- **PICROPHYLLA** — Côco de quaresma,* C. babão.
- SYLVIA NAVALIUM** — Tapinhoã,* Tapinhoan.
- SYMPLOCUS RHAMNIFOLIA** — Congonha.
- SYNGONANTHUS NIVEUS** — Capipatinga,* Capipuatinga, Caputinga, Diamantina, Sempre viva da serra, S. viva do campo, S. viva dos gerais.*
- SYPHOCAMPYLUS COCCINEUS** — Coral.
- SYRINGA VULGARIS** — Liliá, L. comum, Lilás.

T

TABEBUIA LEUCOXYLA — Pau tu-
cano,* Malacacheta.

**TABERNAEMONTANA CORONA-
RIA** — Jasmim de cachorro,* J. de
leite, J. manteiga, J. porcelana, Es-
perta, Guairana, Leiteira.

—**ECHINATA** — Pau de colher.*

—**LAETA** — Café do mato.*

—**LAEVIS** — Pau Pereira,* P. de
bolo, P. de colher, P. de pente, P.
forquilha, Pereiro, Pereiroá, Pin-
guaciba, Pinguasciba, P. oubuá, Buba-
açu, Camará amargo-so, C. de
bilro, C. do mato, Canudo amargo-
so, Cuiaraná, Forquilha, Guairana,
Ubá-açu.

TAGETES ERECTA — Cravo de de-
funto,* C. de defunto dos grandes,*
C. fétido, C. japonês, C. tagetes,*
Rabo de rojão, Rosa cabocla, R. da
India, R. de bôbo, R. de defunto,
R. de ouro.

—**MINUTA** — Coaré bravo,* Coari
bravo, Coaro bravo, Cravo bravo,
Alfinete do mato, Erva fedorenta,
Rabo de rojão, Vara de foguete.

—**PATULA** — Cravo de defunto,* C.
de defunto dobrado,* C. de defunto
do miudo, C. de defunto do peque-
no, C. de defunto singelo, C. fétido,
C. japonês, C. tagetes, C. túnico,
Cravina de Túnis, Cravinho da In-
dia, Rosa da China, R. de bôbo, Ta-
getes do Brasil, Tageto.

TALIMUM PATENS — Lingua de
vaca,* L. de vaca da fl amarela,
L. de vaca da fl résea, Benção de
Deus, Breco Major Gomes,* B.
manjagome, Erva de sangue, Ma-
jorana, Major Gomes, Maria angu,
M. gombe,* M. gombi, M. gombu,
M. Gomes, Muriangomes, Tussila-
gem.

TAMARINDUS INDICA — Tamarin-
do,* Tamarinda, Tamarindeiro,* T.
da India, Tamarinho, Jabai, Jabão.

TANACETUM VULGARE — Catinga
de mulata,* Atanásia dos jardins,
Era contra vermes, Tasneira.

TAPIRIRA GUYANENSIS — Pau
pombo,* Pacu, Capiuva, Cedrinho,
Cedro-i, Fruta de pombo, Mucum-
be, Tapirira, Tapirirí, Tapiririca.

TARAXACUM OFFICINALE — Den-
te de leão,* Salada de toupeira, Ta-
raxaco.

TECOMA ARALIACIA — Mandio-
cái,* Canela mandioca, Cedro pre-
to, Marupa-ubá falso, Morocotó,
Morototó, Piuna.

—**CARAIBA** — Carobceira, Caraíba,
Caraubeiro, Cinco em rama, C. fos
do campo, Guaraiiba.

—**CHRYSOTRICHIA** — Ipê tabaco.*

—**HEPTAPHYLLA** — Ipê roxo,* I.
amarelo, I. do brejo, I. preto, I.
rossa, I.-una, I.-uva, Aipê, Guirai-
ba, G. escura, G. piranga, Grarai-
ba, Pau d'arco roxo.

—**IPE** — Ipê.* I. amarelo, I. cava-
tan, I. comum,* I. de São Paulo,
Aipê, Cavatan, Guiraiba, Lapacho,
Peuva, P. roxa, Piuva, Queraiba,
Upeuna.

—**OCHRACEA** — Mandiocá,* Ipê
amarelo.

—**ODONTODISCUS** — Ipê branco,*
Pau d'arco da Bahia, Perebi, Upeu-
na.

—**RADICANS** — Jasmim trombeta.*

—**UMBELATA** — Ipê amarelo,* I.
cavatan, I. comum, I. do brejo,
Ebano verde, Fl nacional,* Guapa-
rino, Pau d'arco, P. d'arco amare-
lo, P. d'arco roxo, Upeuna.

TECOMARIA CAPENSIS — Tecomá-
ria,* Caroba vermelha de cipó,* Fl
trombeta.

TELANTHERA RAMOSISSIMA —
Macela,* Perpétua do mato.

TEPHROSIA CINERIA — Anil bra-
vo,* Tingui de Caiena.

TERAMNUS UNCINATUS — Favi-
nha de capoeira,* Amendoim de ve-
ado, Jequirana.

TERMINALIA ACUMINATA — Gua-
rajuba,* Muirajuba.

—**ARGENTEA** — Cachaporra de gen-
tio.*

—**BRASILIENSIS** — Merindiba,* Mi-
rindiba, Morindiba.

—**CATAPPA** — Amendoeira da In-
dia,* A. do Pará, Árvore da noz,
Castanhola, Chapeu de sol,* Guarda
sol, Noz da praia, Terminália.

— **FAGIFOLIA** — Cachaporra de gente.*

— **JANUARENSIS** — Merendiba,* M. bagre.

TETRACERA BREYNIANA — Cipó vermelho.*

TETRAGASTRIS CATUABA — Catuaba, Caá-taiba, Caá-tuiba, Catuiba, Fo boa, Pau de resposta.

THEOBROMA CACAU — Cacau,* C. comum.*

— **GRANDIFLORUM** — Cupuaçu.*

— **LEIOCARPA** — Cacau,* C. cabacilo, C. forasteiro.*

— **MICROCARPA** — Cacau maracujá,* C. jacaré, Caucaurana, Macaco-acan.

— **OVATIFOLIA** — Cupuaçu,* Cacau da Nova Granada, C. de Caracas, C. do Peru.

— **PENTAGONA** — Cacau,* C. forasteiro.*

THEVETIA PERUVIANA — Chapeu de Napoleão,* Coração de Jesus, Cruzeiro, Fava elétrica, Jorro-jorro, Noz de cobra.

THUMBERGIA ALATA — Amarelinha,* Bunda de mulata,* Carobá, Cu de cachorro, Erva de cabrita.

THUYA OCCIDENTALIS — Túia,* Tuja, Árvore da vida.*

— **PYRAMIDALIS** — Túia.

TIBOUCHINA CANDOLLEANAE — Quaresma,* Quaresmeira.*

— **GRANULOSA** — Quaresma,* Quaresmeira,* Cuipeuna, Fl da quaresma.

— **HOLOSERICA** — Quaresma,* Quaresmeira.*

— **MUTABILIS** — Quaresma,* Quaresmeira,* Cuipeuna, Fl da quaresma, F. de maio, Jacatirão de capote, Psi. fl de fl.

— **SALVIEFOLIA** — Fl de Natal,* Quaresmeira.*

— **SULCATA** — Quaresma,* Quaresmeira.*

TILLANDSIA PULCHELLA — Cravo de pau,* Cravina de pau.

— **RECURVATA** — Barba de velho,* Musgo de Nova Orleans, M. espanhol e os apelidos da sp seguinte.

— **USNEOIDES** — Barba de velho,* B. de macaco, B. de pái Ventura,* B. de pau, Cabelos do rei, Camambaráia, Crina vegetal, Erva dos barudos, Samambaiá, S. do norte.

TIPUANA SPECIOSA — Cássia argentina,* Amendoi acácia, Mocó, Pau de mocó, Tipá, Tipú, Tipuana.

TOCOYENA BULLATA — Araçá da praia.*

— **FORMOSA** — Genipapo (Jenipapo) bravo,* G. do campo, Genipapaim, Genipapim, Jenipa brava, Pau de cachimbo, P. de cera, Puruí da costa.

TORENIA FOURNIERI — Amor perfeito da China,* A. perfeito espanhol, A. imperfeito.

TORRESIA CEARENSE — Imburana de cheiro,* Ambauna, Amburana, Ameixa silvestre, Cumará, Camaru, C. da Bahia,* C. das castanhas, C. do Ceará, C. do norte, Cumbaru, Jambura, Janraná, Javarana.

TORULINUM CONFERTUM — Capim de cheiro.*

TOURNEFORTIA VOLUBILIS — Chá mineiro,* C. mineiro verdadeiro.

TRACHYPOGON POLYMORPHUS — Capim redondo,* C. agreste, Arroz do campo.

TRAGIA VOLUBILIS — Urtiguinha de cipó.* Cipó urtiguinha.

TREMA MICRANTHA — Crindevu,* Crindiúva, Curindiba, Guarindiva, Gurindiva, Orindevu, Orindiuva, Pau de pôlvora, Seriuva.

TRIANOSPERMA TAYUYA — Tajuíá,* T. de fr encarnado, T. itaca,

T. pimenta, Taioiá, Taiuiú, Tajuíá, Tejuco, Aboborinha do mato, Azougue do Brasil, A. dos pobres, Batata de teid, Cabacinha, Cabeça de moleque, Cereja de purga, C. do mato, Cipó azougue, Cota, Falso azougue, Forquilha, Fruta encarnada, Garuman, Geremu bravo, Mão de momo, Quiabó de cipó, Ra de bugre, Remédio de gálico, Salsaparrilha das Antíias.

TRICHLIA CATHARTICA — Marinheiro da fo miuda,* Purga de Castéte.

TRICHOSANTHES SANGUINEA — Abóbora serpente,* Pepino de cobra, Serpentina.

TRICHOSPERMUM LICHEN — Sambaiba da Bahia, S. de Sergipe.

TRIFOLIUM POLYMORPHUM — Trevo,* Erva do amor.

TRIMEZIA LURIDA — Baririçó,* Beririçó, Biririçó, Batatinha amarela, B. de purga, B. do campo, Capim rei, Lírio roxo dos campos, Marerêçó, Mareriçó, Maririçó, Moririçó, Ruibarbo do brejo; R. do mato, R. dos campos, R. dos charcos.

TRIPHASIA AURANTIOLA — Límãozinho de jardim.* Limão da Índia, L. francesa.

TRIPLARIS PAJAHU — Pajau,* Pachau, Pajeu,* Bajau, Vilão.

TRITICUM REPENS — Gramo,* G. branca, G. comum,* G. das boticas, G. de jardim,* G. de ponta, G. inglesa, Trigo grama da praia, T. rasteiro, T. reptante.

—**SATIVUM** — Trigo,* T. branco, T. comum,* T. cultivado, T. do inverno, T. grama, T. inglesa, T. tenro.

TRITRINAX BRASILIENSIS — Buriti palmito,* Curanú,* Carána, Carandai, Carandá piranga.

TRIUMFETTA ROMBOIDEA — Carrapicho da calçada,* C. de linho, Barba de boi.

—**SEMITRILOBATA** — Carrapicho da calçada,* C. de linho, Juta nacional.

TROPAEOLUM MAJUS — Chagas,* C. maior, Capucina, Capuchinha,* C. grande, Cinco chagas, Ciçó de chagas, Coelheria dos jardins, Agríão do México, A. grande do Peru, A. maior da Índia, Fl. de sangue, Mastruço do Peru, Sapatinho de Iaiá.

TURNERA DIFFUSA — Damiana.

—**ULMIFOLIA** — Albina.*

—**ULMIFOLIA** var **ELEGANS** — Albina.*

TYNNANTHUS ELEGANS — Cipó cravo,* C. trindade.

TYPHA DOMINGUENSIS — Tabua,* Tababúia, Tabu, Tabu, Capim de esteira, Erva de esteira, Pálma de flecha, P. do brejo, Partasana, Pau de lagoa.

U

ULVA LATUCA — Alface do mar,*
Alfacinha, Cetim do mar, Folhada,
Salgasso, Sargazo.

URAGOGA IPECACUANHA — Ipe-
caonha,* Ipeca,* Poáia,* Ra de
ouro, R. vomitiva.

URENA LOBATA — Guaxima,* G.
branca, G. macho, G. roxa, Guau-
xima, Guaximba, Guaxuma, Aguau-
xima, Aramina, Carrapicho de lava-
deira, C. redondo,* Caquibosa, Emba-
bra de malva, Ibarema, Juta bahiana,
Malva de São Sebastião, M.
roxa, M. silvestre, Malvadisco, Mal-
vaisco,* Malvalisco, Malvalistro,
Malvanisco, Uacima, U. roxa, Ua-
issima.

SINUATA — Carapicú,* Capimona-
ga,* Carapomonga, Carrapichinho,

Guaxima roxa, Malva cor de rosa,
Oajurú, Piranga, Urucurana.

—SYLVESTRE — Gosmento.*

URERA BACCIFERA — Cansanção.*

—CARACASANA — Cansanção de es-
pinho,* Urtiga branca, U. brava,
U. grande, U. picante, U. verme-
lha, Urtigão.

—SUBPELTATA — Cansanção de es-
pinho,* C. verdadeiro, Mafé, Ortigão.

USNEA BARBATA - Barba de pau,*
Barba de velho verdadeira.

URTIGA URENS - Urtiga,* U. bran-
ca,* U. da fo miuda, U. de fogo,
U. do reino, U. picante, Urtigui-
lha, Ortiga.

V

- VALTHERIA COMMUNIS** — Douradinha do campo,* Frecheiro.
- VANILLA AROMATICA** — Baunilha,* Bainilha.
- PALMARUM** — Baunilha de Niterói,* B. da fava grande, B. da Bahia,* B. silvestre.
- PLANIFOLIA** — Baunilha.*
- POMPONA** — Baunilha,* Baunilhão.
- VALOTA INSULARIS** — Capim porró,* Milhete gigante.
- VALLESIA GLABRA** — Chuviringana.*
- VANILLOSMOPSIS DISCOLOR** — Candeia,* Candieiro, Acende candeia, Facho de viajante, Pau candeia.
- VELLOSIA ALOAEFOLIA** — Caneleira de ema,* Ema, Pé de ema.
- FLAVICANS** — Canela de ema,* Velósia.
- MARITIMA** — Canela de ema,* Velósia.
- SULPHUREA** — Canela de ema,* Velósia.
- VERBENA CHAMAEDRYFOLIA** — Verbena,* V. dos jardins, V. falsa, V. híbrida,* V. melindre, Camaradinhão, Formosa sem dote,* Juruiuba, Jurujuba,* Melindre, Melindro.
- OFFICINALIS** — Verbena.*
- VERBESINA GLabra** — Cravo do campo.*
- VERNORIA BAHIENSIS** — Alumman,* Lumã, Uarumã.
- ELEGANS** — José moleque,* André moleque.*
- FERRUGINEA** — Assa peixe,* A. peixe do Pará, Fo de Santana.
- MEMBRANACEA** — Assapeixe branco,* A. peixe de Goiaz, Fo de Santana.
- POLYANTHES** — Cambará guaçu.
- SCORPIOIDES** — Erva pocá,* Enxuga, Balieira preta, Pau cinza, Prek-cadá.
- VETIVERIA ZIZANOIDES** — Capim cheiroso,* C. sândalo, C. vetivér,* Grama cheirosa, G. das Índias, Jarrapé, Patcholi do norte, Ra de cheiro, Verônica, Vetiver.

- VIBURNUM OPULUS** — Bola de neve,* Sabugueiro dos pântanos.
- VICIA FABA** — Fava.
- SATIVA** — Ervilhaca,* Cirisão.
- VIGNA REPENS** — Batatarana,* Comandaiba, Feijão da praia, F. de impigem.
- SESQUIPEDALIS** — Feijão de metro,* F. chicote, F. espargo.
- VEXILATA** — Feijão miúdo,* F. do mato, Violeta do campo.
- VINCA MAJOR** var **ALBA** — Boa tarde,* B. noite branca, Congorça,* Congorsa, Fl de todo ano, Jasmin do mar, Pervinca,* Vinca,* V. per-vinca.
- MAJOR** var **ROSEA** — Boa noite,* Pervica,* Vinca.
- VIOLA IPECACUANHA** — Purga do campo,* P. de veado, Ipeca branca, I. da praia, Ipecacoanha branca de Caiena, I. de Marajó, Ipó, Poáia branca, P. do campo.
- LITTORALIS** — Poáia da praia,* Poejo do mato.
- ODORATA** — Violeta,* V. cheirosa, V. das tres cores, V. de março, V. de Petrópolis, Viola, Fl de Proserpina.
- TRICOLOR** — Amor perfeito,* A. perfeito bravo, Erva da trindade, Fl da trindade, Jacea, Viola das tres cores, V. tricolor.
- VISMIA BRASILIENSIS** — Captainga,* Caaopiá, Ananga recuiba, Lacre, Pau conserva, Pau de facre.
- VITEX AGNUS-CASTUS** — Alfazeima,* Agno casto, Alecrim do Norte, Árvore da castidade, A. da pimenta, A. do incenso, Pimenta dos monjes.
- BAHIENSIS** — Maria preta.*
- CAMPESTRIS** — Uva do campo.*
- CYMODIA** — Maria preta,* M. preta da várzea, M. preta do alugado, M. preta do Igapó.
- MONTIVIDEUM** — Tarumã,* Taramã, Tarumén, Tarumeira, Maria preta.
- POLYGAMA** — Maria preta,* Açoita cavalo, Bracul, Congonha dos campos, Uva do cão.

—TARUMA — Tarumá,* Taromá,
Taromén, Azeitona brava.

—VINIFERA — Parreira,* P. verda-
deira, Parra,* Uva,* Videira,* V.
de Noé, Vinha, V. de Noé.

VOCHYSIA ELLIPTICA — Pau doce
da fo larga.* Fo larga.

—LAURIFOLIA — Canela santa,*
Congonheiro, Murici branco, Rabo
de arara, R. de tucano, Ururuca.

—THYRSOIDEA — Pau de tucano,*
P. de brinco, P. de caixa, P. de
cinzza, P. doce, Pinheiro do campo,
Árvore do vinho, Goma arábica do

Brasil, G. do Brasil, G. lágrima,
Rabo de arara, Vinheiro do campo,
Urucuca.

—TUCANORUM — Pau de tucano,*
P. calxeta, P. de caixa, P. de ca-
chimbo, P. de lágrima, P. de tam-
anco, P. de viola, P. doce, Cache-
ta, Cinzeira,* Cinzeiro, Congonha,
C. do campo, Coxa de frango, Fru-
ta de tucano, Cingeira brava, Ia-
babuia, Iabádia, Tamancão, Tabebúia,
T. do brejo, Vinheiro do ma-
to.

VOYRIA UNIFLORA — Gençiana
sem fos.

W

WALTHERIA COMMUNIS — Douradinha do campo,* Frecheiro, Frexeiro.

WEDELLIA ALAGOENSIS — Mal-me-quer dos brejos,* Caléndula.

—PALUDOSA — Mal-me-quer,* M.-me-quer dos brejos, M.-me-queres,* Mondororó, Bem-me-quer.

—PALUDOSA var VIALIS — Mal-me-quer.* M.-me-quer dos brejos.

WEIGETIA DETERGENS — Jacaré d' mato,* J. catinga.

WILBRANDIA VERTICILATA — Taiuiá,* T. de quiabo,* T. miúdo, Azougue do Brasil, Catingueiro, Gonó, Gonu.

WISSADULA AMPLISSIMA — Malva vareta.*

—SPICATA — Paco-paco,* Vassoura mineira e os apelidos do Pseudo abutilon-spicatus.

WULFFIA STENOGLOSSA — Cravo do campo,* Jambu, Jamburana.

X

- XANTHIUM BASILICUM** — Carrapicho de carneiro.*
—**STRUMARIUM** — Carrapicho de carneiro,* O. bravo, C. grande, Bardana maior, Erva dos pegamigos, Espinho de carneiro,* E. de carneiro dos grandes, Hati de espinho, Pegamago, Pegamassa.
- XANTHOSONA SAGITTIFOLIUM** — Mangará mirim.*
- SAGITTIFOLIUM** var (?) — Côco,* Côco de Nazaré, Mangarai, Mangará mirim, Mangarito, M. mirim.
- VIOLACEUM** — Mangará roxo,* M. peuna, Manganás, Tajaúrana.
- XANTHOXYLON RHOIFOLIUM** — Espinho de vintem,* E. ramoso, Betarú amarelo, Corumbeturu, Inanduva, Laranjinha, Mama de cadeia, Maminha de porca, Tamanqueira da várzea, Tambaratuca, Tambatantuca, Tambetaru, T. de espinho, Teta de cadeia, T. de porca, Tinguaci, Tinguaciba, Tinguacu.
- TINGUACIBA** — Tembetaru,* Centrilho, Laranja branca, Tinguaciba.
- XERANTHENUM ANNUUM** — Sempre viva,* S. bela, S. verde, Fl de Diana, Imortal, Perpétua.*
- XIMENIA AMERICANA** — Ameixa da Bahia,* A. da terra, A. de espinho, A. do Brasil, A. do Pará,

- Espinheiro de ameixa, Limão bravo do brejo, Sândalo do Brasil, Umbú bravo.
- XYLOPIA AETHIOPICA** — Pimenta da Costa.*
- BRASILIENSIS** — Embira,* Embirema branca, Ambira, Ibira, Imbirá, Pindaíba da fo pequena, Pinheirinho, P. dos campos, Semente de embira.
- EMARGINATA** — Pindalba,* P. do Rio São Francisco, P. miuda, Pau anzó, P. de mastro, Pindabuna, Pindaibinha, Pindauia, Pindaiuva, Pindauva, Pintaiba, Embira barriguda do sertão, E. de caçador, E. de pindaíba, Embiratanha, Pimenta do sertão.
- FRUTESCENS** — Pegerecu,* Paggericú, Pagerecum,* Picherecum, Pichericum, Pijerecu, Pijerica, Pau bonito, Pimenta da Costa, P. do sertão, P. pejerecum, Pindaíba branca, Coagerucú, Conguerecan, Conguerecon, Conguerecu, Fruta de burro, Ibira, Jegerecu, Jererecou, Jerecucú, Jinjurucú.
- SERICEA** — Embira,* E. vermelha,* Embirema, Ambira, Semente de embira.
- XYLOSMA DYGINUM** — Auiba.*
- XYRIS LAXOFOLIA** — Botão de ouro,* Erva de empigem, Japiçai, Jupicai, Jupical.

Y

YUCCA FILAMENTOSA — Árvore
da pureza,* Cubuiá, Círio de Nos-
sa Senhora, Fl de campa, Iuca.*
Vela da pureza.*

—**GLORIOSA** — Árvore da pureza*
e os mesmos apelidos da sp prece-
dente.

Z

ZEA MAYS — Milho,* Abati, Mais, Maiz, Trigo da Espanha, T. da Índia, T. da Turquia.

—**MAYS** var **VIOLACEUS** — Milho roxo.*

ZEBRINA PENDULA — Viuvinha,* Alpercata de São José, Judeu errante, Milagre de São Cosme e Damião,* Sapatinho de Nossa Senhora, Trapoeiraba roxa, Taquarinha roxa, Barquinha de Noé.

ZEYHERIA MONTANA — Chapeu de frade,* Bolsa de pastor, Bucho, Cúia de macaco, Mandioquinha branca, M. do campo.

—**TUBERCULOSA** — Bucho de boi,* Bolsa de pastor,* Bucho, Chá de frade, Ipé cabeludo, I. preto, Mandioquinha, Marfim, Velame do mato, Véjaminho do mato, Verga de anta.

ZINIA ELEGANS — Ciumes de velha,* Caléndula, Canela de velho, Chapeu de couro,* Cravo de estudante, Amor ingrato, Rosa cabocla, Zina, Zinia.*

—**MULTIFLORA** — Cabocla.*

ZINZIBER OFFICINALIS — Gengibre,* Gengivre, Gingibre,* Mangaratáia, Mangaratáia.

ZIZIPHUS JOAZEIRO — Juá,* Juazeiro,* J. grande, Joá, Enjóá, Laranja de vaqueiro, Marinheiro.

—**JUJUBA** — Jujuba,* Jujuuba.

—**ONDULATUS** — Grão de gallo,* Acoaramurá.

ZOLLERNIA ILICIFLORA — Moçutiba,* Maçutiba, Micutiba, Misutaiba, Mocataiba, Mocetaiba, Mocitaiba, Mossitaiba, Muxitaiba, Ipê bôia, Orelha de onça.

—**PARAENSIS** — Pau santo.*

ZONARIUM PAVONINA — Sargasso,* Salgasso, Saragaça.

ZORNIA DIAPHYLLA — Urinária,* Alfafa do Brasil, A. do campo, A. viscosa do campo, Arrozinho da praia, Mijara do Norte, Mijarona do Norte.

—**DIAPHYLLA** var **LATIFOLIA** — Urinária* e os apelidos da sp precedente.

ZYGOPETALUM MELEAGRIS — Estrela da República.



*ESTE LIVRO FOI COMPOSTO E IMPRESSO
NAS OFICINAS DA EMPRESA GRÁFICA
DA "REVISTA DOS TRIBUNAIS" LTDA.,
À RUA CONDE DE SARZEDAS N. 38, SÃO
PAULO, PARA A COMPANHIA EDITORA
NACIONAL EM 1949.*



FLÓRA DA BAHIA

Nº 001471

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

1949

IMPRESSO NOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
PRINTED IN THE UNITED STATES OF BRAZIL