

5978
11702 N.º 1

ALGUMAS REFLEXÕES

SOBRE A

HEPATITE AGUDA.

THESE

OFFERECIDA E SUSTENTADA

PERANTE A

FACULDADE DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO,

FOR

ADRIANO FERREIRA,

BACHAREL FORMADO EM MEDICINA PELA UNIVERSIDADE DE COIMBRA,

NO SEU EXAME DE SUFFICIENCIA.



RIO DE JANEIRO.
TYP. AMERICANA DE I. P. DA COSTA,
RUA DA ALFANDEGA N. 43.

M. DCCC. XLIII.



SYMPTOMATOLOGIA DA HEPATITE AGUDA.

Tensão no hypocondrio direito; dôr surda, gravativa, pungitiva, lancinante na mesma região, augmentando pela pressão, pela tosse e inspiração, e pelo decubito, já sobre um lado e já sobre o outro, estendendo-se ao peito, hombro e garganta do mesmo lado, tudo variando segundo o ponto do figado que se acha affectado; frequencia, plenitude e dureza do pulso; calor mordicante; aridez da pelle; ictericia; sede; lingua amarelada ou anegrada; perda de appetite; dezordem de evacuações alvinas, &c. E quando a hepatite se eleva a um mais alto grau, a respiração se torna extremamente dolorosa, vem a oppressão, a extrema anciedade, a lividez da face, a alteração das feições, a sede inextinguivel, a secura completa da lingua, os vomitos, os soluços que quasi suffocam o doente, &c. Ora, os symptomas são alterações de funções, as funções são as expressões dos órgãos que as produzem; portanto, no caso vertente vemos nós, na apreciação d'estes symptomas, modificações de tecidos diferentes, como seja o peritoneo, pleura, mucosa gastro-intestinal, &c., &c.; d'onde se vê que no estado actual da Sciencia ainda muito se difficulta o diagnostico, e forçozo é esperar por trabalhos ulteriores que mais nos esclareçam este ponto de pathologia.

A invazão da hepatite varia conforme a idade, sexo, temperamento e idiosyncrasia dos individuos; precedem arrepios de frio mais ou menos intensos, succedem phenomenos febris, manifesta-se aberração das funções do aparelho digestivo, e a ictericia muitas vezes se patentea antes que todo e qualquer symptoma nos faça suspeitar que o figado se acha affectado.

DURAÇÃO DA HEPATITE.

A duração da hepatite já foi determinada pelo Velho de Cós, que diz que ella não é menor que cinco dias, e que se prolonga muitas vezes até o decimo quinto dia, terminando-se então pela resolução, ou por um estado chronico que se pôde considerar como uma resolução imperfeita. Na verdade esta modificação, ainda que pareça á primeira vista favoravel, deve com tudo inspirar graves suspeitas, por isso mesmo que o trabalho chronico é mais moroso do que o processo de uma affecção aguda, que agita violentamente todas as funções geraes da organização, e consequentemente os apparatus que as produzem; mas este estado é pouco duradouro, e por isso não pôde desorganisar os tecidos organicos, salvas as complicações que aggravam esta molestia, e conforme o estado anterior dos individuos; o que não acontece, não só no estado chronico da hepatite, como no de toda outra qualquer lesão pathologica da economia animal. A pratica nos demonstra, e as autopsias cadavericas nos confirmam: nas molestias agudas triumpham a medicina, nas chronicas contentamo-nos, no maior numero de casos, em demonstrar depois da morte que a alteração estava acima dos recursos d'arte; que o figado se mostra infiltrado, endurecido, gorduroso, melanoso, gangrenoso, &c. O processo das molestias chronicas está ainda no seu nascedouro.

Observamos todos os dias os infartes consideraveis do figado e baço em consequencia de affecções agudas, e com especialidade na resolução de febres intermitentes; mas não podemos considerar os individuos assim affectados restituídos ao seu estado physiologico, antes pelo contrario devemos consideral-os como cimentados por um germen, que mais tarde ou mais cedo lhes pôde brotar consequencias bem graves: por isso partilhámos a opinião que citamos dos praticos que encaram a terminação da hepatite por um estado chronico, como uma resolução imperfeita.

Esta molestia termina-se ainda por suppuração e gangrena, conforme a opinião de alguns auctores. Mas todos reconhecem que a terminação por resolução é a mais favoravel, pois que a por suppuração e gangrena é sempre seguida de resultados funestos, salvo um pequeno numero de casos, em que os abcessos se apresentam exteriormente, e que se acham como inkystados, não podendo infiltrar o tecido do figado; alias o marasmo será a consequencia necessaria. A terminação por gangrena é sempre mortal; estas duas terminações quasi que se não observam, senão nas hepatites originadas por causas mecanicas, que tornam o diagnostico menos difficil sem que contudo melhore o prognostico.

Predispõe à hepatite a idade adulta, as paixões vehementes e deprimentes, o trabalho de gabinete, o clima quente, e subitas modificações da atmospherá, as localidades pantanosas e húmidas, o uso inconsiderado de bebidas alcoolizadas, o abuso dos drasticos; circumstancias estas que se dão exuberantemente n'este bello e ameno paiz, mas que já principia a melhorar, pelo zelo e afincio com que a mocidade brasileira viajando os paizes cultos da Europa, implanta os melhoramentos d'esta velha mestra. Entretanto muitos focos morbosos ainda existem; todos os dias nol-os lembram os habitantes de Magé, Macacú, Pilar, Iguassú, Porto da Estrella, que buscam nossos conselhos.

Entre as causas determinantes da hepatite encontramos: as quedas sobre o hypocondrio direito; as feridas penetrantes d'esta região, as quedas sobre os pés, o curso forçado, as feridas da cabeça, as irritações de todo o tubo intestinal: e posto que no estado actual da sciencia não nos seja permittido dar uma explicação precisa dos diversos modos por que estas duas ultimas causas determinam a inflamação do figado, com tudo a observação e a pratica demonstram diariamente a sua possibilidade, que admittimos, embora não sancionemos as brillantes theorias de Ribes, Cruveilhier, Richerand, Broussais e outros.

O prognostico d'esta molestia liga-se ao seu diagnostico, é favoravel quando a hepatite é pouco intensa, e isenta de complicações; porém como isto acontece poucas vezes, devemos portanto, no maior numero de casos, consideral-o grave.

O tratamento da hepatite, quando esta é ligeira, consta apenas de bebidas diluentes e acidulas, brandos laxantes, e algumas sanguexugas applicadas á região do figado ou ao anus, e cataplasmas emolientes; quando porém a hepatite é intensa, e grande orgasmo inflammatorio existe, convém as largas sangrias gerais e locais, e estas muitas vezes repetidas, e em uma palavra convem applicar o tratamento antiphlogistico directo e indirecto, em todo o seu rigor, subtrahindo o enfermo, quanto fôr possivel, da influencia das causas que o affectaram.

Terminarei aqui este fraco trabalho, que nada contém além do que é muito sabido, visto que não venho inculcar-me auctor, porém sim satisfazer as vossas leis, que assim o exigem; e se elle puder dar alguma idéa de sufficiencia da minha parte para o livre exercicio da pratica da Medicina no Imperio do Brasil, ufanar-me-ei com a vossa approvação.

FIM.

HIPPOCRATIS APHORISMI.

I.

Omnia secundum rationem facienti, et non secundum rationem eventibus, non ad aliud transeundum, manente eo quod ab initio visum est. (SECT. 2 APH. 52.)

II.

In autumno morbi acutissimi, et maxime exitiales; ver autem saluberrimum, et minime lethale. (SECT. 3 APH. 9.)

III.

Si in ventrem sanguis effusus fuerit præter naturam, necesse est suppurari. (SECT. 6 APH. 20.)

IV.

In ictericis hepar durum fieri, malum. (SECT. 6 APH. 42.)

V.

Ab hepatis inflammatione singultus, malum. (SECT. 7 APH. 17.)

VI.

Qui ad hepar suppuratum uruntur aut secantur si quidem purum effluat pus et album, superstites evadunt: ipsis enim pus est in tunicâ; si vero effluat velut amurca, pereunt. (SECT. 7 APH. 45.)

Esta these está conforme os estatutos. Escola de Medicina, 27 de setembro
de 1843. DR. JOBIM.

Typ. Americana.