

180

ALGUMAS PROPOSIÇÕES

SOBRE

OS ESTREITAMENTOS DO CANAL DA URETRA.

THESE

APRESENTADA E PUBLICAMENTE SUSTENTADA,

PERANTE A ESCOLA DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO.

aos 5 de agosto de 1843,

POR

ANTONIO DA COSTA.

NATURAL DO RIO DE JANEIRO,

DOUTOR EM MEDICINA PELA FACULDADE DE MONTPELLIER,

para a verificação de seu Diploma, conforme mandão os Estatutos da mesma Escola.

Principiis obsta, sero medicina paratur.
Cum mala per longas invaluero moras.
Ovis.



RIO DE JANEIRO,

TYPOGRAPHIA FRANCEZA, RUA DE S. JOSÉ, N. 64.

1843.

Á MEU PAI,

Meu intimo Amigo.

Á CORPORACÃO MEDICA BRASILEIRA.

DR. COSTA.

Sendo-nos imposta pela lei a obrigação de apresentar á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro uma these para a verificação de nosso diploma, decidimo-nos, não sem custo, a formular algumas proposições sobre os estreitamentos do canal da uretra.

Essa tarefa superior á nossas forças, esperamos que mereça a benigna aceitação da illustre corporação, perante a qual só para cumprir um dever ousariamos levantar nossa fraca voz.

DR. COSTA.

ALGUMAS PROPOSIÇÕES

SOBRE

OS ESTREITAMENTOS DO CANAL DA URETRA, *

PROPOSIÇÃO PRIMEIRA.

Definição.

Da-se o nome de estreitamento do Canal da Uretra á diminuição de sua capacidade e por consequencia a difficuldade na passagem do liquido que por elle deve transitar.

II.

Das classificações até hoje feitas, aquella que mais quadra com a nossa maneira de pensar he a seguinte: — Estreitamentos organicos, Inflammatorios e Espasmodicos. — Subdivisões porém existem d'estas tres sortes de estreitamentos.

III.

Huma das causas mais frequentes dos estreitamentos são as molestias venereas; comtudo os agentes externos, a inflammação, a contracção espasmodica, a introduccção de corpos extranhos, os calculos renaes, certas occupaões e modos de vida, o onanismo, etc., podem dar lugar áo apparecimento d'esta molestia.

IV.

Conhecida d'esde a antiguidade, sómente áos praticos d'estes ultimos tempos, sobre tudo aos Illustres Ducamp, Amussat e Lallemand, devemos o exacto conhecimento que della temos e do seo tratamento.

* A faculdade não approva nem desaprova as opiniões emitidas nas theses que lhe são apresentadas.

São tres os methodos empregados para o curativo dos estreitamentos organicos em geral, a saber: a Dillatação vital, a Cauterisação, e a Incisão; preferimos a dillatação vital por meio de sondas metalicas á os dois outros, e mesmo quasi que podemos dizer, que este he por excellencia o methodo verdadeiro e que os outros só o ajudão, mas que por elles sós não se pôde obter a cura.

VI.

Os estreitamentos puramente inflammatorios, cedem a hum tratamento anti-phlogistico apropriado, se bem que depois de dibellada a inflammação, será muitas vezes vantajoso o emprego das sondas.

VII.

Os estreitamentos espasmodicos, quando de pouca dura, cedem facilmente a hum tratamento anti-espasmodico, comtudo algumas vezes elles são por tal maneira renitentes que he mister empregar outros meios: aquelle que melhor tem provado em nossa pratica he a introducção demorada da sonda metalica untada com pomada de belladona, ou então a sonda electrica de novo invento (1).

VIII.

A ruptura da uretra, os abscessos urinaarios, as fistulas urinaarias, a dillatação as vezes exagerada da bexiga, a retenção completa das urinas, são as consequencias mais communs dos estreitamentos; lesões ainda mais graves existem, consequencias d'esta molestia, porém abstemo-nos de fallar n'ellas por isso que seria necessario hum tratado especial.

IX.

Nas retenções completas de urinas, parece-nos mais conveniente empregar com preferencia o catheterismo alguma cousa forçado, sendo mais conveniente para este fim a algalia fechada (2).

(1) Esta sonda, que tenho a honra de apresentar, he feita debaixo dos mesmos principios que a pila de Volta; daremos a explicação d'ella, a maneira de se servir e os casos em que a temos empregado com successo.

(2) A Algalia fechada, instrumento nosso, reune qualidades que lhe dão innumeradas vantagens sobre as outras; daremos a sua explicação e mostraremos o quanto he util este instrumento para o catheterismo forçado.

X.

A operação da Casa (Boutonnière) deve ser empregada com preferencia a punção da bexiga. Salvos os inconvenientes que a ella se oponhão, esta operação he hum meio poderoso para a cura das fistulas urinarias que se abrem acima da curvatura da uretra.

XI.

A Punção da bexiga deve ser empregada em ultimo caso, e sempre a fariamos supra pubiana.

XII.

Os calculos Uretraes simulão muitas vezes estreitamentos organicos, he necessario tacto para os reconhecer sobre tudo quando elles estão engastados e cobertos, o instrumento a que damos o nome de sonda pinça (1), de nossa invenção, he talvez o mais apropriado para a sua extirpação.

XIII.

Os estreitamentos organicos callosos são sempre rebeldes a outro tratamento que não seja o da incisão, empregando-se logo depois a dillatação.

XIV.

As vegetações esponjosas raras vezes se encontrão além da fossa navicular, a excisão e a cautherisação são os meios mais convenientes para a sua destruição.

XV.

As fistulas urinarias, por numerosas que sejão, cedem quasi sempre á dillatação acompanhada do emprego da algalia demorada e a cautherisação dos orificios externos e internos, este curativo he comtudo longo.

(1) Este instrumento he de hum effeito prompto, para se tirarem os calculos do canal, elle he, em quanto a nós, preferivel á Uretratum, que muito mais complicado não reúne as vantagens d'este.

XVI.

O caminho falso (*fausse route*) pôde ser feito pela mão mais habil, elle he sempre de consequencia, mórmente quando communica com o reto, a incisão quando elle he superficial, a cautherisação quando tem pequena extenção e a algalia demorada são os meios que mais aproveitão.

XVII.

As bridas (*brides*), as ulcerações, impedem o trajecto da urina e dão nascimento aos estreitamentos, para estas a cautherisação e para aquellas a incisão sempre são uteis.

XVIII.

O tratamento das molestias de vias urinaarias deve ser praticado o mais cedo possivel por isso que a cura se obtem com muita facilidade; desgraçadamente os enfermos só procurão o Medico nos ultimos periodos da molestia.



HIPPOCRATIS APHORISMI.



I.

Vita brevis, ars longa, occasio præceps, experientia fallax, iudicium difficile. Oportet autem non modo se ipsum exhibere quæ oportet facientem, sed etiam ægrum, et præsentem, et externa. — *Sec. 1, aph. 1.*

II.

Ad extremos morbos, extrema remedia exquisite optima. — *Sec. 1, aph. 6.*

III.

In morbis acutis extremarum partium frigus, malum. — *Sec. 7, aph. 1.*

IV.

A plaga in caput, stupor aut delirium, malum. — *Sec. 7, aph. 14.*

V.

Lassitudines sponte abortæ, morbos denuntiant. — *Sec. 2, aph. 5.*

VI.

Sanguine multo effuso, convulsio aut singultus superveniens, malum. — *Sec. 5, aph. 3.*

Esta these está conforme os Estatutos.

Escola de Medicina, 31 de julho de 1843.

Dr. Jobim.

II

III

IV

V

VI